

2 CAELII AVRELIA-
 NI METHODICI SIC-
 CENSIS LIBER CELE RV M
 VEL ACVTARVM PAS-
 sionũ,qua licuit diligentia recognitus,atq3
 nunc primũ in lucem æditus.



P A R I S I I S
 Apud Simonem Colinaeum.
 1 5 3 3.

EXCELLENTISSIMO

viro Ioanni Brayllon Medicorum
apud Luteciā facile principi, Ioan-
nes Guinterius Andernacus, S.



Aeliū illū Aurelianū de mor-
bis acutis quem mihi nuper
emaculādū credideras, vir or-
natissime ad te remitto, formis
Colinæi Typographi citra cōtrouersia
in Gallijs primi excusum, leuitérq; po-
tius q̄ seuerē castigatū, simul vt volūta-
ti tuę qua maior mihi vix est vlla, obse-
cundē, simul vt studiosos homines hoc
etiā beneficio prolixior demerere. Qua
in re si minus petitioni tuę respōderim,
cogitato maluisse me prudentiam meā
abs te desiderari, q̄ beneuolentiam. Cur
enim nō tibi de me tam præclare quoti-
die merēti, tamq; honesta ī cōmunē stu-
diosorū gratiā postulāti morē geram?
Imò gratias potius referēdas tibi cen-
seo, q̄ in tanta Medicorū turba vnū me
dignū existimaueris, cui op⁹ hoc Cœlij
in re Medica olim Clarissimi castigādū,
ædēdūq; cōmitteres. Nā quis nō abs te

haberi aliquis optet, qui omnium doctorum consensu, communi hominum suffragio, ac etiam experientia principatum in arte nostra, hoc est, medica teneas, in cuius venerationē nunc pateat omnia, qui veluti præsens non tam priuatis quā principibus viris, adeoque regibus numen expetare. Id quod non leui iudicio hominū fieri aliquoties sum expertus. Tam exacte veterum, per quos hæc consummatur professio, scripta complexus es: tam diligenter recentiorum examinasti, vt nihil tibi queat imponere. Accedit huc incredibilis per tot annos rerum plurimarū experientia, qua omnes nos per varias mortalium ægritudines, tanquā manu ducis, ac ne alicubi vacillemus, cōfirmas. Tam quantū illud est, quod in maximis occupationibus nunquā intermittis studia doctrinæ. Quippe nihil aut vetus, aut nouum ex doctorum officinis prodit, quod non diligenter legas, discutiāsque. Hinc etiā est, quod omnes qui aliquid de literis possunt iudicare, singulari beneuolentia comprehendas, tueare, iuues. Proinde quicquid operæ in hoc authore castigando insumpsim⁹,

tibi vir clarissime, à quo accepi, nuncu-
 patim dedico, cupiōq; vt Cēlij nostri pa-
 trocinium suscipias. Nam scio non de-
 fore, qui calūniabuntur Veneris sanda-
 lium. Certe author, si quid iudico, lectu
 dignus est vel hoc nomine, vt cognosca-
 mus, quales tādem fuerint, quibuscum
 Galenus noster aēerrime certare di-
 gnatus sit. Item vetustas nō parū apud
 doctos commendari solet. Præterea di-
 ligens illa seu in refellēdo, seu in astru-
 endo vetustissimorum authorum com-
 memoratio plurimum habet authorita-
 tis, eāq; latino sermone, quo hoc in ope-
 re vsus est, græcæ eruditionis, vt cuius
 facile erit intelligere, peritissimus. Cæ-
 terum dictio ipsius, Afrum fuisse testa-
 tur, haud paucis ante Galenū annis co-
 gnitum. Habes itaq; vir excellentissime
 pensum abs te mihi impositum: quod si
 gratum esse sentiam, serio triumphabo:
 si studiosi aliquid, hinc vtilitatis perci-
 piant, percōmode cecidit. Vale ex ædi-
 bus nostris Luteciæ, Calend. Septemb.

I 5 3 3.

CAPITA PRIMI LIBRI.

Primus de phreniticis passionibus.

Vtrum ne sint signa futuræ phreniticæ passionis. Cap. I.

Quæ sequuntur qui in phreniticam passionem proni intelligantur, quos labiles dixim⁹. Cap. II.

Quomodo intelligitur phrenitis. Cap. III.

Quæ sunt huic similes passionēs, & quomodo discernuntur. Cap. IIII.

Quomodo discernimus à phreniticis eos qui in furore febricitant. Cap. V.

Quomodo discernimus eos dormientes ab alijs qui in lethargiam deueniāt passionē. Cap. VI.

Quæ sūt differentiæ phreniticæ passionis. Cap. VII.

Quis locus in phreniticis patitur. Cap. VIII.

Quomodo curandi sunt phrenitici. Cap. IX.

De phlebotomia. Cap. X.

De cucurbita. Cap. XI.

Ad Dioclem. Cap. XII.

Ad Erasistratum. Cap. XIII.

Ad Asclepiadem. Cap. XIII.

Item ad Asclepiadem. Cap. XV.

Ad Themisonem. Cap. XVI.

Ad Heraclitum. Cap. XVII.

CAELII AVRELII
NI METHODICI SICCEN-
SIS CELERVM VEL ACV-
tarum passionum Liber primus.



Iunt Ippallum pythagor-
icum Philosophū inter-
rogatum quid ageret, re-
spondisse, nondum nihil:
Nondū quidem mihi in-
uiderur. Si igitur profici-
entium testis est inuidia,
quæ nobis olim comes est,
magna gerim⁹, in his quæ

gerimus. Placet itaq; Bellice discipulorū summe
celerum passionū libros scribere, quos tibi vtilēs
magis q̄ necessarios fore cōfido. Vtilēs inq̄ vt si
qua forte à Græcis obscurè dicta sunt, reuelētur.
Nōnunq̄ necessarios: hæc enī necessario in quo
sunt posita me tradente legisti. Nam interroga-
tionū ac responsionū libros, quibus omnē me-
dicinam breuiter dixi iam dudum ad Lucretium
nostrū perscriptos aptissime destinaui. Is enim,
vt nosti, ex omni parte Græcarū scientia prædi-
tus est, literarum. ¶ Principio te scire volo om-
nium celerum passionū aliquas esse cū febribus,
aliquas sine febribus. Quarum necessario cū fe-
brib⁹, sunt plurimæ: vt phrenitis, lethargia, pleu-
ritis, peripneumonia. Sine febribus autem syn-
anche, cholera, & id genus, sicut ex consequenti-
tibus docebimus. Sed exordiū sumemus ab his
quæ cum febribus esse noscūtur, siquidem fe-

CÆLII AC V. MORBORVM

bres sunt acutis magis comites passionib⁹, in quibus est phrenitis præponēda. Nomē igitur sumpsit à difficultate mentis, sicuti & dysenteria, & dysuria, quòd urinā vel ventrē impediant. Phrenas enim græce mentes vocauerūt. quare vt supra diximus impedimentum phrenitica ingerit passio. Nam Demetrius Erophilum sequens libro sexto quē de passionibus scripsit, hanc diffiniens, delirationē dixit vehementē cū alienatione atq; febre, & in interfectionē celerē, aliquādo, & in sanitatem. Sed neq; à deliratione vehementi alienationē differte quisquā existimet: quā sanē passionē frequētius cū febribus, sed iugiter ac necessario nunq̃ sine febribus esse accepimus. dehinc vltra disciplinam elatus longa hoc diffinitionē explicasse perspicitur adiciendo cito interficientem esse passionē, vel in sanitatem celerem. Erat facile acutā vel celerem passionem dicere, quòd in vtrāq; partē ocyus feratur, & esset hoc diffinitioni sufficiens. Asclepiades primo libro de celeribus scribens passionibus phrenitis, inquit, est corpusculorum statio, siue obtrusio in cerebri membranis frequēter sine sensu cū alienatione & febribus. Hanc ipse explorans diffinitio nē cum febribus dixisse inquit: siquidē sine his etiam mēte alienantur, vel qui papauer aut mandragoram, aut altercum biberint, aut immensa ira, aut nimio timore commoti, vel moestitia etiam cōpressi, aut epileptica agitati passione, sine consensu (inquit) diffiniens. Ne etiā pleuriticum vel peripneumonicum phreniticū putaremus, qui in statu passionis septima vel octaua die sæpe mētis erroribus agitatur. Eius

sectatores quidam residuā partem diffinitionis
 differentes stationē corpusculorū vel obtrusionē
 aiunt eum dixisse secūdum membranas cerebri,
 si quidem sint etiam medullarū spinæ membra-
 nę. In quibus cū fuerit:obtrusio,nō ingerit phre-
 nitim. Pluraliter autē vsum dicunt,vt membra-
 nas diceret. Siquidē siue per multas, siue per om-
 nes id eueniat,etenim si singulariter poneret,ne-
 garet esse in multis, sed quisquis hūc sequeretur
 vnus esse membranę causam putaret. Frequen-
 ter autem quod adiecit diffiniens,quidam sequē-
 tibus adscripserunt,vt sic intelligamus,frequen-
 ter sine consensu. siquidem cum sensu atq; vehe-
 mēter fiat aliquādo phrenitis. Alij vero ātedē-
 tibus esse inquit iungēdum, vt sic intelligatur:
 frequēter statio,vel obtrusio. Quomodo febrem,
 illam vehemētem dixit,cum de causis tractaret,
 & quæ per stationem vel obtrusionem fuerit,Il-
 lam vero solubilem atq; leuem quæ ex turbatio-
 ne fuerit,liquidarum materialū, atq; spiritus,sic
 etiam phreniticę passionis illam dixit esse vehe-
 mētē quę statione vel obtrusione fuerit effecta
 corpusculorū. Alij vero non inquit quod sine
 obtrusione fiat aliquando phrenitis. Hoc Ascle-
 piadem dixisse accipiamus, sed quia sola ex ve-
 hementi. Sunt etiam quædā in hominibus sanis
 obtrusiones. Erat igitur melius,vt manifestis &
 cum sequentibus verbis intelligendam traderet
 passionem,& non per occultam atq; dissonantē
 obtrusionem,& quę fortasse neq; esse probetur,
 sicut libris quos intra sectas vnus scriptoris do-
 cebimus. Sed neq; oportuit eādem obtrusionem
 simul phrenitim atq; phreniticę passiōis causam

CÆLII ACVT. MORB.

vocare. Siquidem vis loquutionis nihil aliud designet, q̃ phrenitim esse phrenitice passiōis causā. Etenim dicere quod secundum Asclepiadem causa ea scriptionū siue partitionū sint quas Græci categorias appellant, non appellationum quas idem prosegorias vocant. Non enim alienationis aut febriliū, sed alienandi, vel febricitandi causas nominat. sic etiam phrenitizandi non phrenitice passiōis causas dixit. Primo ad aliud ex alia re transire videbimur. Vtrum ne partitionū, aut ascriptionum, an appellationum sint causæ: de qua re cum de passionum causis scribere cœperimus, dicemus. Dehinc paululum progrediens at quæ statio corpusculorū, siue obstrusio in quolibus, vel ex quolibus corpusculis fiat, atq; etiā quomodo ea quæ partib⁹ eueniunt, totū cōmoueāt corpus ac febres generēt. Primo in his quæ decimo scripsim⁹ enodauim⁹. Nūc enim febres, inquit, generent nō febricitare. oportebat autē proprie, non improprie loqui. Alij hæc defendētes aiūt eū verbis significasse phrenitim esse passiōē ex obtrusione effectā. Habet cōsuetudinē pro effectū causas ponere. Deniq; lues diffiniens, lues, inquit, est qualitas insueta, in his, ubi est, locis consistentium animalium, qua ex communi causa facilibus morbis & interfectiuis adficiuntur. Etiam nunc luis causam pro effectū sumpsisse perspicitur. Causa etenim luis est qualitas. Lues autem, decliuitas in egritudinē prona atq; celeberrima cōmunibus antecedētibus causis. Et in alijs vero his vtitur sæpe sumptionibus quas Græci metalepses appellāt, vt exēpli causa, dicat densatū liquorē pro partib⁹ liquoris dē satis. par.

res enim ad totum redigit. Sed neque expiant his maledicta, sed ostendunt etiam in alijs similibus peccatis adfectum. Quærimus enim non si consuetudinem habuit sumptionis faciendæ, sed vtrum hæc consuetudo recta esse videatur. Externa etenim si fuerit hæc à diffinitionibus consuetudo, veniam fortasse merebitur: in diffinitionibus vero non poterit ad veniam pertinere. Oportebat enim diffinitivæ loquētem proprijs vti sermonibus, & non abusiuis, neq; sumptionibus, quæ in contrarium sæpe vocentur. Neque nunc obstrusio causa est phreniticæ passionis, sicut in alijs ostendimus. Neque causam debuit pro effectu accipere, neque in membranis consequentem obstrusionem fieri, sed in sensibus, hoc est in sensualibus vijs, quas græci αἰσθητικὰ vocant. Omnis enim phrenitis alienationem generaliter, cōmuniter autem alienationis substantiam in sensibus constitutam existimauit Asclepiades¹. Denique in diffinitionum libris alienationem diffiniens, hoc genere explicauit: alienatio est passio in sensibus, ex qua aliquando maiores intellectus efficiuntur, capacitate, sensu aliarum viarum, aliquando vero vię capaciores motibus, sed hoc in tardās inquit, ac sine febribus furor vocatur, quæ vulgo insaniam dicunt: recēs autē atq; cū febribus, neq; cū sensu phrenitis intelligitur. si igitur phrenitis passio est in sensu, nō recte eā principaliter diffiniēs obstrusionē dicit esse in cerebri mēbranis. Addo etiam fieri phrenitim ex consensu per seueranti ac vehementi, sicuti ex alijs antecētibus causis. Oportuit ergo etiā in eo quod diffiniēs adiecit, verbum frequētiae seruare ordinē, ne

CÆLII ACVT. MORBORVM

dicendi ābiguitatē daret. Ex qua eius sectatores inter se plurimū pugnauerūt. Mētiſ etia aptiſſime cū ſuā explanās diffinitionē dicit q̄ papauer alienationem facit. Soporiferam etenim ingerit preſſuram . Hoc adeo defendentes quidam eius ſectatores aiunt etia ſomno fieri alienationē. Ipſe deniq̄ Aſclepiades in primo libro celerū paſſionum, furioſos inquit facere ſomnum , ſic etia alienationem faciunt . Hiſ nos respondebimus, diſſerre preſſuram ā ſomno contra naturam. Et enim preſſura intelligitur ſecūdum naturā ſomnus . Papauera autem preſſuram, non ſomnum faciunt. At ſi accipiunt etiam preſſuram ſomnū vocari, quæ neceſſario contra naturam eſt, oportebat etiam lethargos dicant alienari, & erit diffinitio phreniticæ paſſionis lethargiæ cōmunis. Et in lethargis obtruſio eſt ſecūdū Aſclepiadem in membranis cerebri cum febribus ac ſine ſenſu. De hinc etiam in furore febricitantium cōmunis erit diffinitio. in hiſ enim, vt ipſe ait, obtruſionem, in membranis cerebri frequenter ſine febribus atq̄ cum alienatione effectam. Huic occurrentes quidam aiunt quod inquit, cum febribus duo ſignificare. Vnum quod tardantem cum mēbranarum obtruſione longi ſcilicet temporis febrē ſignificet , & non ex ipſa ſoluerit exordium : aliud cum febribus quidem , ſed ex cauſa obtruſionis membranarum, febres oriuntur parue atq̄ immitiuſculæ, in hiſ, & imminutiſſimis ſiunt plagæ ſiue percuſſa, atq̄ adfricationes quæ corpori minime accēdere feruorem poſſint. Sed etiam nunc conſitentur confuſum dictum, ſi ex hoc duo ſignificat alterum ex hiſ verum , alterū

fallum, dehinc febres fieri in phreniticis ex obstrusione membranarum solitum accipiamus, eorum tamen dictis repugnans. Additur enim alienatio cum febribus, denique etiā obstrusio ex qua alienatio fiet. Quod igitur secundo sequitur, causa prioris esse non potest. Addo etiam febres quę per totum corpus causam earum ex obstrusione membranarum factam quo totum corpus accēdatur, ratione carere. Etenim in epilepticis quib⁹ etiam raptus omnium membrorum ex cerebri membranis, atq; maiore causa secundum Asclepiadem descēdit, quapropter etiā phlebotomiā probat adhibendam, oportebat magis ac vehementius febrem accendi. Siquidem maiora corpuscula maioribus mista cum toto maiores faciunt plagas siue percussiones & adfricationes. In libris denique diffinitionum phrenitim inquit esse alienationem repentīnam cum febribus. Sed etiam nouus furor, quem insaniam vocant, sæpe mouetur cū febribus. Nos igitur manifeste atq; breuiter quantū res patiuntur intelligentiā, siue diffinitionem passionis trademus, dicentes, phrenitim esse alienationē mentis celerē, cū febre acuta, atq; manuū vano errore, vt aliquid suis digitis attrectare videātur, quod gręci Crocydismon, siue carphologiā vocāt, & paruo pulsu ac denso.

Vtrumne sint signa phreniticę futurę passionis.

Cap. I.



E hinc quærēdum vtrum ne sint signa phreniticę futurę passionis. Nā multi sectarum principes iter quos fuit & Asclepiades signa futurę passionis posuerūt. At Thessalus & ei⁹

CÆLII ACVT.MORB.

sectatores, id posse fieri negant, dicentes quia nō futuræ phreniticæ passionis signa vera atque necessaria fuissent. Oportebat autem omnes in ijsdem cōstitutos necessario esse phreniticos. Nūc vero quidam cum his afficerentur signis, in phreniticam passionem non venerunt. Secundo oportebat etiam aliarum passionum futurarum esse signa. Nullius autem futuræ passionis signa esse perspicimus. Neque igitur phreniticæ passionis esse posse signa credamus. Sed neque præstantius quicquam antecedentium causarum, vt adustio, cruditas, vinolentia, atque exercitium post cibum, vel mansio, siue somnus, in speluncis confertur, aut noua politura in muris parietis cubiculorum. Hæc alias quoque passionibus ingerunt generaliter, vt lethargiā, apoplexiam, epilepsiam. Neque multos tempore certo specialiter phreniticam incurrere passionem, vt autumnō vel alio quolibet firmum esse credamus. Incertum est enim, siquidem non omnes phrenitici efficiantur, sed alij diuersis afficiantur passionibus. Neque etiam vigilare, ac iugiter cum dolore urinam reddere paruum vel plurimum, atque grauedinem vel dolore capitis, vel occipitis, vel clunium affici, aut oculorum rubore. Hæc enim signa communia sunt passionum, quæ vexata membrana cerebri fiunt, atque male laborantiū ægrorum non necessario omnium ac semper phreniticorum. Dehinc audacia sine ratione, vel e contrario securitas & hilaritas nō futuram, sed præsentem alienationem designant. Hæc expugnantes Asclepiadis sectatores contra primum responderunt, quanquam inquirunt signis futuræ pasi-

sionis ægri afficiantur, ratione tamen certa non
 in ipsam plerumque veniunt. Si quidem immi-
 nentem passionem cohibeat Medicinalis vera cu-
 ratio, quod inquiunt debemus diffinitione expli-
 catum accipere. Etenim furore febricitantium,
 non ex obstrusione membranarum quæ non si-
 nat initium sumere. Non igitur negant signa
 fuisse futuræ passionis. Dehinc signorum quæ-
 dam inquiunt secundum Asclepiadem esse ne-
 cessaria, vt cordis vulneratio mortis signum: quæ-
 dam non necessaria, sed frequenter futura signi-
 ficantia, sicut membranę capitis vulneratio mo-
 riturum vulneratum significat. frequenter enim
 hoc non iugiter, ac necessario contingit. & fu-
 tura igitur phreniticę passionis signa frequentia
 non necessitatem futurorum designantia. quæ
 propter manet genus futuræ phreniticę passio-
 nis insignis. Quanquam necessario in eam veni-
 ant ægrotantes. Contra secunda vero hæc pro-
 bauerimus & de singulis scribes docebimus.
 Dehinc potest etiam soli phreniticę passioni hoc
 priuatum inueniri. Vt enim ab alijs passioni-
 bus differt, sic etiam cum nondum est, differt
 cæteris respondentes aiunt antecedentes causas
 quas procatacticas appellant, singulares qui-
 dem non esse futuræ passionis signa, neque rem
 sine tempore neque concurrentia vt forte oculo-
 rû sanguinolētia, vel capitis grauedo, sed in vnū
 coactiata, atq; concurrentia. Audacia vero sin-
 ceratione atq; hilaritas certa significatiōe dictās
 signa futuræ phreniticę passionis sicuti & in ex-
 ternis, quanquā præsentia paruitate iam latētia
 pro futuris accipim⁹. Igitur Thessalus Primo li-

CÆLII ACVT. MORBORVM

bro diætetico præcepit phlebotomari in strîcturâ magnam venturos, atque hos ita designat iugiter febricitantes & vsque ad dimissionis tempus submerso pulsu affectos, frequenter vel cum dolore vrinam reddentes, cum hæc præsentis iam sint vehementiæ signa, non futuræ. Ex ea enim significatione futuram dicunt intelligi phrenitim quæ non naturalis est, sed multorum placitis est firmata. Dehinc præsentis passionis signa necessaria esse confitentur. Aiunt enim quædam esse quæ futura denuntient, quædam quæ sæpe futura, quorum secunda futuræ phreniticæ passionis esse dicunt. Siquidem non necessario sequatur. Quid enim est repugnâs? omne etenim signum ad eam rem quam significauerit intelligitur, est enim ex his quæ ad aliquid intelliguntur. Quomodo igitur signum vocari potest cuius non solum præsens non est quod ostēderit, verum etiam in quibusdam neque erit. Secundum nos itaque decliuitatis atq; pronæ ægritudinis in phrenitim recte nuncupatur, vt labiles in passionem ægros pronūtiemus, quos græci *ἐν νόσῳ οὐς* totius appellatione vocant. Ipsius enim verbi qualitas, siue veritas excussa designat, aliquid esse, quo res ferantur nec tamen necessario vêturæ. Signa igitur res ipsa semper præsens, quæ significatur, ostendit. Qua sæpe etiam futura noscuntur. Alia vero esse signa decliuitatis ī phrenitim. Alia in lethargiam, atq; cæteras passiones, ex his reddere cœperimus, cū sua suis manifestabimus.

Quæ sequuntur eos qui in phreniticā passionē
pni intelligant, quos habiles diximus. Cap. II.

IN phreniticam igitur passionē pro-
nos vel decliues sequitur febris acu-
ta, atq; difficile ad superficiem cor-
poris ascendēs, pulsus humilior, den-
sior, vultus subinflatus siue plenus,
sanguinis p nares destillatio, vigilię iuges, aut tur-
batus somnus, & insania turbulenta, mentis solia-
citus, ac prauitas sine ratione, frequens tergorū
est versio iacendi cum capitis assidua commuta-
tione. Aliquando etiam sine causa hilaritas, ocu-
lorum rubor cum leui lachrymatione, & circum-
sectio manuum sine vilo capitis dolore, articulo-
rum frigus sine tremore, vrinę abundantia flauę,
aquate, tenuis, & paulatim exclusę. aliquibus eti-
am sonitus capitis atque aurium tinnitus: dolor
quoq; capitis repente non quiescit, nulla ex ma-
nifesta ratione præcordiorum etiam tensio, visus
attentus vel frequenter palpebrans. quidam me-
dici ex quibus sunt Asclepiadis sectatores, etiam
attendunt aëris qualitatem, quam græci catastes-
ma vocāt, & tempus, & antecedentes causas, &
naturam, & ætatem. Aëris inquiunt habitu ne-
quis cale scat quod eius causa plurimos afficiat vt
sæpe oculorum lippitudines vel vlcera. Temp⁹
autem, vt æstatis finem vel autumnum. In his
enim aiunt hanc frequentare passionem. Antecē-
dentes inquiunt causas, vt vinolentiā vel vigilias
ac iuges adustiones, naturam inquit, ægrotantis,
vt si fuerit mēte mobilis, atque iracundus, vel in
disciplinis literarum exercitatus, aut capite debi-
litato & facile inflationem sentienti, vel si quos
b.j.

CÆLII ACVT. MOR B.

ties ægritudine afficitur facile alienatiōe vexetur, ætatem inquirunt si iuuenis. Omnia quidem sunt prouidenda, non enim ex vno vel duobus, sed ex multis concurrentibus, significatio firmatur. vnū etenim quiddam etiam ad aliud quiddam commune est. At vero in vnum conueniens multorū concursus, discretionum facit intelligentiam prominare.

Quo modo intelligitur phrenitis.

Caput III.



Intelligimus phrenitim ex toto signorum concursu. Vnum etenim singulare quicquam, vt est alienatio, vel febricula nō designat phreniticum, sed si multa concurrerint, quæ nihil aliud quàm passionē designent, vt sit significatio quæ vt suprā diximus ex multis confecta, vnum faciat signum, & significans eius rei quam demonstrat. Quare vt dixi intelligimus phrenitim ex concurrenti febre acuta, & alienatione & pulsu paruo atque crebro at testāte carphologia & crocidismo. Ex his enim intelligitur passionis genus: magnitudinis vero atque proprietatis differētiā, plurima atq; alia sunt quæ designant à græcis symptomata appellata, vt febris cōtinuæ, vel hemitriteas esse, vel inæquales, atque superficiem corporis difficile ascēdentes, alienatio intra diatria, vel post diatria tēpus, iugis aut intercapedinata, cum risu tacito, aut cum cachinno, & cātilena vel certe moestitudine, silentio, vel murmure, aut vagitu, aut leui se-

cum sua ipse mullitatione, vel mētis indignatione, vt in furore exiliēs difficile teneatur, atq; omnibus iracundus sit, & exclamet, vel sese percutiat, aut suam vestem atque propinquantium scindat, aut metu se abscondendum existimet, aut lachrymetur, atque secum loquentibus non respondeat, cum loquatur tanquam visis & non solum visis, sed etiam mortuis: & neque potum potstulet neque cibum, aut acceptum vehementer inuadat, & immasticatum transuoret atque masticeat. Neque transuoret, sed in ore contineat, & post paululū piciat, lucē quoq; aut tenebras fugiat, adsint etiā vigiliæ iuges, aut paruus & turbulentus somnus, oculi sanguinolenti, cum tensione venarum suarum & fixo visu atque sine vlla palpebratione, aut multum mobili, & cum iugi palpebratione. Aliquando etiam manus ante oculos præmissione, quasi aliquid apprehendere, vel detrahare volentium, quod aut inhæsisse oculis, aut ante volare ægrotanti videatur. Vultus etiam quibusdam collectus atque conductus, genarum rubor perseuerans, aut per interualla in pallorem mutatus, capitis siccitas quæ statim ebibat fomenti liquorem, dentium stridor, guttæ sanguinis leuissimæ per nares, capitis frequens alienatio, cum aurium intentione, vt aliquid audire videatur, indecens iacendi positio, pedum quoque iugis ex alto submissio, corporis vacua fortitudo, articulorum iugis torpor, raptus etiam, vel attractio coepimentorum à pedibus ad superiora, ventris fluxor, vrinæ aquatæ, vel felleæ cum nubeculis portetuosis, vltimo quibusdā etiā vultus mortuosus,

CÆLII AC V. MORB.

alijs cum collo subinflatus, manuum tremor, pulsus creberrimus, atque submersus & tremulus, & imbecillis. Aliquando etiam deficiens & in similitudinem oleo defecti luminis marcescens, præcordiorum vehemens tensio, atque ad superiora adductio, singultus, lingue impedimentum atque loquutionis inapprehensibilis articulatio. Dehinc quibusdam diaphoresis, quibusdam spasm⁹, aut pressura quæ lethargicam passionem attestantibus cæteris denuntiet, hoc pulsus inducit celestes: multos, aut paruos saltus. In magnitudinem erectio quæ sita & ægrotanti incôgrua atque subinanis. Releuatis autem atque ad sedem pergentibus omnia supradicta minuuntur. Grauius autem ac perniciosè affici dicimus eos quos ut supradictos plurima atque varia fuerint secuta & iugi & sine vlla indulgia laxamenti. Peius autem laborare dicimus eos qui post primam diatriron fuerint hac affecti passione, quam qui ante ipsam. etenim præsauciatis viribus quicquid adhibetur graue atque indignum adiutorium, vel phlebotomice quæ principaliter temporis causa adhiberi prohibetur. Exitialiter etiam affici dicimus eos qui asperrimi atque audaces fuerint ægrotantes. Infontine etenim etiam sanis fructuandi esse perspiciuntur. Nec non etiam qui subridere videntur, & stridore dentium, aut singultu affici. His etiam spasmus imminere significatur. Grauius etiam si mutabiles fuerint colore, & tremuli & stertentes, aut fastidiosi per omnia. Aliarum vero principes sectarum iuxta ætatis differentiam grauius affici dicunt, iuuenes à cæteris ætatibus, iuxta sexum & naturam viros, ac

foeminas, quomodo etiam sapere plus est in iuuenibus, atque maioribus. Maius enim fit malum, firmitate reliqua adiutū. Dehinc etiam illos qui natura fuerint tristes & in passione cum ridiculo delirauerint, aut rursus hilares natura atque cachinnosi cū iracundia & mœstitudine egrotātes grauius affici dicunt. Siquidem nulla vestigia ex his quæ sanitati fuerint consueta, remansisse videantur. Nos vero dicimus communiter grauius laborare quos passionis adficit magnitudo. Illud enim semper in ægritudine magis afficit, quod à natura plurimum recesserit.

Quæ sunt huic similes passionēs, & quomodo discernuntur.

Caput. IIII.



Similes sunt atque vicinæ phrenitice passioni ex ipsa alienatione, furor quam vulgo insaniam vocant, melancholia, pleuritis, atque peripneumonia: quæ sæpissime accessionis tempore alienationem faciunt. Item mentis alienatio. In his qui mandragoram, aut altercum biberint. Internoscuntur autem furentes atque melancholici à phreniticis. siquidem alienatio sine febricula, atque crocidismo, vel carphologia esse videatur. Dehinc tarde sæpissime atque sine passione. Item melancholia fellis nigri vomitum faciat stomacho patiente, aut plus à cæteris corporis partibus ægrotante. Præstantius autem odisse homines facit, atque vultus colorem plumbeum. Item vt pleuritis & peripneu-

monia & omnes passionēs, quæ ex dolore accessiōis tempore alienationem faciunt, internoscuntur hoc modo, Primo quod cum dolores asperantur, extenditur atque consurgit alienatio, & eorū indulgentia minuitur, quippe leuis atque solubilis deliratio. Nam phreniticorum si ex consensu fuerit, facta tamen, & non semper accessiōibus aucta, aut demissionibus minuta, sed magis intardans atque perseverans perspicitur. si vero potio malo medicamine, vel alterco alienentur, discernuntur secundum interrogationem præcedentes causæ. sed quia etiam de medicamine potio potest phrenitis euenire, (Non enim præordinatæ atque fixæ sunt necessario eius antecedentes causæ) ad interrogationem præcedentium causarū æger credibilis esse non potest, item externi, hoc est, ab ægro alieni antecedentia nescire possunt, totius differentiam accipimus, vt si non febricitat hoc sit signum internoscendarum causarum, si autem febricitat crocidismus atq; carphologia & densitas pulsus absint. His enim qui mandragoram vel altercum biberint rarus est pulsus.

Quomodo discernimus à phreniticis eos qui furore febricitant.

Caput. V.



Quomodo furentes siue insanos à phreniticis sola febriū sinceritate omnes sectarū principes decreuerunt, & sæpe etiam febris ex alijs causis his passionib⁹ incidit. Oportebat hos etiam cum febribus furore delirantes à phreniticis discernere. Non quidem mutandæ curationis causa. Omnes etenim passiōes celeres

supradictæ atq; tardæ, sed insuper positione constitutæ, quam græci epithesim vocant, laxatiua atque mitigatiua indigent curatione. Sed ad demonstrationem, quo probemus etiam specialium vti discretionem, hæc posuimus. Est autē vtilissimū etiam localibus adiutorijs, vt patientibus locis, vel plus patientibus curationem adhibeamus. Nam phreniticis atque furiosis caput magis, melancholicis stomachus patitur. Igitur non febricitare furiosos percunctatum non est siue vniuersale, quod græci catholicon vocant, sed est discretionem partile. siquidem, vt diximus, quidam febribus afficiantur, sed phrenitici acutis, vel celeribus, furiosi vero tardis, quanquam sit etiam hoc insufficiens discretioni propter eos qui repentinō furore agitati febricitant: remanet, vt ordine accidētium discretionē faciamus. Præcedit enim febrem in furiosis alienatio, in phreniticis vero febricula alienationem: sed quia aliquādo potest furentum alienatio concurrens febriculæ latere, aut ordinis, aut interrogationis, vt supra diximus causa, si quidem ab ægro narrari non possit, aduertamus in phreniticis paruum atque crebrum esse pulsum necessario, in furiosis vero maiorem. Sed quia initij, vel augmenti accessionis febrium par in his atque creber pulsus esse potest, declinationis autem atque indigentię maior, illud aduertere debemus: quia in phreniticis etiam tunc paruus atq; dēsus perseverat, vt discretionē magis ex pulsu faciamus, quanq̃ etiā ipsa infirmetur sæpe febrium nequitia, quæ vt in alijs passionibus sic etiā in furiosis pulsum paruum atque densum seruat, ita discerni vel in-

ternosci potest cum neq; crocidismum in egrotantibus viderim⁹, quod est ex operimentis simbriarum veluti decerptio: neque carphologiam, quæ est festucarum leuium à parietibus veluti detraçtio, quam necesse est phreniticos facere. Quæ denique si furiosis aduenerint, in febribus constitutis, in phreniticam passionem, ex insania venisse pronuntiamus, tanquam rursus & phrenitica passio recedentibus proprijs signis, hoc est, supradictis in furorẽ transeant. Non aliter quàm si etiam alijs id testantibus signis, in lethargiam veniant, vel certe releuati ex lethargia, in phreniticam redeant.

Quomodo discernimus dormientes phreniticos ab his qui in lethargicam deueniunt passionem. Caput. VI.



Quomodo phrenitici aliqui augmento passionis in lethargiam, aliqui declinatione in somnos deueniunt, & cū aspectu cōmune quod vtrique non sentiunt atq; multos inexcercitos medicos errore fefellerunt, vt dormientes tanq̃ depressos excitarẽt, aut opp̃ssos tanq̃ dormiẽtes sine adiutorio passioni traditos, reliquissent. Vtilẽ ducimus eorũ discretione faciendã. discernũtur igitur colore, caractere, respiratione, pulsu, tactu, schemate iacẽdi, febrũ magnitudine. Colore inq̃, dormiẽtiũ enĩ mūdũ corpus, atq; floscule viuidũ & naturali habitudine plennũ. Oppressorũ vero in lethargia passione pallẽs, vel plũbeũ, vel quolibet alio colore affectũ, iueniũt. Character aut̃ dormiẽtiũ hilaris, lethargicorũ tristis inueniũt. Itẽ spiratio dormiẽtiũ ordiata, lethar

gicorū tarda esse probatur. Pulsu etiā discretio-
nē facimus, & quanq̃ vtriq̃ subinflat⁹ atq; ma-
ior, tamen cū inanitate in lethargis, cū plenitu-
dine dormientibus inuenitur. Tactu autem le-
thargis etiam præcordia distenduntur plurimū,
& totum corpus durius fiet ob nimiam strictu-
ram: dormientibus vero econtrario, quia strictu-
ra minuitur. Etiam præcordia relaxantur, & to-
tius corporis tactus mollior efficitur. Schemate
iacendi discretio fiet. Siquidem lethargi à capite
lecti ad pedum loca labantur, & incompósito,
vel indisposito iaceāt corpore. Dormientes vero
congrua naturę positione cernantur. Magnitudi-
ne inq̃ febrium, dormientium enim minor ac le-
nior, lethargorum maior atq; aspera febricula in-
uenitur. Quapropter obseruanda sunt etiā tem-
pora. si enim in declinatione passionis, & in di-
missione vel declinatione accessiōis sensus ægro-
tantium quieuerint, intelligimus somnum. Si ve-
ro in augmento passionis vel accessionis & ma-
gis in eius initio, vel augmento id acciderit, le-
thargum pronuntiamus.

Quæ sint differentię phreniticę pas-
sionis. Cap. VII.

Differētias phreniticę passionis qui-
dam ex accidentiū proprietate fa-
ciendas existimant. Aiunt denique
aliā esse alienationē cū risu atq;
puerili saltatiōe. Aliā cū mœrore
atque exclamatione vel silentio aut timore. Nos
vero aliā dicim⁹ esse ex strictura, aliā ex cō-
plexione stricturę atq; solutionis. Est enim verū
ita discernere, vt non accidētium diuersitas pas-

CÆLII AC VT. MORB.

sionis differentias ostendat. Sed generalis quædam ac necessaria designatio, quæ fiet vt supra diximus ex principalibus passionibus, vnde etiã curationum ratio sumatur.

Quis locus in phreniticis patitur.
Cap. VIII.



Væsitum etiam quis locus in phreniticis patitur & magis à principibus aliarum sectarum, vt secundum differentiam patientis loci curationes adhiberēt, & localia locis adiutoria comparent. Nos autem siue locorum siue vicinitatis eorum causa generalem curationem non mutamus. Non est enim sub eodem genere iacens locorum necessaria differentia. aliqui igitur cerebrum pati dixerunt, alij eius fundum, siue basin quam nos sessionem dicere poterimus: alij membranas: alij & cerebrum & eius membranas: alij cor: alij cordis summitatem: alij mēbranam, quæ cor circumtegit: alij arteriarum eam quam Græci ἀόρτην appellant: alij venā crassam, quā iisdē φλέβα παχέαια vocauerūt: alij diaphragma: & quid ultra tendimus quod facile explicare possumus, si id quod senserunt dixerimus. Nam singuli eum locum in phreniticis pati dixerunt, in quo animæ regimen esse suspicati sunt. Denique singulorum iudicium atque assertionem pertractantes expugnabimus libris quos de passionum causis scribemus. Nos igitur communiter totum corpus pati accipimus. etenim totum febre iactatur. Implet

denique phreniticorum significatione febrium signum, quapropter totum corpus curamus, sed plus pati dicimus caput. etenim antecedentia demonstrant signa ut eius grauedo, tensio, dolor, sonitus aurium, tinnitus, siccitas atque sensuum impedimentum, & cætera quæ iam passionis præsentis esse signa noscuntur, singuli sensus suo careant apprehensionis officio, palpebra dura, oculi sanguinolenti, ac prominentes, genarum rubor, venarum extensio, vultus inflatio, ac plenitudo, linguæ asperitas. Eos vero qui nos ex naturali tractatu, quam Græci physiologiam, patientem locum apprehendere dixerunt. (Siquidem prænoscentes animæ regalia in capite constituta, exinde mentis alienationem fieri acceperimus) ita expugnamus, ut primo regale locum maternum remanserit. Sed nos varietas atque multitudo accidentium in capite signorum, plus à cætero corpore docuit pati. Sed aut faciem magis plurimis signis affici, & propter ea huic esse adhibenda adiutoria. Nunc vero cucurbitam occipitio apponitis. Si quidem per apertionem, quam Græci anatomiam, didiceritis sensuales vias inde sumere exordium. Hic rursum similiter eos peccare perspicimus, etenim faciem curamus cataplasmate, atque vaporisatione: atque occipitium tanquam dolens & extensum apposita cucurbita scarificamus, sicut etiam alias partes atque præcordia si in tumore fuerint constituta. Explicata variæ passionis apprehensione ad eius curationem transeamus.

Quomodo curādi sunt phrenitici. Cap. IX.



Vomodo curationib⁹ principio locus aptād⁹ est: iacere oportet phreniticos, in loco omni ex parte deuio: ne aliqua transeuntium voce pulsantur: fenestris etiā altioribus luminato. Sæpe enim in passione constituti alie natiōis causa sese præcipitantes latuerūt. Dehinc ob obscuratiōis proprietatē strictura laborātes, in lucido atq; tepido & amplo mediocriter locamus. Etenim vltra modum feruēs naturaliter febricula caput incendit, & rursum frigidus cōstringit atq; corporis auget densitatem. Item nimium lucidus membranā percutiet cerebri immodici splendoris causa. paruus etiam si fuerit atq; humilis tecto, suffocabilis erit aeris paupertate. Sit etiam sine vlllo picturæ figmento, ne visa ægri ex picturis mēte accipientes, quæ Græci phantasmata vocauerūt, plus asperentur, aut in risum soluātur. maxime cū ratione careat, multorum ingressum aut frequentiam prohibere, & pictura occasionem lacerandę mentis acquirere, cum iugī visu falsa coguntur pro veris accipere. Hinc etiam splendidi colores parietum siue straminum vel operimentorum prohibendi. Resultantes enim, vt ita dixerim, percutiēt visum. solutione autem optinenti laborantes econtrario iacere oportet loco medie obscuro, atq; refrigeranti. neq; enim nimium frigidus, neq; obscurus passionis mitigare celeritatē potest. stramenta etiā omnibus mollia atq; operimenta cōueniunt: sed tenuia solutione laborantibus, corpulenta vero atque calida strictura affectis. Sic

etiam lectus omni ex parte firme locatus, vt cū fuerint impatienter iactati vel necessitate cogēte deuicti, immobilis perseveret. forib⁹ etiā atq; fenestra auersi, ne ingressu hominum asperetur. At si etiam alienatio fuerit principali passioni contraria, vt stricture laborantes lucem odisse faciat, solutione laborantes tenebras, oportet alijs oculos tegi, alijs tenue atq; blandum lumen immittere, lucernæ aut lucis etheriæ, sed arguto vsu machinatū, quo velim per quandam cauernam, ægrotantis vultum perfundat, & nullas tangat alias corporis partes. Sic etiam mitigabitur alienationis augmentum & adiutorium passioni aptum congrue seruabit qualitatis effectum. Laxat enim, vt supra diximus, lux colore quo videtur, sed consequenter necessario suæ tenebitatis causa manet cætero circumfusa corpori tametsi non uideatur. Similiter etiam obscuritas vel tenebræ si fuerint ægrotantib⁹ odiosa & curationi necessaria, erūt artis astutia cōponenda. Sed si ita fuerint alienatione commoti qua obscurari totum vel luminari velint, erit coniiciendum vt, quibus obscurum aerem fecerimus calidum tamen faciamus, quibus autem lucidū eōtrario vero frigidum faciamus, vt & congruam passioni seruemus qualitatem, & eorum furorē mitigando nō asperemus. Si vero nihil ægrotantes praua cupiditate turbauerit, seruabit lucem stricture, obscuritas solutione laborantibus adhibenda. Vel quomodo turbatio atq; motus & iactatio corporis celeritatē asperat passionis, erit aliquando mitigandi furoris causa ægrorum voluntati seruiendum. Istringitur enim magis solu-

CÆLII ACVT.MORB.

tio, vel stricture laxatur, si grauiorib⁹ auersis parua contrarietate vexentur. stricture laborantib⁹ obscurum, siue solutione laborantibus lucidum adhibendum iudicamus locum. Dehinc si stricture obtinuerit, conuenit ægrum vsque ad accessionis declinationem vigilare, tunc somno dimitti. At si longa fuerit accessio, etiam ante dimissionem somnus poterit adhiberi. Maior enim ab intemporalis somno vigiliarum est vexatio. Siquidem etiam vires ægrotantes insinuat. Dehinc iudicio nostro abstineri vel tolli non potest, somni autem intemporalitas si fuerit interrumpenda, excitare dormientem poterimus atque soporis oppressionē prohibere. Delirationes vero ægrotantium vsu dextero atq; artificio feruentes accipere & tolerare debebunt, vt alijs assentiant, alias uero consentientes redarguant, ne frequenti correctione asperos faciant ægrotantes. Denique si quos sanitatis tempore inuisos habuerūt, intrare prohibemus, ne his visis asperentur. Eos vero quos metu aut verecundia coeluerunt, per interualla intrare permittimus: parit enim frequentia contemptum. At si exilire de lecto viderimus nimietate furoris, melius erit plurimis vti ad remedium ministris, sed qui possint lenitate retinere, vt etiam laxamentum stricture præbeamus. Vel si fuerint qui vt supra diximus teneant, aut ipsorum visu commoti fuerint ægrotantes, ligationibus vtimur, sed prætextis lana aut veste locis, quos vinculis neccim⁹, ne maior utilitate quiescendi imprimatur vexatio. Ligationibus etenim immodice constricta,

necessario tumescūt , propterea omnis in peius extenditur passio. si linguæ atque totius oris siccitas fuerit, oportet spongia tenera, aqua calida infusa, atque mediocriter expressa, sensim vniuersa quæ siccauerunt, humectare, non sine cautione. adiunctos enim sæpe digitos spongia, alienatione coacti ægri momorderunt. Quapropter, si fieri poterit, cogendi sunt, vt exerāt linguam, atque ita supradicta faciamus. declinante accessione, hoc est, cum è uisceribus reclusus feruor ad superficiem corporis atque articulos venerit ægrotantis, pulsus quoque densitas, & humilitas in amplitudinem atque raritatem venerit, oportet pubetenus, hoc est, inter umbilicum & pectinem, quod Græci ἡττορ appellant lanas oleo calido expressas apponere, quæ omnia etiam vicina contegant, vt inguina, atque vesicæ partes, vel si qua ventrem contegant: fouendum caput oleo dulci atque calido. Dehinc alienatione perseverante etiam calida cum oleo mixta, quod Græci vocant hydræleon. Paulo etenim vehementius hoc genus fomenti operatur, si vt supra diximus oleo aqua calida misceatur, vel fœnugræci, aut lini seminis succus. Sed hæc singula sine ullo esse odore debent, atque nullo fumī afflatu vexata, ne caput impleāt, & alienationem exasperent. At si adiuncta fuerit stricturæ solutio, vt aut venter fluens, aut sudores esse videantur, caput supradicto modo, atque fomentis supradictis curabimus. etenim alienatio, tumore membranarum cerebri fiet. Medias uero partes frigido ac viridi curabimus

DE CÆLII ACVT. MORB.

oleo. Si autem plurima atq; superans fuerit & occulte in diaphoresim venire posse ægrotantes viderimus, tunc etiam caput dulci quidem, sed frigido oleo fomentamus. etenim frigus diaphoresim, dulcedo strictionem temperat. detergendus etiam erit sæpissime sudor, qui per vultum atq; thoracem emicuerit, spōgia molli. At si pl⁹ fuerit extentus, vt integros solui videamus, etiā flabis vtimur, non quidem sine respectu alienationis. etenim si strictionem ea curatione mitigari videamus, audacius id facere perseverabimus. Si autem asperari senserimus, erunt minuenta quæ gerimus, conijcientes, non tantū solutionem constringi adiutorijs, quantum alienatione augetur. Nanque necessario requies congrua solutioni atq; xnoius motus accipitur. declinate accessione os colluere iubem⁹ ægrotantē ex aquā calida, vel si impatienter siti iactatur, dabimus ei potum, sed strictione sola laboranti, plurimum: ut densitas irrigetur. solutione laborati, parū: vel si plurima cogit solutio, etiā frigidū.

De phlebotomia.

Cap. X.



AT si sola atq; vehemens strictione egros in phreniticā extemplo passionem perduxerit, designat adhibendam esse phlebotomiā, permittentibus viribus: atq; si passio cogit, intra diatriron: si minus, in ipsa prima diatriron: ultra nūq. vexatur enim in eiusmodi ægritudinibus corporis vires. phlebotomandi autem disciplinam, vel magnitudini passionis moderationē faciendi cōgruam, libris quos de speciali bus adiutorijs scripturi sumus, docebimus: prin-

cipaliter monētes ne vsq; ad animi defectū, quē Græci lipothymiā vocant, adiutoriū tendere nitamur. Timendum enim hoc sæpe est accidens, quod Græci symptoma vocant: quanq̃ in omnibus passionib⁹ siquidem sit mortuosum, plus tamen in phreniticis afficitur male præacta nervositas. Dehinc post phlebotomiam caput similiter fouemus, atque occipitiō lanas oleo calido ac dulci madidas apponimus. Similiter etiā vertebri, quas Græci *ισχία* vocant, præcordijs etiā am atque pectini. Hæc enim necessario in phreniticis passioni consentiunt. At si intra diatriutū, vt supra diximus, phlebotomia fuerit adhibita, post paululum os colluere aqua calida ægrotantes facimus: potum quoq; dabimus: dehinc dormire permittim⁹. Sin verò in ipsa diatriu phlebotomia adhibita cum adiutorio motus quieuerit, oleo ægrotantium corpus perungendū erit, atq; à ministris facies lauanda, vt alienatio nullo nouorum vultu asperetur. Noti enim vsu prudentes delirationes faciunt, non resistendo. Præsentibus etiā his quib⁹ vt supra docuimus ægrotantes verecundiā debent. Cibum dabimus simplicem, digestibilē, paruū, laxatiuum, vt est alica, calida aqua, aut muls decocta, vel panis ex aqua calida, aut alica supra dicta sorbilis facta, vel ex melle atq; oleo & anetho, & sale paucissimo præcocta. Solutione autē laboratibus pultē dabim⁹, atq; panē & oua *ἀπαλά*. Dehinc ōnes somno dimittim⁹, vel si minime dormire potuerint, quiescere tamē iubemus. Nō enī min⁹ somnus cibo reficit opportun⁹. Dehinc alia die à cibo abstinemus, fomēto atq; potu vtētes. Secūda

CÆLII ACVT. MOR B.

vero diatrīto si vēter suū non agnouerit officiū, clysterem adhibebimus ex aqua & oleo calido, vel decoctione fœnugræci aut lini seminis, cum oleo, etenī intestinorū siccitas rigatur, & aliena quæ retinebātur excludentur, & acrimonia quæ ex ipsis nascens ex alienatione quadā capitis tumētia aspernabat, detrahetur, atq; ipsum caput localibus adiutorijs melius præparatur. Tū post intellēctionē medias partes cataplasmate curamus ex fœnugræci & lini seminibus admixto polline, quod Græci maſton vocant, & est omnibus ysitatū. Dehinc simili supra dicto cibo vtemur. Alia vero diatrīto caput detondemus, etenī detractis capillis partes reflantur plurima grauatione liberatæ. Tunc post tonsuram lanis oleo calido expressis caput tegemus.

De cucurbita.

Cap. XI.



Lia dehinc diatrīto rasis partib⁹ cucurbitam apponimus occipitio mitigāter atq; sub ipsa fronte sanguis sugas facim⁹ inhærere quatuor vel quinq; ut non ex vna parte detractio fieri sanguinis videatur, sed veluti circulatis totum spiret atq; reueletur caput. At si plurimū laxamentū facere voluerimus, totū caput rademus & per circulū plurimas cucurbitas affigim⁹ alterā occipitio, alterā medio capitis, quod Græci bregma vocāt, alias duas superius à tēporib⁹, sed neq; cū multa flāma, neq; multo tempore immorari. Arentes enim atq; siccatae facile commouēt caput, implēt, ac mētis faciūt alienationem augeri. Ita detractis cucurbitis si partes erubuisse viderimus, leniter scarificamus, si minus

mitigamus vaporātes spōgijs , sine nimis calidis relaxamus:vapore etenim nimio tanq̃ frixantes densamus . Quapropter vt supra diximus post iugem atq; temperatā vaporatiōē vbi partes rubuisse viderimus scarificamus. Pōst nanq; etiā vaporatio ante cucurbitæ appositionē adhiberi debet, ne plurimū infixa immoretur, & inde partes radi videantur. suppositis ergo cucurbitis cū sufficientem locorum verticē factū viderimus, scarificamus. Si enim nō solū cucurbitæ quassatio mitigatur, sed etiā fluoris sanguinis facilitas fiet , explicita scarificatione rursum cucurbitas imponimus, vt sanguinis detractiō fiat. Sed eo tempore capiti atq; collo & vicinis partibus leues erūt cucurbitæ apponendæ, quo in laxamentum cōsentiāt. At si in præcordijs tumor fuerit, erunt ipsa prius scarificanda, sic etiam & vesicæ partes vel vicinæ ei⁹. Tūc in alia diatrīto caput, dehinc clunes etiā simul scarificare noxiū atq; vexabile est. Erit eni ei⁹dē tēporis multas per partes effecta sanguinis detractiō phlebotomiæ quæ necessario vires absumat. Quapropter paratim erit adhibēda cucurbita, vt exēpli causa, nūc præcordijs atq; pubeten⁹ prærasa capillatura, nūc capiti, nūc clunib⁹, ac vertebrotē⁹ quod Græci ἰσχυροῦ vocāt. Ceteris quoq; partib⁹ fomēto curatis ac decoctiōib⁹ supradictis & cataplasmatib⁹ relaxatis, atq; ita lenib⁹ cucurbitarū raptib⁹ vtemur, quos græci abusive cūfar vocant. præfricatis partib⁹ ad tractatiōē manuū. At si vires illę aut min⁹ lęę fuerit, post detractiōē sanguinis factā spōgias expressas ex aqua calida partib⁹ applicamus, vel oleo calido mediocriter

CÆLII AC V. MORB.

fouemus. Tunc totū corpus per vnctionē curamus, his operatib⁹ magis qui egro seruiēdo iam noti sunt, ne mētis alienatio asperetur. Etenī eorum facile accipiūt atq; redarguūt delirationem præsentib⁹, vt sæpe dixim⁹, his quib⁹ verecūdiā ægrotantes debēt. Post perunctionē factā vt supra diximus cibū dabimus. At si accipere congrua noluerit, vel cōtraria voluerint, erūt fallen, di. facile enim id fieri potest. Si quidē etiam mentis ægritudine afficiātur. Dabimus ergo cōgrua, fingētes ea quę ipsi petebāt. At si minime cōsenferint, erit cōfectionis argumētatio adhibenda. Vt si exempli causa vinū accipere cupiūt, mulsum demus: vel si ptisanæ succū petierint, alicā demus vel ex milio in similitudinē ptisanę cōfectū cū possint, si ex aliqua parte sapuerint, hortationibus, aut metu compesci. Si neque hoc fieri potuerit, dabimus ea quę non satis aliena sint ab his quę rationi cōueniunt, vt olus, aut ptisana. dabit enim quiddam laxamenti atq; indulgentiæ asperitatibus animorum, cōcupita oblatio, & non omnino sine cibo atque nutrimento perseuerabunt. Vinum vero omnino negamus, tanq̃ repugnās & nihil à veneno differens. etenī datum statim furorem exasperat, atq; in nimia magnitudinē tollit. Post refectionem itaq; erūt somno dimittendi, vel quod est vicinum, somno requies adhibenda, atq; vsq; ad totius passionis statum alterna, vel per interualla, cibi refection, hoc est interposita diei vnus ieiunitate, permittentibus quidem virib⁹: sed ea die qua cibum nō dederimus, erit cataplasmatib⁹ vtendū cōgruis, atq; iugibus, vsq; ad mediū tempus dimissionis.

At si porrecta ī dies numerosior erit egritudo, & statū infirmitas acceperit, cōuenit vt declinatione, augmēto, vel impetu passionis trāfacto motū gestationis adhibeamus, si vires patiuntur, in domo suspenso lecto, si aer loci bonus atq; mūdus fuerit. Etenim si motus vel gestatio somnū rupe rit, rursus addormiūt, atq; difficile expergiscuntur, perseuerante iugi motu. At si hoc fieri non potuerit, in vicina porticu gestatio adhibēda, ita vt sella baiulatoria vel quolibet sessorio leniter atq; mediocriter moueantur. Similiter enim etiā si fuerint experrecti non statim erit gestatio incidenda. nam repētina statio atq; interrupti motus in præteritas vigilias reuocant ægrotantes. Non enim dimissio accessiōis, sed totius passiōis declinatio, nūc curationem poscit. Quapropter oportet ægros perseueranter mouere, sed leniter atq; sensim & sine vlla nimietate. At si solutio magis inerat passioni, non erit gestatio adhibenda. Tenuat enim atq; dirarat motus, dehinc cū solutio prouocatur, etiā vigilix necessārio augētur. In dimissiōe vero accessiōis, quā Græci anesin vocant, perseuerandū est localibus adiutorijs cucurbitæ appositione, sed non adhuc adiungēda scarificatio. Bonum est enim corporibus sua seruare, ne latenter effusione frequenter ægrotātes in diaphoresin veniant. At si aliquo in loco vehemēs dolor emerferit, sola erit scarificatione curandus. Tunc cōsequentibus atq; cōgruis vaporationibus & fomentis & cataplasmatib⁹ & punctiōe vtendum, & cibo cū tēporis opportunitatem viderimus, quæ probatur signis quæ de febrib⁹ scribētes docebim⁹. Generaliter autē

omniū passionū strictura laborātes min⁹ cibamus: cōuenit enī cibi paruitas dēsitati. Si quidē corpora min⁹ exhalēt, vtq; ecōtrario solutiōi plurim⁹ cōuenit cib⁹. Si quidē celeri⁹ insumat, plurimæ exalatiōis causa. At si vires ægrotātis fuerint dissolutę & febres nō ita acres, sed tūc spem veluti declinationes ostentent, aspiciēda erit imbecillitas viriū, dādus cib⁹, & si necessitas cæperit, etiā vinū, sed omnino paruū ad releuādas corporis vires. In his enī sanē magis erit cōsiderāda liquidarū emissio materiārū, atq; corporis defluxio, & cutis veluti ruginosa, vel sulcata pānositas, quā gręci rhacosin vocāt. Etenī humilitas atq; densitas pulsus plurimos facit errare, vt putarēt viriū solutionē, atq; ita importune vinū dantes, insuperabiles mētis alienatiōes fecerūt excitari. Quapropter oportet etiā cū alijs, pulsū cōsiderare, nō solū si densus atq; humilis est. Hoc enī etiā nō solutis virib⁹ sæpe occurrit, sed si etiā imbecillis, & in cōparatione multarū effusiōe semper ac magis densatur, atq; humilis & tremul⁹ efficitur. Cordis etiā mot⁹ tarditate quadā defecti spiritu, motu torpescit, vt post factū saltum ad semet ex residuo corpore prærogatū spiritū trahat, difficulter aliū faciat saltū, siquidē nō possit spirit⁹ vsq; ad articularū finē, vel omniū mēbro rum peruenire summitatē. His deniq; accedit tremor, sed nō à tēpore, quo corpora requiescūt, sed cū aliquis sua mēbra attractare tentauerit. Etenī cessante officio atq; visu ægrotātis tremor si fuerit solutus, atq; ē natura, vel sanitas tempore intelligitur iam fuisse. Prouidēdū itaq; quia in ista ægritudinis qualitate incauta vini dandi cō-

fuetudo ppter vitas, vt supra memorauim⁹, accusabilis apud inertes, quos idiotas appellāt, inuenitur: q̄q̄ passionis causa ægrotantes interfecti videātur. Quapropter erit primo periculū prædicendū, ac deinde vinū dandū. At si viriū solutio nō fuerit, sed ex spōte pfect⁹, in meliōrē partē passiōis fuerit demonstrat⁹, nō illico præcipue festinandū circa mutandū curatiōis cursū, nisi triduo fuerit cōfirmata passiōis declinatio. Etenī facilis in recursū peiorē atq; in augmētū hoc passiōis est gen⁹, etiā si parua occasio impulerit causē. Quapropter etiā tūc propter difficultatē passiōis cauti⁹ erūt omnia agēda, atq; primū capiti, vel magis patiētib⁹ locis cerotū apponēdū ex oleo dulci confectū. At si reliquæ fuerint in tumorib⁹ viscerū, cataplasmatib⁹ erūt pseuerati⁹ relaxandæ, vel pinguibus palmulis. Si quidē nō præsentis tēporis, sed etiā sequentis habeāt relaxandi virtutē. Tunc etiā cōuenit caput fomētis curare frequētius, sed cauta diligentia, nequa pars frigore tāgatur. Nam lata sponsia erit supponēda gutturi, atq; mento. Dehinc paulo prominentius à lecto producēdus æger, atq; paululū inclinādus. Tūc supponenda scaphula alta aqua calida plena, deinde duo adhibendi, qui foueant alterno officio, ne vilo tempore fomentū frigescere faciat caput, Per intervalla denique erit etiam oleo perfundendum, & manibus leniter defricandum, sed non impressis. Tunc expressa sponsia detergēdum, & vltra quæ humectata sunt forte pannis calidis detergenda atque lana calida est tergenda. Tunc residuum corpus oleo perungendum molli quidem tactu

CÆLII ACVT. MORB.

manuū. Procedēte declinatione, solitū nobis est
 vtī etiā fomēto à genib⁹ ad inferiora. Tūc cōpa
 ratioē profect⁹, cibi augēda humanitas. Primo
 enī oportet ac sufficit varietatē de simplicib⁹ fa
 cere, dādo pultē, aut sorbilē cibū, oua atq; panē,
 vel elutā alicā, & nō alternis sed quotidianis die
 bus, & plurimū, cōparatione præteriti tēporis
 illorū dierū, quib⁹ paruū dare solebam⁹. Simpli
 ciorē vero & tenuē atq; paruū illis dieb⁹ quib⁹
 nihil dare solebam⁹. Cōfirmata atq; plurimū p
 ficiente declinatione, erūt addēdæ etiā medię
 materiæ pulmēta, quod Græci μέσην ὕλην ap
 pellāt, vt pisces saxatiles, cerebrū, olera, sed non
 acria, vt betā, maluā. Tūc etiā ex deposito, vt
 falsum, oliuas. Hæc enī quæ de cellario pferun
 tur, Græci apothecion vacauerūt. Oportet etiā
 aduertere vt quādo dam⁹ multū, minoris sit nu
 trimētī, aut quādo paruū, maioris sit nutrimētī.
 Sicut respōsionū libris resūptiuū quid tūc scri
 bentes docuim⁹. semp autē vtantur. dandus est
 cib⁹ vt intra dimissionis medietatē digeratur, &
 nihil superfluū sequens inueniat accessio. Augē
 di sunt igitur cibi pro viriū q̄titate. Deniq; si se
 corporis fortitudo attollere cœperit, dabim⁹ etiā
 volantū carnes, ut turdos, vel pullos gallinarū, &
 colūbinorū. Tūc etiā porcina carnem, atq; crura
 porcina, quę Græci acrocolia vocauerūt, vel quę
 motu frequēte exercētur in ijsdē animalib⁹. da
 bim⁹ etiā boedinā carnē resūptis virib⁹, vt om
 nes supradictos cibos facile accipere ac digerere
 possit ægrotās. Ordinē cibi cōponim⁹, vt primo
 dem⁹ ea quę sūt medię materię, quā græci mesen
 hylen vocāt, vt pultes, pisces, cerebrum, alica, sed

quæ nō percutiāt, vt ficus vel ex melle, aut mul-
sum coctū, malū, vel celsa. Tūc deinde volandia,
sed nō pīguia, neq; cibis nutritilib⁹ adescata ob
acquirendam pinguedinē, sed mediocriter carno-
sa, vltimo porcinā atq; hœdinā . Proficiente cu-
ratione addenda erit gestatio , quæ in domo vel
in porticibus fiat , sed hæc quoque erit sensim
augenda. similiter etiam & corporis vnctio, atq;
defricatio , cibis supradictis , nunc quantitate,
nunc qualitate , erit augendus. Tunc lauacrum
adhibendum, & in abstinentia vini permanendū.
Cum autem sine vlla inquietudine corpus habi-
tare senserimus, dabimus vinum splendens leue
atq; mediè acre, non nimij odoris, temporis me-
diocris, vt neq; vetustum , neq; satis nouum sit.
Erit præterea aquatum dandum: metuenda est
enim in ista passione vini datio. Siquidem eius in
tumore fuisse substantia videatur. Tempore igitur
quo vinum dam⁹, erit primo æger perungē-
dus, tunc idem modus cibi dandus. Cum omnis
deinde sollicitudo recesserit, atq; omnia suspecta
circumspecta viderimus, & alienatio mentis om-
ni ex parte recesserit, febrib⁹ desertis atq; virib⁹
resumptis impauide omnibus supradictis vtēdū
erit coniunctis, vt gestatione, vnctione, lauacro,
& vario cibo atq; vino. Omni autem tempore re-
sumptionis erit curādum, vt ab alienatione mē-
tis reducti sapere cogantur. Pleriq; enim vsq; ad
sanitatis tempus, moestitudinem, vel iracūdiam,
aut alienationē mentis seruauerint. Quare oportet
eos qui hilaritate afficiebantur, seuera verbo-
rum atq; tristi oratione corrigere. Sic enim men-
tis laxata habitudo atq; pueris effrenata baccha:

tio coercetur. Eos vero qui mœstitudine atq; ira afficiebantur, leui consolatione atq; nūc dictis hilarioribus & iucunditate releuare. Etenim tediū, vel mœstitudo non solum in his, sed etiā in alijs passionibus valuit sæpe passionem refricare. Nā si sani homines pleriq; anxietate in passiōes corporis deuenerunt, nimirum etiā qui nondum sunt passione purgati, in eadem redeant cum animæ qualitas, sua, vt ita dixerim, cubilia quadam vulneratione affecerit. hæc est secundum Methodon curatio phreniticę passionis. Dehinc aliarum sectarum principes, quid ordinauerint prosequamur.

Ad Dioçlem.

Caput. XII.

Hippocrates igitur solum nomen videtur tetigisse passionis libro quem de ptisana scripsit, Item libro prædictiuo quē prorrheticum appellauit, nam curationem nullam tradidit. Sed neq; Praxagoras, neq; Herophilus. Dioscles vero libro quem de febribus scripsit, ait oportere phreniticos fortes, atq; audaces lauacro curari. Simili etiam phlebotomare iuuenes fortes atq; plurimum sanguinis abundantes, vel cōsuetudine vinolentos, quosdam intra sextum diem, Aliquos vero etiam post septimum, & octauum. Item libro quem de passionibus & earum causis, & curationibus scripsit, non solū, inquit, ex brachio sanguis est phreniticis detrahendus, sed etiā de venis quæ sub lingua sunt. Quantum ad hæc miseris erat melius debilitate potius q̃ vana corporis fortitudine laborare, ne tantis cladibus errantis medici vexarētur. Etenim audacia & irra-

tionabilis fortitudo peiorātis est passionis, & magis in augmento. Perniciosius autem cum passio vehementescit, vexato tātis turbationibus ægro, lauacrum adhibere. Quod est econtrarium vtilissimum in declinatione, etiam nō audacibus, neq; fortibus phreniticis, dehinc noxius est etiam clyster acrior quem sepiissime probant, atq; nihil ab officio differens. Phlebotomia quoq; iugulatione non differt, cū vexatis viribus adhibetur, vt aiūt post septimū vel octauū diem, atq; ita etiam ex vinolentia in phreniticam passionem venientes conuenit plerunq; non phlebotomari, cum forte etiam solutio adfuerit. Alios etiā hoc est ex alijs causis phreniticos effectos, vt est adustio, sæpe phlebotomari oportet, Sed neq; parum sanguinis habentes, quos græci *ὀλιγαίμους* appellant, ita curandi erunt, vt phlebotomi beneficio priuētur. Et quid ultra? cū enim nō etates, neq; cetera, quæ superfluo posuerunt, prouidenda probem⁹, sed passionē magis atq; eius comitātia cōsidere mus, falsa deniq; ac superstitiosa est etiam ex venis sub lingua cōstitutis sanguinis detractio, et enim caput implet, & eius fluor abstineri difficile potest. Ad Erasistratum. Cap. XIII.



Rasistratus tertio libro de febribus scribēs, hoc solū dixit, quomodo in febriū alienatiōe vinū cōuenit cum melle dari. Nō ad examē dādī tēpora sumpsit. Dicit deniq; multis profuisse, & miratur quomodo nescius tēporū conuenisse fortunā dehinc multā inflationem facere nemo dubitat, atq; plenissimā vētris cōmotionē, quippe cū neq; dandī quātitatē adiecerit, neq; alias adiutorij partes manifestandas aduerterit.

CÆLII ACVT. MORB.

Ad Asclepiadem.

Cap. XIII.



Sclepiadi responsuri eius primum dogma proponamus, qua voluti apprehensionis falsitate, peccatis etiā inuoluuntur curationum: Primordia namq; corporis primo constituerat atomos, Secūda corpuscula intellectu sensa, sine vlla qualitate solita, atq; ex initio comitata, æternum mouentia, quæ suo incurso offensa, mutuis ictibus in infinita partium fragmenta soluantur, magnitudine atq; schemate differentia. Quæ rursus eundo sibi adiecta, vel coniuncta omnia faciant sensibilia, vim in semet mutationis habentia, aut per magnitudinem sui, aut per multitudinem, aut per schema, aut per ordinem. Nec, inquit, ratione carere videatur, quod nullius faciant qualitatis corpora. Aliud enim partes, aliud vniuersitatem sequetur, argentum deniq; album est, sed eius affricatio nigra: caprinum cornu nigrū, sed eius alba ferrago. fieri etiam vias ex complexione corpusculorum intellectu sensas magnitudine, atq; schemate differentes, per quas succorū ductus solito meatu percurrēs, si nullo fuerit impedimento retentus, sanitas maneat, impeditus vero statione corpusculorum morbos efficiat. Fit autem eorum statio, aut magnitudinis, aut schematis, aut multitudinis, aut celerrimi motus causa, aut viarum flexu, conclusionē atq; squamularū * exputo. Varias inquit fieri passiones, locorū, aut viarum differentia, & nō omnes statione corpusculorum, sed certas, hoc est phrenitim, lethargiā, pleuritim & febres vehementes: solubiles vero liquidorum atq; spiritus turbatione, Item buli

mum magnitudine viarum stomachi atq; ven-
 tris fieri sensit. Defectionem vero atq; corporis
 fluxam & irregibilem laxitatem, viarum inquit
 raritate fieri, Item hydropisimum perforatione
 carnis in paruam formulam viarum quæ possit
 solita corporis nutrimenta inaquare, Item typum
 quotidianum maiorum corpusculorum statione
 fieri asseuerant. Cito etenim inquit ea exantlari
 atq; impleri. Tertianum vero minorum statione
 corpusculorum. Item quartanum minutissimo-
 rum. Difficile enim impleri atq; exantlari pos-
 sunt, febrium ponit signum feruorem plurimum,
 atq; immutationem pulsus, in vehementia, nisi ex
 aliqua hæc manifesta fuerint causa. Et neq; in-
 quit esse in passionibus statos dies, quos crissimos
 appellant. Etenim non certo, aut legitimo tem-
 pore ægitudines soluuntur. Vinum iubet febrici-
 tantibus dari, sed adiecta discretione, Impari de-
 niq; adhibendum probauit, primo clysterem &
 iugiter adhibendum. Non etiam sitim vehemen-
 tem donec pulsus concidat, probat: etenim opor-
 tuntatem temporis fieri magis ab artifice posse
 q̃ sua sponte, aut deorum nutu venire. Appella-
 uit deniq; illam magnificam. Item in Samothra-
 cia clysterem, atq; vomitum probat, circa vespere
 ram pridie. Sed in his qui periodicis typis affici-
 untur, vomitum preponit clysteri. Itē lue ægro-
 tantibus vomitum & lauacrum probat. Typicis
 vero, clysterem & vomitū, & vinum samothra-
 cium, atq; salsum bibendum inquit, primo vsque
 ad tres quartas sextarij, & superbibendam partē
 sextarij. Itē tēpus dandi cibi nō dimissione perfe-
 cta, sed accessionis declinatione dicit. Et quosdā

CÆLII ACVT.MORB.

prima die, quosdā secūda, quosdā tertiā, quosdam quarta, vel quinta, aut septima cibari iubet. phlebotomat eos qui cum dolore fuerint ægotantes, alios omnes prohibet phlebotomari, & magis specialiter phreniticos, adiiciens etiā non esse tondendos: loci quoq; obscuritatem recusans. Item cardiacos vehementioribus clysteribus curat, & cum leui fuerint indulgentia releuati, reficit vino, & cibo. in synanchicis vero, vt supradictis etiam vtitur, pharingotomia, hoc est cannæ siue gutturis ob respirationem diuisura, item hydropibus paracētesin probat, qua inquit, si forte plus modo fuerit facta humoris detractio, erunt ægri aqua calida replēdi tantū, q̄tum plus videbamus abstulisse. Huic sane adiutorio detractio nem sanguinis ex talo factam, hoc est ex eius vena interiore similiter mederi dicit, & non esse actiuas atque operantes causas ægritudinum in liquidis constitutas, quas synectitas vocant, sed esse antecedētes, quas græci procatacticas appellant, item plenitudinem plerasq; passionēs adiuuare dicit. Laudat etiam in salutaribus præceptis vitæ varietatē, atq; vehementer vtile dicit aquā bibere, & frigida lauari quam psychrolusiam appellant, & frigidam bibere. Item habitudinem athleticam negat esse tutam, & neq; vllam digestionem in nobis esse, sed solutionem ciborum in ventre fieri crudā, & per singulas particulas corporis ire, vt per omnes tenuis visa penetrare videatur, quod appellauit Leptomeres, sed nos intelligimus spiritum. Et neq; inquit feruētis qualitatis neq; frigide esse nimix suæ tenuitatis causa, neq; aliū quemlibet sensum tactus habere, sed

per vias receptaculorū nutrimenti. Nunc arteriā, nunc neruum, vel venam, vel carnem fieri. Item transuorationis primam partem dicit extētionē fieri faucium, secundā viarum tenuitate, quæ ad ventrem ducunt. Item orexim quam nos appetentiā dicere poterimus: eam quæ cibū appetit, viarū maiore perfectione fieri dicit in stomacho atq; vētre. Eam autē quæ potū appetit, paruarū viarū causa fieri dicit. Præterea excrementa ventris græci scybala dicunt, negat aliena esse natura. Siquidem etiam ex ipsis corpora augeantur. Quædā deniq; inquit, animalia ex ipsis solūmodo nutriūt. Somnū enim etiā fieri spirit⁹ sensibilibus crassificatione asseuerat, deinde regnū animæ aliqua in parte corporis cōstitutū negat. Etenim nihil aliud esse dicit animam, q̄ sensuū oīm cōtū, intellectū autē occultarū, vel latentū rerum per solubilē fieri motū sensuū, qui ab accidētib⁹ sensilibus atq; antecedēti perspectione perficit. Memoriā vero alterno eorū exercitio dicit. Omnia præterea fieri necessitate, & nihil sine causa, & neq; naturā aliud esse, q̄ corpus, vel eius motum. Deinde, inquit, non solum prodest, sed etiā nocet. Hoc est Asclepiadis dogma, nunc quem admodum phreniticos curauerit, prosequemur.

Item ad Asclepiadem phreniticos curans.

Caput. XV.



Phreniticos curans, primo libro celerrum, vel acutarum passionū, expugnat eos qui contraria posuerūt adhibenda. Secundo quomodo declinanda, vel auertenda sit phrenitis. Ter.

CÆLII ; ACVT. MORB.

tio quomodo curanda, cum fuerit. Contradicens igitur primo in causa clysteres atq; irim bibendā, & acetū cū melle, & ex sinapi apophlegmatismum & tonsuram. Siquidem hortamēto quodam liquidior faciat ad caput ascēsum, & in cōstructionem atq; tensionem cerebri membranā cogat. Accurrit enim incisuræ capillorum materies, & pori deniq; & capilli post tonsuram crassescunt, atq; fortiores fiunt. Quapropter etiam si homines, si post cibum totōderint, tussicula atq; catarrho, vel lippitudine vexātur, dehinc si lanis caput post tonsuram tegere curamus, q̄to meli⁹ si naturali tegmine capillorum lateat obtectum? Improbatur etiam in obscuro loco iacere ægrotantes, in luce enim, inquit, mentis siue intelligentiæ visa debilia, atq; parua efficiuntur, cum sensualibus visis arguūtur: sicut nocturni luminis ac funaliū flamma sub ætheria luce cōstituta visi potioris oppressione languescit. in obscuro autē ecōtrario vehementiora atque maiora fieri mentis atq; intelligentiæ visa asseuerat, cum nullis sensualibus visis arguuntur, quiescentibus sensibus, deniq; tanq̄ præsentia, vel vera fiunt, sicuti somniantum etiam: tunc enim silentibus sensibus solius mentis visa operantur. Ac deinde cum nullis adhuc sensualibus incisa vocantur, tanq̄ præsentium non præsentium visa sequuntur, phlebotomiam etiam nihil inquit iugulatione differre, in phreniticis siquidē sit cum dolore ægrotantibus congrua. Nam dolor maiorum corpusculorū statione fiet, quæ sola phlebotomia exantlari posse noscuntur, phrenitici igitur nullo dolore vexantur. Siquidem angustijs in his paruorū facta vi-

deatur statio, & propterea phlebotomati animi defectu, atq; corporis frigidus torpore afficiantur, aut vocis amputationem, aut mentis alienationem sustineant. detracta enim materie passionum causa remanente crassificari contingit, atq; corporis facere algorem, tunc ad cerebri membranam spiritum, vel feruorem ferri, & statione corpusculorum geminata quoque alienatione. Et recte quidem clysteres atque irim & mulsum ex aceto & sinapi apophlegmatismum recusat. Sed se ipse quoque impugnans sicuti in consequentibus docebimus, item tonsuram atque obscurum locum & phlebotomiam non recte prohibere voluit, nocentur enim quidam non tonsuræ causa, sed intemporalitatis eiusdem, denique etiam sanos post cibum tondentes nocere manifestum est, ante cibum vero oportunitatis causa releuari. Dehinc etiam si vi sua prodesse tonsuram negat, oportuit tamen eam adhiberi propter usum localium adiutoriorum, sine qua necessario adhiberi non possunt, sicut superius docuimus. Aëris vero qualitas non occulta causa, sed manifesto passionis indicio erit iudicanda, secundum passionem. Igitur quomodo videmus alios strictura, alios solutione magis affici, cōuenit ut pro differentia his lucidus, illis obscurus sit adhibendus. Nam crassitudine, ac frigore constringens aër redarguit corporis defluxiones, quas greci aporrhoeas vocant. At si, ut nuper docuimus, proprietatem accidentiū seruauerimus, quomodo quidā lucē fugiunt, vel oderūt, alij tenebras, cōuenit ut alios obscuro, alios lucido esse faciamus loco. Quid dicā quomodo pleraq; ægris aliter sunt q̄ videntur. ex

CÆLII ACVT.MORB.

visis nanq; veris ducentes quidā mentis errorem, falsitate magis afficiūtur. Sic deniq; Hercules filiorum & coniugis inimicos visibus vultus accepit, Orestes etiā Electræ furiales vultus expauit. Non omnes igitur lucido in loco iacere concordat. sicut latius adiutoriorū libro explicam⁹. Est etiā vehementer noxiū phlebotomiæ vtilissimū adiutoriū prohibere. Quippe cū videam⁹ in ipso vsu sæpe passionē fecisse cōpēdiū. Etenī defectio vocis, atque algor sequentur eos qui incongrue fuerint phlebotomati, cōiuncta scilicet solutione aut intēporaliter, aut immodice. Vanum est etiā quia non dolent phlebotomiam prohibere, tanq; maiorū corpusculorū cōgruā detractiōni, quorū obtrusione dolores efficiūtur. Primo enim paralyticos & peripneumonicos, & apoplectos cōgrue phlebotomam⁹, cū nullis dolorib⁹ afficiant. Secūdo etiā phrenitici dolēt, sed eorū mens, quia iudicio caret, nescit queri, quòd doleat. Videm⁹ nāq; eos sese mordere, aut vrere, aut pūgere: & naturale nō est nullo dolore cogēte fieri existimare. Dehinc maiorū corpusculorū detractiōne, etiā minorum necessario sequit. At phrenitici nō solū alienātur, sed febricitāt. Ita febres secundum Asclepiadem maiorum corpusculorum statione fiunt. Si igitur propter alienationem non conuenit, propter febres tamen conuenit adhibere phlebotomiam, sic etiam sanguis maiorum corpusculorū materia, sed non solum detrahīt phlebotomia, verum etiam spiritum & feruorem, quæ vt dicit, paruum sunt corpusculorum materiæ. Conuenit igitur secundum ipsum phreniticos phlebotomari, vt detractiōne minorum corpusculorum alie-

natio mentis, maiorum febres auferantur. Apparet itaq; neq; secundum se cōsequenter Asclepiadē phlebotomiā prohibere. Proinde præcauēs vel auertens mētīs alienationem, iuber addisci, quæ sit accessionis ac dimissionis dies. Tūc grauiori die cibum dari paucissimū, atq; expectato febrium statu, dari ptisanā, vel ordeum, aut alicā, aut cum beta lenticulā, vel his quicq; simile, consiliēs solam ex his dandi nouitatē prodesse, nec habendum iudicium, quid istorum debeamus offerre, sed potestati ægrotantium dimittēdū, quid velint eligere. Alia die si febricula perseverauerit exantlare obtrusiones, & requiem corporis adhibere, aquā dantes potandam, nō plusquam bis in die vsq; ad heminā, vel duas, & hunc modum etiā nocte seruare, sic rursus secunda die, transacto accessionis augmēto dādum quiddā de præscriptis sorbilibus, atq; alia die declināte febricula, vtri sorbili cibo. Perseuerante vero rursus abstinere, & præterito similē tertium imitari diē. Tunc septima audere iam pane atq; piscibus, & vino vti, soluitur inquit enim passio tertia sæpe periodo. Ad hæc respondemus quia etiam si sua sponte passio intra septimum diem solui potuerat, non soluetur, iniquæ curationis causa. Etenim neq; de somno, neq; de vigilijs neq; de capitis fomento, vel cæteris quæ ad diligentiam pertinet curationis, quicquam videmus ordinatum, solis ex tribus medelam credidit adhibendam, potu, cibo, clystere, & hoc tanq; de experimēto. Nam cibus, vt voluit, ante dimissionem dandus, transacto mox accessionis statu, turbatis ad huc liquidis atq; spiritu, quo febres duplicent, & alienatio

d.ij.

CÆLII AC V. MORB.

mentis ardeat, & non solū intēporaliter, verū etiam incongrue, stringit enim ordeū, & lenticula: relaxat ptisana, & alica, & nō possunt contrariæ qualitatis species iisdē passionibus adhiberi, nulla discretione seruata. Dicimus etiā curiosum genus pulmenti atq; congestum, & primæ oblationi contrariū esse betā cū lēticula, quod appellauit seutlophacen, item ptisanā: cōtrarius etiam clyster atq; noxius perspicitur omnibus quidem propter intestinorū mordicationē, & cætera, magis tamē solutionē. Ipse deniq; accusans vrētes, ait continuationē clysterū incēdiū atq; sitim facere. Inusta enim intestina melle, atq; cæterarum specierū mordicatione mouent feruorē plurimū qui per alta quadam continuitate viarū mēbranæ cerebri influat. Cuncta etenī, inquit, quæ sunt in alto corporis constituta sese occulta vicinitate contingunt. Quorum in numero mēbranam cerebri ponimus. Reuocat etiam & grauæ passionis, atq; perniciosum malum, nihil enim in ipsa grauius q̄ ventris est fluor. Quòd igitur crescit peiorante passione, hoc phibet fieri clysterū pro uocatione, denique quæ culpans alios dixerit in ipsum conuertenda, vtentē clystere. Non enim dici potest solam frequentiam iniectionis accusasse, genus autem innoxium iudicasse, cum manifeste propter acrimoniam clysteres noxij iudicentur, & magis etiam si vsu frequenti, atque copia peccauerint adhibentes. Quid dicā quod neque semel Asclepiades clysterem iusserit adhiberi, cum secundo vna die dixerit innouandum, dicens perseverante rursum, cibo abstinendum, & innouandum tertio præterita die quo clyster fue

rit adhibitus. Est etiam vanum sine disciplina tēporis potum ordinare. Ait enim bis dandum in singulos dies, mitto nō ōnibus ægris eundē modum competere strictura atq; solutione laborantibus, at iste duas heminas omnibus iussit dari, sed etiam vinum atque varium cibum septima die offerendum dixit, non declinationem passionis, sed numerum dierum aduertens, tanq̃ tūc necessario solui passionem existimans, quod est iuri, vel legib⁹ simile. Dehinc explicita passionis aduertendæ præcautione præsentis, hoc etiam effecta curatione ordinavit, cuius duplicē dicit differentiam, vnam meticulousam ac multis phreniticis aptandam, aliam vehementem atq; periculosam, quā philoparabolon appellauit. Quarum primam ordinans, si inquit, eum qui non sit ab alio curatus, acceperūt, & propterea nullo sit tēstatus adiutorio, odoramentis vtetur, hoc castoreo, peucedano, ruta & aceto, vel ex his infuso liquore, & clystere detrahendæ obtrusionis causa. Sin vero ab aliquo medico fuerat ante curatus, erit, inquit, omnis vnctio, atq; cataplasma, vel odoramentum prohibēdum, statim primo ingressu, & ad lucem ex vmbra transmutandus ægotās, sternutamentū etiam adhibendū, mulsū, æstate quater, hyeme bis, in die dimidia hemina ī singulis potionibus, sed præcocto melle, ne venter humidus, aut fluidus fiat. Tunc veniente nocte primo ad domicilium mediocre secedēdum atq; plurimus vel apertus aēr fugiendus, dehinc si aliqua fuerit accessio, vel articulorū stupor, his trāsactis dandū quidq̃ de præscriptis sorbilibus necessario, si autem æqualia permanserint febrium

d. liij.

signa, statim vespertino tempore, oleo totū corpus perungentes, caput etiā atq; collum rosaceo; dabimus sorbilem, cibum tunc ad largiendum requiem, vel somnum sufficiens erit motus, bair latoria sessione adhibet⁹, mox ægros mites ac delicatos facit. Aliqui deniq; phreniticorū dirarato corpore motus causa deficiunt. Quapropter nos esse magis atq; post cibum gestationem cōuenit adhibere. Hæc est secundum Asclepiadem metu periculosa, atq; cauta differētia curationis. Huic extemplo respondemus, quia nulla est metu periculosa differentia curationis arte formata, sed est potius tuta: neq; etiam vehemens, quam secūdam posuit periculosam ac metuendam. Vocanda est enim artis iudicio probata necessario magis q̄ supradicto est vocabulo nuncupanda. At si vere fuerit illa quam putat, tuta, quomodo non omnibus, sed multis erit phreniticis cōgrua? aut cur non manifestauit, quibus sit incongrua? quid dicam? quia ipsa quoque quam putat, tutam passionem, peior esse perspicitur. Primo etenim inuidiose iubet si qua ante ipsum medicus adhibuit, repudianda. At si non adhibuerit, tunc probanda tanq̄ legitimum putans, vt hæc alijs adhibentibus noceant, ipso medeantur. Dehinc neq; quibus vtendum sit his prohibitis dixit, vt oporteat phreniticum sine vīlo adiutorio derelinqui. Est etiam vehementer noxiū aceto vti atq; peucedano, & ruta, & castoreo: premunt hæc enim, & vertigines ingerunt, & ob acrimoniam sui tumentes dissecant membranas. Hinc etiā alienationē geminant, aut pressuram ingerunt vehementem: horum testis ipse est Asclepiades. accu-

sans enim eos qui rutam probauerunt adhibendam, vitandas inquit primo grauabiles virtutes. Siquidem ascensu quodam inspirationis caput inuadant, & magnas menti occasiones alienationis subijciant. Propterea paulo superius in eodē libro ait, ipsum caput obsidere non sinūt hi qui curantes cataplasmatibus & aceto & polline & confectis fomentis ex multiformi materia abluendum existimant. Similiter vngentes nō solum caput, sed etiam faciem atq; collum, quæ omnia non difficulter naris implendæ odoris acerrimi, atq; grauabilis. Nobis deniq; sæpe contigit ingredientibus ad ægros quibus hæc fuerant adhibita, vertiginem pati. Quid nunc Asclepiades grauius olens habuisti castoreo? quid grauabilius ab his quæ adhibenda confirmas. Cataplasmata vero ex pollinibus, & aceto fuit cataplasma remoto aceto per se efficax. Laxatiuum est enim si acetum tibi repugnat. Ipso enim caput foueri iussisti. Clysteris vero culpam superius probauimus. est etiam iners omnes ægros, vt voluit, ex tenebris ad lucem transferre, cum quidam tenebris curari magis videantur, sicut superius demonstrauimus. Vexat etiā ptarmicum quod credidit adhibendū. Acre est enim atq; ignitum, vt piper, struthiū, & albū helleborū, quibus tumētes membræ ex eorū acrimonia in asperitatē surgunt, & agitatione sternutamēta extētæ prouocātur. Deniq; statio corpusculorū causa est phreniticæ passiōis, vt putat, vehemētī⁹ eā his reb⁹ excitari suspiciādū est, cū ad sternutamēti motū materia cōcurrit. Oīno deniq; sic curatiōes suas cōfundit, vt quæ etiā ipse ordinauit excludat, cū sibi quadā

comparatiōe fuerint opposita, ait deniq; maiora adiutoria vitāda. Siquidem nocere magis q̄ prodesse videātur. Sed quid tandē leuioribus lacera-
mus, si fomentis, atq; vnguentis & cataplasmati-
bus & odoramentis & sternutamentis ægros af-
ficiendos credidit? quibus apparet eum contra se
met tulisse sententias. Caret etiam artis auxilio,
quod pro temporum aëre, atque loco ordinanda
adiutoria putat, & non pro passionis tempore.
Dehinc non oportet solum considerare, quoties
potum demus, verum etiam quando. etenim ac-
cessionis tempore limpida quoq; aqua febriū fa-
cit incendium. Mulsū vero dandum dicit suble-
uandi pulsus causa, nescius quomodo proprium
phreniticæ passionis, inesse paruum, atq; humilē
pulsū, vt lethargo maiorem ac tardum. Opor-
tuit igitur passionem destrui, non pulsū optari
maiorem, qui sæpe peiorando conlurgit, quando
ex phrenitico in lethargū venerit, ita quoties po-
tum demus autūno, vel verno tēpore, nō docuit.
Dehinc clystere vtēs mellis metuit admixtionē,
ne ventrem, inquit, fluidum faciat, decoquēdum
iussit, & clysterem non timuit, ne ventrem com-
moueret. Falsum est etiā cū continua atq; iugis
fuerit passio circa vespērū cibū dare. Siquidē etiā
secundum ipsum Asclepiadem releuētur omnes
lucis initio, vespere accessiones augeātur. natura,
inquit, vespere ob aëris crassitudinem densata
inflat corpora, atque initium generat accessionis.
Omnibus deniq; pulsus leuat statim ex medio
die initiū sumēs. Oīno igitur ratione caret vespērū
cibo tēpus eligere, quo etiā secundū Asclepiadē
accessiones augētur. Graue est etiā oleo rosaceo

tumentia frigerare, atq; constringere, & ex odore vertiginem facere, atq; pressuram & inchoante accessione ægros ad aliū transmutare locum, quādo magis eos oportebat quiescere. Sed neq; quotidie cibo nutrire est, vt putat, necessarium, & magis si nulla fuerit solutio cōiuncta, solo tumore constrictis corporibus quo ferre non possint quotidianam cibi sumptionem. Noxium est etiam omnes gestatione agitare, in his enim qui solutione & constrictione vexantur, magis extenditur passio, & horum testis Asclepiades est primus: etenim ait vias apertiores fieri gestatione, denique defectio atque diaphoresis sequitur eos qui incōgrue gestatione fuerint moti. Quod quidem nescius qua causa fiat, tanq̃ remedium quærēs vexationi gestationis nocte gestari atq; post cibum ægros æstimauit, scilicet vt non solum incongruo adiutorio, verumetiam inordinato homines noceātur. Neq; enim sanis utilis gestatio post cibum: inertem etiā perspicimus dietam, quòd ait quibusdam esse cōtrariam, nec tamen docuit quibus. si enim quos nocet nescierimus, necessario etiam quos releuet, nescire consequitur. Tradens etiam periculosam siue temeraram, quam philoparabolon appellauit, ita composuit curationē, in alia iquit, habere similia prædictæ passioni solum, quòd vinū pro melle circa vesperam non nisi omnino coegerit passio, damus: si minus primo ingressu statim, atq; plurimum & extentum, hoc est, meracum & salsum dabimus vinum, quod appellauit tethalassome: non. etenim inquit quæ primo imbecilla atque tarda de sorbilibus & mulsis dederunt, ægro cō-

CÆ L I I A C V T. M O R B.

moda omnia ex vino celerius atq; coaceruatim implētur, etenim feruor plurim⁹ accedit, & pulsus erectio & rosida sudatio mitigatur tanq̃ ex cautere per totum corpus vino concurrēte, atq; inurente sensum, scientia, hæc est vehementior, quam dicit curatio, pro mulsa habens vinum, vt cæteris peccatis manentibus in odoribus & fomentis & sternutamentis & iacendi loco & gestatione omnibus ordinata grauiorem ex vino vexationem adiecerit. In quibus neque mulsum recte secundū ipsum ordinatū esse perspicimus, dat enim vinum & incongrue & intemporaliter & immodice. incongrue inquā quoniam salsum & propterea acre. quādo deniq; mel iubet ne venter veniat in fluorem, atq; ab alijs ordinatum clysterem remouet, & tanq̃ in cōmemorationem ducentem grauem phreniticis vexationem, hoc est fluorem ventris. Cū magis falsum vinum id facile possit efficere, & per acrimoniā febres, atq; tumens corpus incendere. Intemporaliter autem quomodo circa vesperam, quando secundum ipsum fiet accessio, vel certe statim, vt ait, primo ingressu tanq̃ secum opportunitatem dandi attulerit vini. Item immodice dare probatur, quomodo mulsum atq; meracū, & propterea ignis ī modū vexare p̃spicitur, vt vere ipsum videatur cauteris esse virtute, quæ neruos incurrens atq; penetrans infestæ iam dudum febriculæ coniuncta etiam illud quo sapimus & alienationem geminet mētis, aut spasmū faciat ægrotanti, afferēs etiam quod hi qui nō mulsum neq; meracum accipere voluerint, noceātur. Si quidē minus inebriare contingat. Erat enim conueniēs

omni phrenitico qui ab eo curatur hāc adhibere
ppriā alienationē mētīs, aut omnino vinū acci-
pere noluiſſet, quippe cum Aſclepiades ex vino
frequēter phreniticos fieri fateatur, atq; ſimiles
ebrijs inueniri. quomodo igitur credi poteſt coſ-
dem multo vino accepto, atq; meraco releuari,
quibus alienatio ex vino facta perſpicitur? Quę
neceſſario in capite ſimili ſemper vexatiōe ope-
ratur. In his nos credulitate occupari exiſtimat
vt tanq̃ ebrios plurimū vinū in altū ſomnū de-
mergit, nō aliter etiam phreniticos vinolētia in
ſomnū venire poſſe putem⁹ mulſo atq; meraco
potu affectos. Hęc enī vere ipſorū aliquis dicere
poteſt, ſed cōtrā erit aduertendū, nullā eſſe ſimi-
litudinē vinolētię phrenitię paſſionis. In ebrijs
enī alienatio ex multitudine poti vini facta per-
ſpicitur, quę reflata tēporalē citius alienationē
ſoluit. In phreniticis vero ex tumore alienatio
fiet. Quo cōſiderandū eſt quia vinū in his refla-
ri minime poteſt propter difficultatē viarū, quę
ſunt ex morbo adeo denſatę vt neque naturalia
quę per ſenſuales vias excluđi cōſueuerūt reddā-
tur, neq; accepta per cibos impartiri corpori fa-
cile videātur, vel per tenues vias digeſtiōe ſolu-
ta ppriari, atq; ad ſua deſtinata puenire. Sed ma-
nētia ſtatione inſueta nouo turbore corp⁹ affi-
ciāt, atq; tumētia exagitēt, mentē quoq; turbēt
vel receptacula quęq; pcutiāt, tēpore quo etiā
ille ſpirit⁹ qui naturalis ac tenuis eſt anguſtatos
ſuos ambit⁹ pūgat, ac dolores corporis efficiat.
Mitto etiā, quomodo, ſi vt volunt, ebrijs ſimiles
phreniticos accipim⁹, nō oportuit ebriū inebriā-
do curare. Null⁹ enī vinolent⁹ bibēdo in ſobriū
venit. nam magis econtrario qui perſeuerando

CÆLII ACVT. MORB.

potauerunt multo poto multum mentis alienationem auxerūt, aut in spasmus, aut in vigilias incurabiles deuenērūt. Adiuuant etiā vexationem vinolentię, grauabilia odoramenta, atq; fomenta, quibus deniq; fortes ac recte valentes inconuiuijs incautius vfi multa se grauatione vexarunt, ait etiā vinum in cauteris similitudinē abstinere sudorem, cum idem dicat mitigari alienationem accepto vino, cum se plurimi ac per totum corpus sudores effuderint, vt secundum ipsum id sit intelligēdum quod nunc abstineat vinum sudores, nunc faciat. libro deniq; quē de cōmunibus adiutorijs scripsit, vtriusque virtutis vinū, dixit. Sicut enim, ait, coagula dēsant atq; extenuant lactis naturam, cum caseus ex lacte crassescat, & materia exinde tenuior ac magis liquida fiat, quam Græci ὀρεῖον appellant, atque hæc contraria eadem virtute suffecta separātur. Non aliter & vinū vi quadam suę percussionis, plurimā nutrimenti partem densare accepimus, atq; in se cogere, plurimā vero resolvere ac di-rarare & tenuem facere. Quibus probatur repugnantia ex ijsdem promittere, & frigido exemplo deniq; errare. Sed neq; discretionibus generalibus vini coniectura cōuenit, falsis exemplis immissa. In his deniq; adhuc constitutus demonstracionibus vanis inuoluitur, dicēdo vini tritam potationem in passionibus tardis magis quā in celeribus vel acutis: Et in his qui dimissionib⁹ releuātur, magis quā in his qui cōtinuatione vexantur. Et senibus magis quā in iuuenibus, & præpurgatis clystere, vel sitientibus magis quā plenis cibo. Et inchoantibus ac deficientibus fe-

bribus magis quàm summa tenentibus, & post accessionem potius quàm ante ipsam. Nunc autem curans phreniticos ordine quodam vsque ad finem seruato, sicut in nutriendis virginibus vinum dari constituit, in celeri passionè, atq; cōtinua & omnibus, nihil sane considerans, sed statim primo ingressu, ac frequentius in statu passionis. Tunc enim, inquit, vehementius alienatur ægrotātes. Præterea & in vehementia accessionis intelligitur dare cum vespero tempore dandum iubet. hæc sunt quibus neq; sibi conueniēs phreniticorum curationem ordinasse probatur, quanquam plurima quæ dici potuerant, infinita consideratione taceantur.

Ad Themisonem.

Cap. XVI



Quomodo Themison scribens cælerum passionum curationes antiquorum peccatis assentiens quædam incondita dereliquit. Nam necdum purgauerat suā sectam, & ob hoc phreniticorum ordinans curationem quibusdam erroribus implicatur, ipsius quoque inspiciēda sunt singula. Primo igitur ex prima diatribo nutriendos dicit, nullis etiam cogentib⁹ causis, quod est impropriū tempori. Dehinc dat sorbilia, ita cucurbita, aut solū mulsum, aut pomorum. Quædam quomodo nunc dissimilitudo virtutis ciborum docet, errorem facile perspicimus. Etenim sorbilia quæ posuit succi sunt melioris, cucurbita vero cito corrūpitur. Poma quoque succi maligni, ac facile acescentis esse noscuntur, etiamsi sani fuerint accipientes, quibus deniq; medio cibo vtī debere salutarib⁹ præceptis

CÆLII ACVT.MORB.

docuimus. Vbi autem viscera tument & altiora febribus inuruntur, multo facilius acescere poma probam⁹. prohibet sane in fomētis peucedanū, castoreum, rutam, sed aceto rosaceo admixta hiberno tempore. Æstate vero aqua admixta rosaceo initio passionis caput foueri iubet, non continens quomodo ob magnitudinē transcurso initio extemplo passiōis, sumit augmentū. Dehinc etiam si initium habere pōtuerit, quod est difficile, erat melius constrictiuis vti leniorib⁹, vt oleo hispano atq; nouo. Etenim acetum & rosaceum percutit, & implet caput. Quod autem refrigerantis ac densantis virtutis est, crescēte stricture, incongruū esse perspicitur. Ita iuxta differētiā temporum hyemis vel æstatis fomenti mutare qualitatem, nullius est rationis. Item duob⁹ diebus, vel tribus transactis etiam hederæ folijs, vel succo, aut serpilli, aut mentæ, vel cuiusq; similis virtutis simplicium ac non vehemētium specierum cū oleo, atq; aceto per interualla fouendos dicit, etiā nunc non iuxta sectæ rigorem. Neq; enim ad numerū dierū oportet fomēta ordinare, cū debeamus magis passionē, vel tempus attendere, & neq; constrictiua tumorib⁹ atq; grauiabilia ægrotantib⁹ adhibere. Nam hederā cum bibitur mētis errorem inducit: cadit etiā cum in accessione thoracē putat vngendū, & in his qui forte ardorem sentiunt rosaceo fouendum. Hoc etenim quū virtutis sit densatiuæ, cōstringit tumentia, & ardorē geminat. Omne etiā vnguētū accessionis tēpore & magis in augmēto febriū incendiū facit ex superficie corporis ad altiora perducī. Peccat enī & in reprobādis odoramētis,

nō docēdo quæ illa sint, ac quot dieb⁹ abstinem⁹ ægrotos, vnguentū adhibēdo quod est laboriosum, nisi etiā cib⁹ fuerit datus. Oportet enī neq; cibari nō antecede^{te} perūctione, neq; perūgi nisi cib⁹ fuerit cōsequutus. Sed etiā post vñctionē aqua frigida faciē fomētat cōstringēs rursum tumētia, phreniticis strictura caput afficit. Omnis etenī phrenitico strictura caput affici nemo negat. item inaniter putat ex tertia die qua mente alienari coeperūt nulla accessionū discretionē cogēte, quotidie cibū dari. At si alternis dieb⁹ fuerit occurrēs accessio, alternādū etiā nutrimentū. Oportuit enī siue declinato solutionis metus occurrerit, atq; quotidianis diebus accessionis fuerint effectæ, omnibus cibū alternis dari. Nam nō potest corp⁹ diurnis accessioib⁹ grauātū suis partib⁹ applicare nutrimentā quę sumpserit. Sed hic grauius peccatis ait adiuuare etiā lauacrum, quāq; sit adhuc passio in gradu cōstituta, tribus tamē vel quatuor dieb⁹ trāsactis, quo mētis alienatio irruisse videtur. Quomodo igitur cōueniēs lauacrū passioi probatur, cū nec dū quotidianis dieb⁹ cibū dare videatur? Quippe cū adhuc passio suæ magnitudinis teneat sūmitatē, & ppter ea mitigatiua sit curatio magis q̄ turbatio ex lauacri cōmotioe adhibēda. Mitto quòd eger ad hęc magis moueatur alienatione mētis, nec vllō assensu nostro pareat iperio. Siquidē ferali mēte omnia quoq; accipiat, ac recuset. Itē iubet lauantes solū primo descēdere, tunc ascēdentes solū fricare plurimū & rursum descēdere, quod est laboriosum: sufficiebat enim defricatos, tunc solū descēdere cū se modico sēserint sudore vexatos.

CÆLII ACVT. MORB.

At iste post lauacrum oleo rosaceo caput fouet, quo grauius odore impletum ægrotâtes afficiat. Est autem incongruum atq; consequens laxata, vt putat, lauacro corpora oleo rosaceo fomentare, cum sit frigidaæ atque constrictiue virtutis, & propterea corporis efficiat densitatē. Non enim eius frigus erit aquæ frigidaæ comparandum, cū aqua frigida ob extinguendum feruorem, veluti cocti corporis adhibeatur. Rosaceū vero perseveratione quadam simili, atq; eadem vexatione iugi frigore, & odore percussibili caput afficiat. Vinum etiam dandum declinationis ordinavit tempore, cum neq; omnibus hoc sit adhibendū, sed solis illis qui simplici ægritudine afficiuntur. Dehinc non in omnibus prohibuit vinū salsum, sed in his qui sunt insueti, nescius quā consueti vexantur. Si quidem sit natura noxium febricitantibus vinum. Consuetudo autem nihil aliud prodesse, quā vt non plurimum corpora noceantur, potest. Nos vero oportet consuetudinem rerum vtilium facere, noxiarū fugere. Dat etiā vinum plurimum heminam, etenim vel tres dimidias iubet ante cibum, si fuerit sitis nimia cōsequuta. Quod est, vt sentio, sine vlla ratione: in graui enim ac periculosa ægritudine nudis & sitientibus visceribus, ingrediens vinum facile cōcurrit ad neruos, atq; mentis iudiciū tollit, cū non habuerit præmissum cibum quē incurrens quadam tarditate moretur. Proficiētibus igitur ægris perseverandum inquit in vtendo vino, si vero profectus cessauerit, tribus vel quatuor diebus aquam dabimus, vsum vini differētes. Rursum dierum numerum & nō passionis confide-

tantēs motū. Quapropter etiam si post tres dies difficultas adhuc declinationis obstiterit, non oportet ad vsum vini descendere, etenim sollicitæ passionēs his in pulsibus facile ad augmenta recurrunt. Hæc nunc Themison phreniticis curandis ordinauit. Sed post ex methodica secta multa bona contulit medicinæ.

Ad Heraclidem. Cap. XVII.

Empiricorū sufficit soli Heraclidæ Tarentino respondere. Etenim eorum posterior atq; omnium probabilior apud suos inuenitur. Idem namq; primo libro curationū de internis passionibus varias curationū differentias scribit, pro suspicionibus causarum. Nam primū phreniticū tacere iubet loco obscuro, Siquidē, luce, inquit, eorum mens asperatur. cum plerosq; magis videamus tenebris asperari, atq; luce eos qui adiuncta solutione afficiuntur, adeo vt si paulo vehementior fuerit, diaphoreticam faciat solutionē. Item iubet ventrē clystere deduci, tunc phlebotomiā adhiberi, atq; alia die rursum vsum innouari clysteris, non aduertens quomodo tumētibus præcordijs atq; extētis vel adductis simul cū visceribus periculosum est quicq; acre, vel quod commoueat immittere, quo retento tumor magis augetur. Dehinc turbulentū atq; vexabile & per omnia contrariū esse perspicitur, eadē die clysterem atq; phlebotomū adhibere. quippe cū neq; tempus vtendi dixerit, neq; qui sunt phlebotomiā discreuerit. etenim eos qui solutione afficiuntur nocet, vt gladius. extendit peccatū dicendo oportere quotidie adhiberi clysterē, vt neq;

Æ CELII ACVT.MORB.

quiescendū aliquod tempus occurrat, & cibo nō nutriatur, viribus priuet iniectio. Tradens etiam loca alia adiutoria, caput fouet decoctionibus lauri. Tunc nouacula radit, & ex eodem liquore vaporat. Post rosaceo oleo caput atque nares iubet vngi, percutiens tumentia ante declinationem ex fomentis supradictis, implens etiā caput ex odore lauri, atque grauedines ac vertigines efficiens. Similiter & ex oleo roseo constringens simul ac frigidans cerebri membranā. Imponit præterea cataplasma ex polline & aqua mulsa admiscens iris illyricæ decimam partem & lentiscini olei, & aromatici calami, quæ omnia ignea atque percutientia odoris causa esse perspicuntur: & oportebat tumentia congruis relaxare virtutibus. Item iubet post hæc medicaminibus vngi caput & nares hoc genere confectis, peucedani, castorei, opij vt in libro quem Nicolaum vocat olei amygdali amari pōdus supra scriptum sed prætriti, cū aceti sextarijs duobus & olei irini vncijs tribus, quorum vsus ita, inquit, erit adhibendus, vt præcalefacta apponantur, ex quibus grauatio capitis, atque commutatio nascetur, vt statim alienatio in pressuram transeat, cum tantis perniciosissimis malis ægrotantis caput obsidetur, empiricos laudat. mirandum sane vnde hæc ei venisse suspicio potuerit, vt discrepantium commixtio vnā facere virtutem posse putaretur: vel quæ illis natura vel fortuna fuerit magistra, quas sæpe suis inuentionibus duces fuisse testatur. Vel certe quomodo discrepantis historiæ in ista medicaminis confectioe iudiciū tacuerunt. Sed si hoc experi-

mentum dixerint apertissime delirabunt, ut laborans * empirica ad occultarum confugiat apprehensionem causarum. Item iubet nocte caput vaporari, si facultas fuerit papaueris decoctione, atque serpylli, non adiiciens sus causam, neque rationem qua sit hoc circa vesperam faciendum, cum tunc maxime phreniticis asperius tempus occurrat. Vaporatio autem caput exagitat, & tunc magis in requie fuerat habendus egrotans. Sed intelligimus eum in ista fuisse rerum diuersitate coactum, cum solas vigilias egrotantis attendit, somnum quibuscunque ambitionibus adhibendum existimat. Quinetiam potandos dicit egrotantes antidotum diacodion, cum mulsi sextario, vel seminali medicamine poto, quod diaspermation vocant, aut tussiculari, quod bechicu appellant: cum magis opium, hoc est papaueris lachryma, densitate faciat. Item seminalis potio acrimoniae causa incendium faciat viscerum, atque haec omnia grauando pressuram magis quam somnum facere videantur. Somnus enim laxatis fiet corporibus indulgentia naturali. Pressura vero densatis aduersitate morborum, igitur praescripto medicamine negligens tumentia contrariis strictura geminat rebus, non similibus, quomodo cum causa impeditiois somni, hoc est strictura augeatur, in lethargica passione egrotantes veniunt, vel certe maiores vigilias. item eodem libro accusans vtentes medicaminibus ex castoreo atque aceto & spodylio confectis & cataplasmatibus ex aceto siquidem sint acria, ipse quoque nihil minus peccare videtur, adhibens grauabiliora atque acriora. Etenim dicere quomodo non ad soluendam passionem, sed

CÆLII ACV. MORB.

seruādi ægroti causa hæc adhibuit, est omnino inertia. Nam primo quibus passio leuigatur, his etiā æger seruatur. Secūdo quib⁹ laborās retinetur in vita, iisdem etiā passio releuatur. Tertio cū non paruo periculo ex vigilijs afficiātur, mai⁹ tamē ex pressura Heraclides facere perspicitur, nā somnū fecisset grauabilib⁹ vtēs medicaminibus, cū sit semper, vt in vtilibus maius, sic in aduersis leuius eligendum. sed inquit, vt vinū mediocriter datum nutritibile ac salutare probatur, plurimū vero atq; immodice datū capitis grauedinē, atq; mentis errorem facit, sic etiā medicamen supradictū moderatione accedente somnos faciles facit, remota grauedine. Est autē exemplum dissimile horum, etenim medicaminū etiā si parū quidq; fuerit datū, grauedinem facit: si plurimū, mortem. Nam quia grauatio magis q̄ somnus efficitur, facile perspicere poterimus. Et enim de somno coloris melioris efficitur corp⁹, fortitudine quoq; acquisita. Ex medicaminis vero pressura pallor atq; debilitas, & grauatio corporis nimia sequetur. Dehinc omnis somnus in corpore spirabili atq; indulgentia laxato nascetur. Medicamina vero quæ ob vigiliarū mitigationē dantur, magis accessiōis tempore offerēda dicūtur. Tū enim vehemēter ægri vigilare nō scūtur; cū sit impossibile turbore corpus impleri, somni tunc indulgētia tēperari; cum hæc commoda medicamenta etiam sponte ventura corrumpat, incendat etiam altiora & præsentiē augeat accessiōē. Neq; enim etiam cibos consuetos, atq; qualitātē cōueniēs accessiōis tēpore offerre, vel quod multo leuius est, aqua corrumpi

posse negatur, ut cuique credendum sit supradicta
 medicamina, isto praesertim tempore digestionis
 officio superari. ait praeterea succubente passio-
 ne dādum viscellū simplex gallinaceū, vel succū
 ptisanæ, ordeī, vel orizæ, ac deinde per profectū
 ad vsum panis accedere, leui ex farina confecti,
 & gobionū pisciū pulmentū, secūdo carnis gal-
 linaceæ ac leporis, quæ nō recte quisque etiam de-
 clinationis tempore ob reficiendū corpus prima-
 dari permittat, quæ quidem declinatio forsitan
 nec futura sit his malignis egrotanti atque tan-
 tis affecto & nulla mitigatione, tolerato. Neque
 oris collutione neque potu neque cibo. Mitto etiam
 quia si dimissio fuerit facta, nō necessario tēpus
 accipit. praefinitū etenim nunc decima, nūc duo-
 decima die vel ultra saepius occurrit. quapropter
 tantis diebus innutritum ægrotantē relinquere,
 non solū noxiū, verum etiā impossibile esse per-
 spicitur. Dehinc gallinarū viscellū, facile corrūpi-
 tur, & est digestionē difficilis ordeī atque ptisanæ
 succus, oriza vero quod stringat nulli dubiū est,
 atque ita panis q̄titatē augere nos quoque admitti-
 mus, pisces autem gobiones dare prohibemus,
 etenim locū in passionib⁹ celerrimis vel acutis
 acrior cibatio, quā polyphagiā vocāt, nō habet.
 Item dari iubet, atque varios cibos & neque lauan-
 dam faciē, neque aliā congruā corporis diligentia
 ordinandā vidit, sine qua minime digestio fieri
 potest, non solū variæ cibationis, verum etiā sim-
 plicis, nisi corpori punctiōib⁹, atque alia diligētia
 recreato fuerit illata. Hæc est secundū Heraclidē
 curationis, prima phreniticorum differētia. illis
 verò qui cruditate phrenitici fuerint effecti, ita

curationem ordinauit, vt supradicta similiter adhibeantur. Cataplasma vero non prius quam clyster antecesserit, adhiberi iubet. etenim perniciosum est, inquit, pleno corpori hæc adhibere. Siquidem ad caput rapta materia in salutis periculum præcipitet ægotantem, atq; ita prohibendam dicit phlebotomiam, adhibendam vero corporis purgationem, poto medicaminem quod appellat diascammonias, hoc est quod ex diagredo cõficitur, quibus apparet hunc suæ sectæ peccata custodire, vt ea quæ empirici seruabilia vocauerunt, etiam nunc adhibenda existimet, adiiciens etiam peiora. Prohibendo phlebotomiam, quæ simplici atq; innoxio laxamento, nullis obstantibus adhibita facile laxato corpore passionem posset auferre, cuius in vicem nocetissimam adhibendam purgationem iudicauit scammonie quæ est grauior cruditate, quam ipse metuens in contraria venit argumenta curationis. Etenim ex hac corporis purgatione siue liquidarum detractiõne materialium corpus confluere manifestum est, atq; eius solida quadam dimissione lentescere, & in liquida migrando deperire. Mitto quòd neq; suæ sectæ seruauerit morem, quæ nunq; vasculorum corporis materias attenderit, si quidem sint nõ solum occultæ, verumetiam empiricorũ iudicio falsissimæ. etenim existimate, quòd discendæ passionis causa succorum nominauerit cruditatem, potuimus, nisi etiam curationis ordinem ipsum intuens discessisset, adeo vt etiam scammoniam bibendam credidisset. Quærendũ etiam vbi esse cruditatem suspicetur, vbi scammonia putaret detrahendam. in intestinis? sed

sic fuerat melius atq; facili⁹ eam clystere purgare. an in capite, an vero in toto corpore: sed cum hæc incerta dimiserit, videtur iudicium sui operis medicamini dimisisse, vt tanq̃ sentiens animal operetur, separando à naturalibus aliena, hoc est cruditate corrupta, atq; sola detrahere. Tertiam inde curationis scribit differē tiam, qua iubet, si totum corpus non fuerit multo sanguine grauatum, sed solæ capitis partes videantur implete, ex vena frontis detractionem fieri: cum neque passionis esse causam sanguinem videamus, neq; ex patientibus locis detractio aliquid medeatur, etenim magis patiē tes adimplet partes. Primo ex antecedenti fasciolæ cō strictione, secundo ipsius coactæ materiæ concursu. illos vero quos corruptione, inquit, in passionem venisse viderimus, clystere purgandos, aquam dantes largius bibē dam. Aliquā do etiā mulsum, vinum chium, aut rhodiū, sed primo aquatum, secundo etiā meracum. Hic etiā rursum suspectæ rigorem contempsit suspicionibus in errorem deductus, liquidarum materialium corrupta temperare festinans, & ita iugiter, vt incurabilem faciat manere passionem. Dat etiā sine tempore vinum, & quid pluribus? ita curandi diligentiam permisit, vt varia mobilitate videatur esse cō fusus, quorum omnium meminisse decet, sed sola supradictorum probari ratione. Hæc sunt quæ de phrenitica passione credidim⁹ ordinanda, nunc de cæteris celeribus vel acutis cū febriculâ passionib⁹, sequē ti docebim⁹ libro.

CAPITA LIBRI SECVNDI.

De lethargo Cap. I.

Quæ sequuntur eos, qui in lethargiam venire possunt se noscuntur. Cap. II.

Quomodo discernimus lethargos ab his qui similibus afficiuntur. Cap. III.

Quomodo curandi sunt lethargi. Cap. IIII.

Ad Dioclem Cap. V.

Ad Praxagoram Cap. VI.

Ad Asclepiadem Cap. VII.

Ad Themisonem Cap. VIII.

Ad Heraclidem Cap. IX.

De apprehensione vel oppressis, quos Græci cataleptos appellant. Cap. X.

Quomodo curandi sunt hac passione laborantes. Cap. XI.

Quomodo aliarum sectarum principis istam curauerunt passionem. Cap. XII.

De pleuritica passione. Cap. XIII.

Quæ sequuntur pleuriticos Cap. XIII.

Quomodo intelligim⁹ pleuriticam passionem in peripneumonicam transeuntem aut in vomiticam venientem. Cap. XV.

Quis locus in pleuriticis patitur. Cap. XVI.

Quæ sunt similia pleuriticae passioni: & quomodo internoscuntur. Cap. XVII.

Quomodo curandi sunt pleuritici. Cap. XVIII.

Ad Hippocratem. Cap. XIX.

Ad Dioclem. Cap. XX.

Ad Praxagoram. Cap. XXI.

Ad Asclepiadem. Cap. XXII.

Ad Themisonem Cap. XXIII.

Ad Heraclidem. Cap. XXIII.

De peripneumonia. Cap. XXV.

Quæ est pipneumoniæ intelligētia. Cap. XXVI.

Quomodo intelligitur peripneumonia.

Caput. XXVII.

Quis locus in peripneumonicis patitur.

Caput. XXVIII.

Quomodo curandi sunt peripneumonici.

Caput. XXIX.

De cardiacis. Cap. XXX.

Quid est cardiaca passio, vel quomodo eius cognitio tradenda. Cap. XXXI.

Quomodo intelligimus eos qui in cardiacam venire possunt, aut etiam in ipsa constitutos.

Caput. XXXII.

Vtrum ne febricitent cardiaci. Cap. XXXIII.

Quis locus in cardiacis principaliter patitur.

Cap. XXXIII.

Quomodo discernimus cardiacos ab his qui in stomacho patiente sudauerint. Cap. XXXV.

Quomodo discernimus cardiacos ab his qui sudore prospero liberantur, quem græci criticum vocant. Cap. XXXVI.

Quomodo curandi sunt cardiaci. Cap. XXXVII.

Quomodo aliarum sectarum principes cardiacos curauerunt. Cap. XXXVIII.

Vtrum recte Asclepiades cardiacos curauerit.

Cap. XXXIX.

Vtrum recte Themison cardiacos curauerit.

Cap. XL.

CAELII AVRELII NI METHODICI SICCEN

sis Oxcon Liber Secundus.

De Lethargo.

Cap. I.



Elerum cū febricula passi-
onum primam superio-
re libro tradidimus phre-
nitim, nunc lethargicam
cum cæteris ordinamus.
Vocatur lethargus à cō-
sequēti passionis obliuio-
ne, græci enī lethen obli-
uionem vocauerunt, an-

giam vacationem, quam corpori atq; animæ in-
gerit vis supradictæ passionis. Et est comparatio
grauior phrenitice. Non aliter q̄ negatus in toto
visus, ab ex parte impedito: vel silētium ab im-
pedita loquutione, aut surditas ab auditus falsita-
te, vel hebetudo sensuum, à difficultate. Denique
vehemēti strīctura phrenitici, sepiissime in lethar-
giam venerunt. Vtq; declinante lethargia aliquā-
do econtrario lethargi in phrenitim deciderunt.
Quorū rariū ex supradictis prima contingunt.
Siquidem facile periclitantes passionis magnitu-
dine in peiorem deueniant, difficile autem in pe-
riculis bona locum accipiāt. Quapropter Ascle-
piadi credendum non est, dicentī pullum, atq; re-
spirationem humaniorem lethargis q̄ phreniti-
cis esse, siquidem habeat magnitudinē & percus-
sum fortiolem, tanq̄ iugi somno dormientium.

sed neq; iste somnus est impeditis omnibus naturalis accessionis officijs, sed est oppressio quæ nihil resumat ægotantem, ac potius demergat. Neq; etiam pulsus fortis, sed magis debilis percussus inuenitur, atq; piger ac inanis. Quod autē in inflatione erectus videtur, nō fortitudinis causa, sed passionis neqtia id efficitur. Deniq; in his quibus ob phreniticam passionē paruus est pulsus, sæpe peiorante morbo, atque in lethargiam transeunte, pulsus in magnitudinem erigitur ob specialem proprietatem passionis, non proficientium virium causa: quippe cum generaliter stricture peiorante omnia deterius roborentur. Sed hanc pleriq; diffinientes passionem, aiunt lethargiam esse delirationem cum febribus acutis ad perniciem ducentibus, & erat non delirationem, sed pressuram dicere. Demetrius autē Herophilus passionem inquit acutum cum pressura & obstructione sensuum cum febribus. in qua diffinitione ambiguum est, quod sit accipiendū frequenter. Vtrum ne antecedenti seruiat orationi, vt intelligamus frequenter cū difficultate sensuum: an consequenti sit orationi iungendum, vt intelligamus frequenter cum febribus: an verò vtriq; seruiat parti: quo inuenimus nihil rectē esse diffinitum, semper enim cum difficultate sensuum atq; febribus hæc intelligitur passio. Asclepiades hanc passionem non definiuit, sed Alexāder Laodicensis ex Asia secundum ipsum ait lethargum esse subitam, vel recentē cum febribus, & pressura atq; sensuū iugi difficultate. Sed esse videmus plerunq; etiā cū dimissionib⁹ lethargiā & pressuram, id ipsum esse perspicimus, quod est

ſenſuum difficultas, q̄q̄ hāc grauiorē putauerint
 preſſurā. Nec ſanè debuit in diffinitione magni-
 tudinis differentias ponere, ſed paſſionis genus:
 quemadmodum intelligatur manifeſtare. Nōne
 etiam complexionem magis phreniticæ paſſio-
 nis cum lethargia dediffe videtur? Deniq; aliena-
 tio ſubita acreſcens cum febris acutis phreni-
 ticæ eſt paſſionis. Preſſura verò cum febris le-
 thargiæ Atheneus Tharſenſis, furorē, inquit mē-
 tis cum mœſtitudine. Siquidē Aſclepiades in pri-
 mo libro celerum paſſionum dixerit phreniticis
 alienationem cum turbore effici, in lethargis cū
 ſomno atq; triftitia. Alij alienationem cum mœ-
 ſtitudine & iugi ſomno eſſe lethargiam dixerūt.
 etenim non habent mentem in furorem exten-
 tam, vt Atheneus ait, ſed ſola in alienatione cō-
 ſtitutam, vt Aſclepiades. Sed etiam nunc tradi-
 tiones caducas ſimul aduertendas exiſtimo ex
 his, quæ ſupra memorauimus: non enim ſomnus
 in lethargis eſſe aduertitur. cæterum nullum pe-
 riculum ſequeretur. Neq; etiam acceſſionis tem-
 pore magis ægros afficeret. Item neque iugis in
 omnibus eſt preſſura, ſed etiam plerunq; dimiſ-
 ſionis intercapedine leuigatur. At ſi cum febris
 buſ eſſe non adiungerent, vt Aſclepiades fecit,
 communis eſſet cum epilepſia diffinitio. Leoni-
 des autem epiſyntheticus lethargus inquit, eſt le-
 thargia ſecundum vias membranarum, cum fu-
 rore mētis atq; febre, & mœſtitudine, ac preſſu-
 ra & pulſu magno. Sed neq; cauſam oportuit di-
 cere quæ ſit occulta, atq; apud veteres diſcrepās,
 & iniudicata, cū paſſionem manifeſtare fuerit
 neceſſarium. Neq; etiam mœſtitudinē, vel trifti-

tiam atq; mentis furorem. Etenim pressuram in semet moestitudinem atq; furorem cōtinet. item Menemachus pressuram inquit, celerrimam vel acutam cum acutis febribus, & non semper iugibus. Soranus vero cuius hæc sunt quæ latinizāda suscepimus. Pressuram inquit, celerem esse, vel acutā cū acutis febribus, & pulsu magno, ac tar- do, atq; inani: frequētare inquit, in senibus. Siqui- dem aptior sit sensuum difficultati atq; demer- sioni ipsa quoque senectus.

Quæ sequuntur eos, qui in lethargiam veni- re posse noscuntur. Cap. II.



Equuntur eos qui in lethargiā faci- les, ac proni esse videntur, aliqua cō- munia ex his quæ etiam in phreni- tim fore denuntiat. Aliqua propria quæ etiam causa communi tanquā propria accipimus, vt sunt ea quæ in phreniticā venturos passionem designare præscripsimus, vt febres acutæ ac vehementes & sæpe continuæ, ac difficile ad superficiem corporis ascendentes, capitis grauedo, vel somnus, aut dolor vehemēs repente, ac sine ratione recedens, tinnitus auriū, vultus inflatio, pallor tanq̃ ex vinolētia & mœ- stitudo, vel tristitia. Erit præterea tacitus is, qui natura atq; sanitatis tēpore fuerat multiloquus. Tunc piger ac non sponte initiās loquelam, sed alienam prosequens suarum tacitus querelarum, aut non digna ratione referens. Multo etiam ve- luti somno affectus, nec quicq̃ somnians, aut eo- rum quæ somniauerit memor. Schema iacendi frequenter supinum contra solitam consuetudi- nem, oscitatio iugis, extensio crurū, tanq̃ mox ē

somno expergiscētis, pulsus etiā inæqualis post aliquādo saltus, ordinatus, aut inordinatus, & pro ætate, aut naturā maior, aut tardior. Aliquando etiā in inanitatem intercapedinatus. Quod denique si in phrenitica passione contigerit, in lethargiam transituros ægrotantes significat, etenim maiorem pulsus fieri, neq; tardum neq; inanē, sed ætati ægrotantis convenientem, speciem declinantis phreniticę passionis accipimus. Certius etiam quoties circa numerum æquales minoribus maiores saltus efficiuntur, ac velocibus & dēsis & vehementibus. Multo potius si etiam multi maiores atq; celeres fuerint. quidam attendunt etiam naturam ægrotantis, si saluosus semper fuit. Etenim declines atq; faciles istius modi naturę impressuram probantur attendendā etiam consuetudinem. Aiunt vtrum ne febricitans, in pressuram venire ac demergi solebat. Ætatem quoq; vtrū ne sit mediæ: & aëris habitum, vtrū multis hāc ingesserit passionem: & animi vel tēporum partem, vtrum autūni media. tunc enim frequentare istam passionem probauerunt.

Quomodo discernimus lethargos ab his qui similibus afficiuntur.

Caput I I I.



Am lethargū intelligere debemus. Est enim melius atq; certius sicut in phreniticis dicere, q̄ si dicas, quæ sunt signa lethargi. Vnum enim quicq; singulare, vt est pressura, vel febricula non significat lethargum, sed plurima atque sibi conuenientia, vt concursus multorum

signum faciat, indicabile lethargi. Lethargus vero sit signo indicatus, vt supra diximus. intelligimus lethargum ex obtrusione, atque hebetudine sensuum, pressura etiam, atque febre acuta siue iugi siue demissionibus intercapedinata, pulsu magno, tardo, inani, & inflato. Sine his enim neque esse intelligi lethargus potest. Nam quædam præterea alia sequuntur multa, vel pauca secundum passionis magnitudinem, vel generalis temporis atque specialis differentiam. Primo igitur sequitur dubia atque somni similis pressura, & demersio, sed quam facile æger vocatus excutiat, interrogatus sane non statim, sed secundum respondeat. Tunc iussus, vel oscitatione persuasus, inspectioni linguam exerere, aut non id faciat, aut tardè fieri consentiat: vel cum protulerit, non reducat, aut tarde colligat. Si quid etiam manū tenuerit nescius, atque sine voluntate dimittat, & loquens, priorum obliuiscatur. Et neque enuntiationis ordinem seruet, sed potius intercedat. Expressere etiam quæ loquitur non valeat, nullo corporis attestante defectu, manus impatienter extendat attestante tremore, atque membrorum saltu. Nulla etiam siti afficiatur, sed frequenti, ac refluā saluā ore impleto spuerē contendat. Tunc supra mentum atque stramenti sputa remaneant, ac si vrinam mittere fuerit admonitus matellam non postulet, vel si petiuerit nesciat datam. Atq; vrinam non dimittat, nisi fuerit admonitus. Hanc quoque difficulter excludat, vel paulatim & turbulentam, aut plurimam: saluam aut exustam, & crassiozem, aliquando etiā indigestā:

CÆLII ACVT.MORB.

crescente passione iacendi schema supinum iuge efficitur, color plumbeus, vel liuidus vultus, ipse conductus atq; concurrentibus supercilijs caperatus, non aliter q̃ mœstitudine siue luctu videmus oppressos, lapsus etiam à superioribus lecti partibus, ad inferiora, negligenter abiectis cruribus, atq; conuersis, residuo quoq; corpore non recte disposito, pulsus maior, rarus, inflatus: respiratio tardior, ac maior cum quodam gemitu, cōductio præcordiorū ad superiora, oppressio sensuū, & difficilis recordatio, adeo, vt nili puncti vel inclinati fuerint, non excitentur, sed solum motis labijs leuiter, atq; cōductis rursus demergātur. Sint etiā obscuræ vocis, ac deinde si fuerint manu laceffiti, aut punctione aliqua adhortati, vel titillis, non exaudiant. Vel si quis eorum manus leuauerit, ac dimiserit, statim concidant. Ventris etiam atq; vrinæ officio cessante, adeo vt pleriq; ex passione liberati discussa pressura, vrinæ reddendæ impossibilitate moriātur. At si passio in peius duxerit ægotantem, respiratio crassescit, ita vt ista videatur palpebrarum quoq; non perfecta conclusio. Oculorum cauitas, linguæ ariditas, atq; asperitas, dētium confixio, atq; stridor, adeo, vt si quisq; velit facere eorum discretionem, non valeat, vel certe semiclauso ore ac dimisso, ita vt mentum propendens videatur, & neque manu conduci separata possint, stridore pectoris attestante, atq; immissi, vel destillati ob nutrimentum liquoris, difficilis atq; interrupta transuoratio. Pallor & saltus inferioris labij, articulorum stupor, vnguium liuor, guttur prominens, atque extans, pulsus humilis, ac per profectū diminu-

tus, sudores frigidi, & glutinosi, vultum secus & collū, plerunq; etiam inuoluntaria vrinæ, vel stercoreum emissio, & spasmus, hoc est, membrorum conductio. At si ad salutaria signa æger coeperit recurrere, vt passio minui videatur, omnia supra dicta leuiora efficiuntur. Et quidam profecto in sanitatem veniūt, reddita scilicet valetudine meliore. Aliqui vero alienatione mentis recedente pressura tentantur. Tunc etiam pulsus humilior, atq; densior fiet, aut admoniti rursū demerguntur, vt cum plexæ duæ passiones videantur. Aliqui deniq; è lethargo liberati absolutam phrenitim incurrunt, ac deinde ad sanitatē peruenerūt.

Quomodo curandi sunt lethargi.

Caput. III.



Quomodo & defectio animi in febribus veluti sensuum facit hebetudinem, ita mandragoram, vel altercum bibentes opprimuntur grauatione sorbili, sopori simili. Item alij lumbricorum adiectione deprimuntur. discernenda cuncta sunt, ne vnq; similibus inducti vera putemus. Defectionibus igitur animi densus atque paruus, & coaceruatim interiens pulsus efficitur. Mandragoram vero, vel altercum bibentibus, pulsus rarus, sed plenior fiet, à lethargis inanis & inflatus. Item his qui lumbricorum vexatione afficiuntur, vel demerguntur, densus & velox & paruus, & deficiens pulsus inuenitur. Et magis tempore dimissionis febris, ex accessionis augmento, quantum creditur, non valent ventrē vel stomachum lactare, atque fellare. In dimissione vero, resumpta inhaerescunt visceribus suis.

CÆLII ACVT.MORB.

prædictis, atq; ita cōsensum pressuræ ex antecedētib⁹ faciūt. Sed hæc diligētius chronias passiones scribentes, cū de lumbricis dicemus, docebimus.

Ad Dioclem.

Cap. V.



Vidam Asclepiadis sectatores etiam differētias lethargorū tradūt. Alium enim per se dixerunt, aliū ex antecedenti passione, vt phreniti: atq; ex ipsa venientem esse grauiorem. Item aliū esse nouū atque recentem, aliū inueteratum atq; tardantē, quod ex numero dierum conijci dixerunt. Et aliū fieri cruditatis corpore, aliū inani atq; passione macerato. Sed nullam lethargi velut ad lethargum, differentiam tradiderunt. existimabile non certum probatum est liquidorum plenitudinem iudicare. Item Mnaseas lethargum aliū strictura effici, aliū solutione dicit. Siquidem somnus nunc densitate, nunc laxamento corporum fiat, atq; in alijs abstentis videamus officiorum naturalium egestionem: in alijs vero largius influentes, adeo vt etiam inuoluntario exitu stercoreum, siue vrinæ fundātur. Item multi nostrorum, tēporibus atque magnitudine cōstare lethargi differentias tradiderunt. Alium enim magnum, aliū paruum esse dixerunt: & aliū initio, aliū in augmento, aliū in statu, aliū in declinatione, & accessione vel dimissione. Sed omnes illius summæ atq; generalis passionis differentias tradiderunt, & non specialem lethargi. Falsum etiā solutione lethargum fieri, quantum intelligitur, atq; est lethargus. Etenim inuolūtariā egestionē dixerunt, in infantibus nō solutionis ratione, sed

mentis occupatione fieri. Nihil deniq; plusq; naturæ conuenit,excludunt, sed solum quod debuit etiam voluntate deponi. Tenuēs etiam sudores pressura fieri, non solutione intelliguntur, sed neque adiutorijs laxatiuis, sicut in adiutoriorum libris demonstrabimus. Quapropter lethargi differētiās tradendas esse negamus.

Ad Praxagoram.

Cap.VI.



MAlē quidam etiam patientem in lethargo partem, caput dixerūt, vt enim de phreniticis dictū est, communiter totum corpus patitur, febricula testante: specialiter vero caput plus ob multitudinē vexationū, q̄b⁹ afficit. Difficile igit̃ intra primā diatriton lethargus fieri potest, sed frequēter post ipsā: & oportet iacere in loco lucido, atq; calido mediocriter. In accessione p̄ interualla leuiter excitari, suo nomine exclamatū. Etenī iugiter titillatu, vel imp̄ssione, ac pūctionib⁹ hoc facere nihil aliud q̄ stric̄tura erit asperare, ob ingetudinē quassationis. Dehinc p̄babilior atq; eligēda erit quassabili, & noxia vigilātia, q̄eta pressura. blādo etiā articulo rū fricamēto vtendū est. Est autē accessione iugī fomēto caput curādū, oleo dulci, atq; calido, mol lib⁹ lanis collū tegēdū. Blādioris laxamēti causa locorū capitī vicinātiū, & ob excipicdū ex fomēto, si qd ē capite fuerit lapsū. Tūc aliquando etiā elato ad lectum, translatione facta & declinante accessione oris collutio adhibenda: terminata vero, potus dandus. At si febrium continuatio fuerit, primo tempore lucis erunt media fouenda, atque dorsum lanis mollibus circumtegendum: si

CÆLII ACV. MOR B.

magnitudo passionis exegerit, phlebotomia adhibenda intra primā diatriron, aut in ipsa. Dehinc si ante diatriron fuerit adhibita, sola fomentatione utemur, atque oris collutione, & potu aqua vel mulso. atque si in ipsa diatriron phlebotomia fuerit adhibita, paululum differentes perunctionem adhibemus, atq; oris collutionē. Tūc dabim⁹ sorbilem cibum ob celerem passionem. Si fastidiosus fuerit ægrotans, tanq̃ sanis sæpe cōtingit, post altum somnū, experrectis, vel si trās uorationis oblitus, aut piger, tanq̃ sunt sani, imminente somno declives in soporem, erit acceleranda alicuius cibi transuoratio, ut corpus relaxetur. Nam grauiore stricture lethargi phreniticis afficiuntur. Dehinc post cibum paululum differentes, atque articulorum blanda fricatione utentes, dormire permittimus, atque vsque ad declinationis tempus, alternis diebus à cibo abstinemus, permittentibus viribus, solo mulso utentes. Si autem vires obstiterint, etiam his diebus sorbilia mediocriter damus. At si venter non fuerit solutus, clystere utemur, oleo calido & aqua in qua decoctum sit fenugræci semen, admixto aliquādo melle. Tunc sicut in phreniticis tondendum caput atque radendū, & apposita cucurbita scarificandum, & sanguisugis releuādum. At si media tumeant, simili curatione cucurbitæ, atque cataplasmatum utemur, tanquam in phreniticis ordinauimus. Attendenda etiam cætera passionū accidentia, quæ symptomata græci vocauerunt, ut ea quæ in corpore frigida fuerint mēbra, blādo tactu manibus continētes, leuī cum fricatione vaporemus, sudantia citius detergamus, linguæ

asperitatem vel ariditatem spongia infusa aqua calida humectemus. Nam sepe faucium siccitate præfocationis imitamur effectum. Tunc oculos levis obritos, vel lachrymantes spongia vaporabimus, atque ita dimerfos excitamus. Calidus etenim tactus habet quoddam resumptionis illatæ leuamen. At si pressura perseverauerit etiam dimissionis tempore, & propterea cibi dandi difficultas occurrerit, oportet ægrotantē in pressura excitari, donec sentiat. tunc priusquam rursum demergatur, distillandum ex cochleari sorbibile quiddam faucibus, atq; manu mētum quod laxius propendet, subleuandum, vt infusa priusquam reuocentur, transuoratione vorentur. At si forte mutatio accessionum, atq; pressuræ fuerit facta, quod quidem raro contingit, vt in continationibus, cibi tempus oriente luce est aptius. Utendum etiam spōgiarum vaporationibus, & fomentis capitis, atq; domestica molli, ac pensili gestatione. In declinatione vero certissima, varius cibus dandus, & lauacrum sine vino adhibendum scilicet, in alia vero diatrīto danda poma: tunc etiam vinum. quorum rationē ex his quæ in phreniticorum curatione sunt ordinata, accipiēda dicimus. Tunc cerotarium scarificatis partibus apponemus. Hæc est secundum Methodicos lethargorum curatio. Antiquorum vero Hippocrates, & Erasistratus, & Herophilus ad eorū curationem nihil posuerunt, sed Serapion Empiricus in primo libro quæ ad sectas scribit obscura nimium, atque pauca ordinauit, quorum nihil est dignum enarrare.

CÆLII ACVT. MORB.

Ad Asclepiadem.

Cap. VII.

Diocles libro quo de passionibus atq; causis earū, & curationibus scripsit, prohibet demergi lethargos, acutissimis vtens potionibus, atq; iugiter corpus defricat, adhibēs etiā sternutamēta, quæ græci ptarmica vocauerūt: & neq; manifestans, quas vocat acutas potiones, vtrum in qualitate acutas, vt est acetum, an officio vsus, vt est celerrima transuoratio, sed vtrum elegerit, malè dictū est. Alterum enim dēsat corpus strictura laborans, alterum inflat. Item sternutamēta corpus vehementi motu concutiūt, & magis mēbranas capitis in tumore constitutas iugiter excitare, sine dubio asperatio passionis est. Peccatur etiā grauius sine vllō adiutorio caput relinquendo, in quo secūdū ipsum passionis est causa.

Ad Themisonem. Cap. VIII.

Raxagoras secūdo libro de curationibus, in forbilibus cibis, hoc est ptisanæ succis, semper, inquit, ægros oporteret seruari. Cū nō semp hoc cōueniat, quādo decliuis tēpore, oportet varia ciborū resumptione vires reparari, non tunc vtī succo ptisanæ, sed ipsa potius. ille enim & corrūpi facilius, & inflare perspicitur. Deinde clysterē iubet adhiberi, & nō, inq̃t, metuēdū si remāserit, nō reddit⁹. Erat hoc verē rationis, nisi esset virtutis acrioris. Sed q̃a est acerrimē, atq; mordicātis qualitatis iuxta veterū consuetudinē, quomodo sperandū est nō graui⁹ nocere q̃to plus fuerit tumētib⁹ partib⁹ immorātū? Dat etiā meracū bibere, acetū cū melle, & piperis immodica q̃tita.

te, vel pro vino, absinthium, dicens latere ignaros vini dationē, & fomētū adhibet pedū. sed ex his omnibus nihil sperandū est vtile, sed magis incēdia viscerū, vel altiorū, & veluti putredines tumētū mēbranarū ob nimietatē feruoris. Nō enim cū acriora collyria tumētes oculos, in dolores atq; lachrymas plurimas cogere videam⁹, mēbras quoq; cerebri delicatas atq; faciles ad iniuriā ob naturam sui tumētes passionis causa minime ex supradictis inuri credere potest, cum singula igneæ virtutis esse monstrentur. Item meracū, inquit, hoc est vltra moderationē tēperamenti cōmixtū acetū cum melle dari & appellavit oxy-meli. Nec tamē manifestauit quid sit vltra modum temperamenti mittendum, vtrum ne mel debeat superare, an acetum, non enim adiecit aquam quoq; miscendam. Dehinc quam similitudinē potest absinthium habere cum vino, vt in eius vicem dandum iusserit, cum sit & hoc generaliter acre, atq; densabile. Vinum verō omnibus ante declinationē ægritudinis aduersum est, & magis lethargis ob nimīā vehementiā passionis, immoderate vero, vt ipse voluit meracum, etiam fanos demergit. Ridēdum præterea quòd caput patiens incuratum relinquendum putat, & fomentum pedibus adhibendum, per venas auertendæ materiæ traductus.

Ad Heraclidem.

Cap. IX.



Sclepiades primo libro de acutis passionibus scribens multa, inquit, adhibenda lethargis, quę phrenitis sunt ordinata. Nititur etiam iugiter diuersos excitari sternutamē

CÆLI AC VT. MORB.

tis, & odoramentis castorei, rutę & aceti, & spō-
 dylio, & conidia, & agno, herbis: baccis etiam lau-
 ri, vel communiter, inquit, omne quod tenuare
 atque mouere vehementer membranas valeat ce-
 rebri. iubet etiam ea adhiberi quę epilepticis, vel
 matrice pręfocatis adhibuit odoranda, hoc est la-
 nam, vel capillos, aut cerui cornu, vel galbanum
 carbonibus imposita: & omnia quę caput graua-
 re valent, vel iniucunda sunt odoranti. Omnium
 inquit præstantius, atque operantius esse sina-
 pi tritum cum aceto admixto atque hinc caput
 cataplasmandum, & dandum manibus, quod
 excitet ægrotantem. Potum dat bis in die vel
 ter, & veniente nocte offert tanquam phreniti-
 cis vinum, vel eo audacius. Etenim, inquit, ac-
 cedere ex vino furor in phreniticis potest: in le-
 thargis vero nunquam. Siquidem sint omnes sen-
 sus apprehensi, atque mentis vigor oppressus.
 ex quibus apparet peius cum à phreniticis le-
 thargum cæca curatione vexare. Etenim noxi-
 um atque perniciosum est iugiter eos excitare, si-
 cut supra diximus. Multo autem grauius non cō-
 munibus remedijs hoc facere, sed, vt ille putat,
 sternutamentis immoderate mouentibus, atque
 dissecantibus corpus & magis cerebri membra-
 nam, in tumore constitutam. Si enim pedes quā-
 quam sint habitudine fortes, in tumore consti-
 tuti paruo deambulationis motu facile vexātur,
 atq; ob iniuriam in augmenta tumoris veniunt,
 quomodo non membranę cerebri in tumore cō-
 stitutę, atque viarum densitate constrictę, magis
 posse moueri creduntur? Dehinc perseverare ma-
 gis sternutamēti vsum iubet, vt scilicet ita forte

conuenire videatur, tanq̃ in chronicis passionib⁹, moderatione interea cessante, noxius atq; vexabilis esse probetur. Extendet etiam peccatum ex castoreo atq; aceto & ruta & spodylio atq; agno herbis: & lauri baccis, & conidia. Etenim acetum acre manifeste probatur, & quòd valeat membranam inurendo vexare, cum laxamento, non constrictione indigeat. alia quoq; graueolētia & quæ pressurā faciant nō solum demersis, verum etiam recte valentibus, improbātur. Hæc peccāter ex epilepticorum curatione, atq; præfocationis matricis transferenda iussit, cum constet etiā in ipsis adhīberi nō oportere sinapi, etiā si chronicas passiones quadā corporis nouatione excludit: acutas autem vel celeres prouocans, in magnitudinem tollit. Omnis enim acrimonia tumoribus incongrua. Nam & temporaliter quidem æger omnis tanq̃ adustus igne cōsurgit, sed rursum grauius opprimetur. Oportet etiam secundum eius præcepta manente capillatura aliquod cataplasma apponere. Et propterea nō parui temporis vexatione membranam afficere. Nam tonsuram noxiā phreniticis probat. His etiam lethargos similiter curandos existimat, quo fiet vt etiam in ipsis tonsurā prohibuisse videatur. Nō enim in illis materiæ post tonsuram ascēsus vexabiliter caput poterit onerare, in lethargis vero id minime facere: quæ si tanq̃ vexabilis, excludenda est, multo magis sinapi excludendum. Adducit enim ad semet materiam sicut inflatæ atque in ruborē deductæ eius appositione partes demonstrant. Nanq; adductam tenendo cogit, & viarum perficit densitatem. Dehinc odore

CÆLII ACVT. MOR.

penetrando membranas inurit, & tanq̃ acre collyrium oculos, sic mentes inflammat. Quomodo etiam fricare manibus sinapi lethargos potest cum sensib⁹ ac mente captus esse videatur. Atq; ita odoramentorum tempus tacuit, & solam materiã nominauit. Hoc quidem etiam de dando potu fecisse perspicitur, dicens: quoties detur temporũ tacita disciplina, vinum etiam lethargis est incõgruum nulla declinatione passionis firmata. Simile est enim ebrios ac vinolentia madentes vino oportere vti tanq̃ congruè superdato, in quibus periculum spãlmi fore nemo sapiens negat. At iste importunius verò lethargis probandum existimat, sperans vini furorẽ sub oppressione passiõis posse latere, vehementer enim curandum putat occultare noxia quàm prohiberi. miseros igitur lethargis phrenitici iudicandi, & experimẽtorum probationi subiecti, nãq; etiam in lethargis demersionis aucta vexatio ex vini efficitur potu. siquidẽ spiratio alia ac conductus corporis atq; raptus adueniat, & celerrime mortis sequatur effectus. Themison libris acutarum vel celerum passionum rectè cætera ordinauit, sed iubet obscuro in loco haberi lethargos. etenim, inquit, lux apta non est, siquidem moueat atque turbet corpora, & non sufficiant spiramenta turbationis commotæ congruam exhalationem præbere. Quapropter etiam sani in luce dormientes grauantur, quorum maxime hĩ qui sole dormierũt vexari noscuntur. Non aduertens quòd omnis tenebrosus aer constringit. Lethargica autem passio nullo alio magis quàm stricturna cognosci

tur,quam necesse est augeri ob solis densitatem. Sub sole autem dormientes grauari etiam nos asserimus, sed ob contrarietatem afficientium causarum. Lux enim solis atque vapor relaxat, e contrario somnus astringit. Dehinc lethargia grauis atque pernicioſa eſſe paſſio perſpicitur. Somnus autem naturale eſt officium. Item ſol grauatur caput, lux autem quam lethargicis adhibemus tectorum ſub tegmine nullo vapore luſifici ſolis augetur, neque ſplendore radiorum perſuſum corpus grauiter afficitur ægrotantis. iubet etiam parua per interualla eorum faucibus inſinuari liquorem, quod præter tempus faciens ardorem illum, cuius cauſa id adhiberi exiſtimat, augere potius quam minuere videtur. At ſi venter ſtriſtus fuerit, aloës iubet dari apponendum triobolū, hoc eſt, dimidiā drachmam, cum aqua ante cibum, prodeſſe inquit prius quam paſſio augeatur. Siquidē multa quæ ad caput ex corpore concurrunt detrahentur. Soranus vero qui normarum regulis methodum reſtituit, noxiam eſſe inquit iſtius modi potionem. Forſitan enim ob nimiam ſtriſturam retineatur, & non ſolum nihil egerat, verum etiam ipſa remaneat. Credibile autem ad eius pigmenti in ſtomacho effectum ſenſum, accurrere materiam, ac deinde ad caput recurrere, quod per vias ſtomacho vicinū & mēbranas ad rapiēda quæ ſunt ſumma facultate aptiſſimum ob tumoris feruorem, dehinc grauius augeri peccatum videmus, cum ante cibum hoc medicamen dari iubet. Adieſtus enim cibus neceſſario corrūpitur, manente adhuc in ore aloë. Corruptio autē cibi vexat ea

quæ se circumplexa sunt, attrahens deinde materiam à capite. Attrahit etiam eius nutrimentum. Non enim ratione quadam tacita veluti animal sentiens poterit medicamē animalia relinquere, & ab his quæ contra naturam sunt detrahenda separare. nutrimenta igitur propria perdere dubium nō est, cum vi medicaminis detrahuntur. Post tertiū diem sternutamento utitur, cum ipse prohibuerit lucido in loco ægrotos iacere, siquidem moueantur atq; turbentur liquida & spiritus. sed utique multo vehementius sternutamēta cōmouere posse perspicimus. Dehinc quatuor inquit, vel quinque dies, declinate accessione si nihil obstiterit, vltra muros producendus ægrotās, & vsq; ad viginti, vel triginta stadia gestatiōe mouēdus. Quo tempore excitare etiam cōuenit, atq; sternutamento & acetum cum sinapi odoramento uti, vel cataplasmatibus, & hoc per totam passionem faciendū probat. Sed omnino lucem inquit, recusandū, tanq̃ cōmobilem corporis, cum sit grauior in sinapi vel gestationis motu, commotio. Iners etiā atq; vana intentio dierum numerus atq; modus stadiorum circa gestatiōē adhibēdam. Addo etiā immodicum motum esse stadiorum triginta periclitanti. quod etiam considerans sinapi probauerit adhibendum, ratione caret. Vtrum ne tumorem senserit in membrana? sed hæc acrimonia necessario densatur: an verò sensuum torpētium mouendorum causa? sed iam dudū lucem ne commoueat recusauit. Postea inquit, radendū sequenti die, duabus ante accessionem horis, seruatis cataplasmatibus pane & aqua, & oleo ro-

faceo, & lini semine, cum posca: vel polenta cum foenugræco, & aqua mulsa vsus dissimilium cataplasmatum permiscens. Etenim mulsus atq; foenugræcum relaxant atq; mitigant tumentia: oleum verò rosaceum, atq; acetū, vel alica constringunt. Et propterea in augmento tumores supertendūt. Intemporaliter etiam vtitur cataplasmatibus, quū ante duas horas accessionis venturæ adhiberi iubet, & sit eo tempore requies adhibenda. Dehinc inquit si vehementer fuerit oppressus ægrotans, ut neq; dimissionis tempore eum valeamus excitare, si præcordia mollia senserimus atque vocem nō istā obtusam, fricationibus corpus calefaciemus. Tunc frigida caput fomentamus coaceruatim, atq; iugiter & quodā percussu ut altius à capite demissa veniant fomenta. Tunc ad balnea ægrotantem ducemus, ut densitatem frigoris relaxemus. Hoc igitur vexationum perdendæ salutis magnitudinem vehementer excedit: quod enim passio crescere facit (hoc est torporem sensuum) hoc etiam frigida fomētatio cogit augeri. quò fiet ut si fortè temporaliter quisquam ægrotantium raptu quodam erroris frigide excitetur, vehementius tamen accessionis tempore opprimatur, sicut & ipse eodem in libro nescius cōfitemetur. Dehinc affectās stationem sensuum emouere fomēto frigide, videndum est, utrū ne in accessione id fieri eligat, aut in dimissione. Sed si in augmēto, econtrarium aduersum est etiā naturale lauacrum. Sin verò dimissionis tempore, feriuntur ea quæ dimissionis ratione indulgentia quadam tenues vias agnouerant. Præterea post frigidam allutio:

nem, balneum sanos quoq; incōmodat implendo caput. Quid igitur prodest frigida ablutio, quæ stationem atque torporem viarum excludere putatur, si necessario magis densitas acquisita ægrotantem opprimere perspicitur? Ita corpuscula quorum statione viarum obstructionē factam existimat, facile utique transire vel resilire possunt, si capacitas exitū dederit, in quam venisse, vel ex qua exisse videntur. Huic autem rei perficiendæ frigida repugnat: densat enim atq; conducit vias: fatetur sanè neq; se hoc vti adiutorio cum sit melius, quanquam nominare quod sit metuat: etenim inimicum, & neq; ipsius dogmati conueniens esse probatur. Heraclides Tarentinus primo libro de internis passionib⁹ proponens lethargos fieri multitudine cruditatis, & crassitudine humoris, adhibet clysteres: quibus etiam admiscet aquam in qua etiam centauriū fuerit decoctum, vel absinthium. Dat etiam bibere castoreum, & aquam salsam, & epithymū, os ægrotantium distendens sensim, hæc infundit guttatim, quæ in os labuntur, decurrentia. Caput autem posca fouet, in qua fuerit laurus decocta, & ruta, raris quoq; capillis vngit castoreo, vel spondylīo & aceto, cum oleo veteri, & ex pollinibus adhibet cataplasma quod appellamus omen lysin ex posca & absinthio & nitro vel cantabro ex aceto. Dehinc sinapi cum aceto, & fico, & iisdem clysteribus post rasuram capitis vtitur. Dat etiam & radices masticandas ex sinapi, vel pipere apophlegmatissimum prouocat. Vtitur etiam balanīs, si clystere ventrem mouere non valuerit, & omne corpus aceto &

oleo perungi iubet, sternutamentis commouet & odoramentis castorei & spondylii ex aceto acri resolutis. Sed si ex humorū acrimonia fuerit ægritudo confecta, aquam dulcem potare ægrum iubet, ac deinde vinum. Post hæc, acetū cum melle, ob virium tutelam adhibendam probat. Tunc viscellum tenue dat anseris, vel perdicis aut gallinæ & per profectum oryzae succū, vel ptisanæ ex ordeo, tunc panē cū radicibus fluxis ac mollioribus, vel cappare, dehinc cū pisciculis. sic enim quasi acceptis his lethargicos iuandos existimat, cum omnimodo tumentia acrioribus virtutibus accensa grauentur. Hoc est clysteribus supradictis atque potionibus, & infusionibus & perunctionibus & odoramentis & fomentis, & apophlegmatismis & vini dationibus intemporalibus, & cibis acrioribus & indigestibilibus, & radicibus, & cappare, & viscello innutribili, arque corruptibili. In quos errores ceciderit nobilis videlicet empiricus, claret cum liquidarum materiarum causas attendit, & neque tempora neque quantitatis modum dare perspexit, sine quibus solas materias nominauit, non adiutoria constituit. Alia quoque multa varia opinione composuit quæ non imprincipaliter dicenda suscepit, sed expugnanda, quæ ab alijs posita videbantur adiecit. Quæ propter fastidium prolixitatis tacenda melius existimo: quippe cum ex his quæ narrabimus prætermisiorum conijci varietas possit.

CÆLII ACVT. MORB.

De apprehensione vel oppressis, quos Græci cataleptos appellant. Cap. X.



Vicina atq; similis est lethargiæ passio, quam Græci catalepsin appellant, nos apprehensionem vel oppressionem vocare poterimus, de qua nunc dicemus. Nomen igitur ab accidenti sumpsit, sed Hippocrates libro suo sententiârû, & Diocles libro prognostico hanc passionem aphoniam appellauit. Praxagoras secundo libro peregrinarû passionum cathoden appellauit. Item Antigenes Cleophātinus libro quem de febribus & tumoribus scripsit, anaudiam vocauit. Asclepiades libro quē de periodicis febribus scripsit, catalepsin appellauit, atq; plenum corpus scripturæ composuit, quo constat errasse Philippum libro quo de ipsa passione scripsit, appellās cathocham, hoc modo: passionē, inquit quam appellamus cathochā. Veteres etiā medici hanc passionem non tacuerunt, sed facilē, sicuti etiam nunc plurimi, lethargiam esse senserunt. Alij horum successores pauci quidē Asclepiadis sectatores, hanc passionem à lethargo discreuerunt, & nomine adiecto catalepsin vocauerunt. Equidem nihil ei nouitatis ascribentes, quod propriū passionis videretur, sed omnia cōmunia quæ etiam de lethargo dixerūt. Sed neq; alius quisquam hanc passionem cognouit vsq; ad Methodicorū tempora. nā ex nostris primus Magnus eius argumenta constituit, atque mox Agathinus, dehinc Archigenes, qui plurimum passionem à cæteris discernendo separauit. Sed neq; proprium nomen passioni omnes vnum

posuerunt. Praxagoras eam cathoden appellauit. Neq; si quisq; nomen passionis dedit prim^o, etiam eius signa recte agnouisse probatur. Neq; asclepiadis sectatores soli catalepsi vocauerunt, verum etiam & ipse Asclepiades alia dixit esse passionem, quam lethargiam, sed cum hoc solum præciperet, nouum non dedit nomen. Nunc ne supradicta omnia simplicia atque nuda posuisse videamur ipsas quoq; significatiões singulorum prosequemur. Hippocrates ait repente voce captos quos aphonos appellauit, fieri venarū causa, quum spiritum sumpserint. Multos denique talia prosequuntur, rubor vultus, atq; oculorum statio sine vlla palpebratiōe, manuum neglecta atq; distensa abiectio, dentium stridor & membrorum saltus, ac musculorū, quibus buccæ colligantur, conductio, quos appellant. Siagonitas, articulorum frigus, quum spiritus inuasit venas. Item Diocles ait, defectiuas febres tutas, atque innoxias esse frequentius, q̄ sunt continuæ, quanq̄ & in his periclitentur, qui in accessionibus apprehensi conticescunt, vel raptu quodam alterno per membra tentantur cum supra dictis signis: quod sæpe (inquit) est accidens pueris. Itē Praxagoras ait esse quasdam febres ex anno duodecimo vsque ad sextūdecimū vel septimūdecimū, quæ quadā priuata perniciē mortis habent effectum. Atq; id in seruis magis q̄ in liberis euenire, sed excessu dierum numero passiōes fiant, catochę vehementes, vt etiā voce capiātur ægrotantes. Horū aliquos etiam lethargos fieri. Deniq; inquit, de catocha passiōe quidā liberati, ac deinde sanitatis creduli plurimū quicq; sumē-

CÆ LII A C V T. M O R B.

tes,repente in mortē venerunt.Hos deniq; plurimus modo sequitur somnus, atq; febrīū instauratio,& cætera quæ corpus passione habitari demōstrent.Item Archigenes ait esse difficiles etiā periodicos typos,horum difficiliōres esse tertianos,in quib⁹ quotidianæ accessiones fiāt, sed alternā diei interpositione, suæ similitudini respōdeāt. Quando in accessione vehemens occurrerit oppressio,& appellauit rhigos . Difficilis inquit etiāsi quotidianis diebus in accessiones sibi similes fiant,& in accessione egrotātes supra dicta patiantur.Dehinc progrediēs paululū idem dixit periodicos typos non esse perniciosos,sicut supra dictū est, sed horum esse molestos, quib⁹ accessionis tempore pressuræ vehementes adueniunt,& quodā nubilo corpus demergitur,quod item rhigos vocauit. sed hoc,inquit,est accidens magis tertianis,aliquando etiam quotidianis,qui similibus respondeant accessionib⁹.Item Asclepiades ait quotidianū perseuerantem nō sine periculo esse , atq; multos ex eo in aliū morbū induci,hoc est,corporis defluxionē, aut hydropē venire,& quicquid potest per corporis debilitatem accedere.Apuđ Rhomā vero inquit frequētare aduertimus has febres cū corporis atq; mētis oppressione,in similitudine lethargiæ quæ secundo vel tertio in statu accessionis constitutæ statim recalesfacto corpore vel cessante vehemētia,in resumptionē atq; resurrectionē mediocrē reuocant ægrotātes. At si leui figmēto cessaauerint semel,apprehēso egro nullā resurrectionem dabūt, sed in sudores & respirationem celerē, in pulsum febricitatē occidūt . Item similia de his

scribit, & nō semel, sed frequēter, dicens certa ratione mētis apprehensionē typorū in accessionibus fieri, atq; hoc apud Rhomam frequētare, dāns etiā causas, quibus hæc singula fiāt. Item Chrylipp⁹ particulariter signa passiōis percurrit futuræ & præsentis, vel in pēius eētis. Discernit etiā ab lethargo & alia plurima, & varia digerit. Quibus ita se habētibus, erit indignum tanta dissensione conscriptæ passionis eorum cuiq; ascribere firmitatē. Quippe cū cæterarū etiā passionū omnibus cognitarū aliqui plurima accidētia atq; signa, aliqui pauca cōscripserint, nec quisq; vera significatiōe finierit. hæc sunt quæ ppter eos qui specialiter istā passionē perniciosam dixerūt ponēda credidim⁹. Quod etiāsi lateret in partib⁹ periculū methodicis afferebat, qui generalib⁹ cōgruas passionibus posuerūt curationes etiā quibus particulariter latentia curentur. Sciēdū igitur quia hæc passio ex iisdē causis antecedentib⁹ fiet, quib⁹ aliæ quoq; passiōes efficiūtur, indigestione, vinolētia, carnali cibo, & horum similibus rebus cuius hæc sunt quæ nostra mediocritas latinizāda existimauit, se vidisse plurimos memorat ex intēporali cibo vel plurimo persicorū, ista oppressos passione, sed non inquit necessariā precedentīū causarum differētiā, in curationibus præuidere. Siquidē præsentia sint à methodicis intuenta, sic etiā super dicit tēporis attēdere frequētiā, quòd autūnò tēpore hæc passio magis irruat corporibus, atq; in puerilib⁹ frequēter ætatib⁹. Itē sexus causa mulierib⁹, & humorosis, & vacuis corporib⁹, & edacib⁹ hominib⁹, vel post ægritudinē resumptiōis

CÆLII ACVT. MORB.

tempore inordinate atq; impatienter agētibus. Præterea omni febriculæ hæc passio irruere potest: siue cōtinuis siue dimissionib⁹ intercapedinitatis, hemitritaicis etiam febribus, vel quotidianis, & tertianis, & quartanis, quāq; rara atq; fræquens secundū febriū fiat qualitatem. Hinc etiā grauis vel leuis pro earum magnitudine fieri intelligatur, frequentius tamen quotidianis accessionibus, vel tertianis accessionibus ægrotantes ista passiōe afficiūtur, & propterea diuturnis accessionibus admoniti tertianis similitudinē seruant ad typum quotidianum, sed omniū earum febrium grauius, quoties cum articulorum frigido torpore fuerit qualitas: leuius, quoties tremore ægrotantes afficiūtur. Item magis ac magis leuius quoties sine his quæ supra diximus, solo feruore initium febres accipiunt. Sequentur autem eos qui in passionem venire meditātur alia communia cum lethargo, vt segnities & tardus corporis mot⁹, vel nulla querela ex his quæ ægrotantes afficiunt, hoc est tacita sui laboris relatio, & veluti somn⁹ vltra modum prolixus, vel grauis: item alloquentib⁹ nobis eius tarda responsio. propria autē sunt quæ in propriā passionem venturi patiūtur, vt est genarū rubor plurimus, sine febrium leuigatione, saliuarum fluor, pulsus erectio atq; plenitudo, ventris retentio, aut coaceruata atque fluxa effusio. Eos vero qui sint in passiōe iā constituti, sequitur schema iacēdi iugiter supinū, colli distentio, genarū rubor, febris, vocis amputatio, sensuū torpor atq; hebetudo, palpebrarū distātia, & infixa atq; immobilis intētio luminū tanq; quicq; intēto obtutu cupien-

tiū, aut boū ceruicis repētino motu cadentiū. Sequitur etiā lachrymatio tanq̃ sentientiū atq; dolentiū, saltus latenter commouens musculos, qui buccas colligant, quos si agonitas appellant. Mouens etiā labia & supercilia & digitos atq; manus, singultus creber ac resonans, pulsus cellior, humectus, plenus, vehemens retentio ventris, & neq; extenta recolligūt membra, neq; conducta distendunt. Ventris inflatio aliquib⁹ tanq̃ ex vēto magis ac magis circa stomachi sensionem, aliquibus tanq̃ ex humore, vel cibo cū sonitu intestinorum. Dentīū concubitus, hoc est cōfixio vehemens. Aliquādo etiā stridor, & cū statū sumperit accessio, horum recessus adeo, vt sit quædā interiecta distantia. Oris hīscens atq; dimissa hebetudo, cum plurimū saliuarum fluore per eius obliqua foras decurrit, nūc attestāte sonitu trāsuoratur. Discurrit etiā si quid fuerit liquoris infusum, aut inuito ægrotāte percipitur. Itē labia sæpissime cōducētes cōtrahētēsq; & tāq̃ i moestitudine cōstituti suspirāt. Atq; ita si ante oculos eorū quisq̃ digitos circū moueat palpebrāt ægrotantes, & suo obtutu manūū traiectionē sequuntur. Vel si quicq̃ profecerint etiā toto obtutu cōuerso attendūt, & in clamatī respicientes lachrymātur, nihil dicentes, sed volentiū respondere vultū simulātes, odoramētis ad motis iucundis delectātur, atq; iugi adducto spīramēto. Odo rib⁹ autē tetrīs delectationē non accōmodant, sed aduersa volūtate eorū fugiūt putorē. dulcia atq; amara sentiūt, si eorū linguæ fuerint ad mota. Itē perpunctī sentiunt, vel si eorū manū quis extēderit, hāc recolligūt, vel laceßiti horrescūt,

& eorū vultus in ruborē florefcit. Cū ſudore ſēpius plurimo atq; feruēti, & in dimiſſiōe ſynceritatī p̄pinquantes ruſum admonētur. At ſi ad peiora paſſio fuerit deuoluta, feruor plurimus corporis in ſupficie magis ſentitur ſpiratio, oculorū cōuerſio, menti quoq; fixa cōditio, manū cōtract⁹, & muſculorū qui buccas colligāt tanq̄ ridentiū, ſudor igneus, & quibuſdam in thorace atq; vultu emergētes diſcolores, vel ſtātes in rotunditate maculę in ſimilitudine ſcatebrarū corporis, quos Græci ionthos vocāt, & è magnitudine repētinus caſus, gutturis ſtridor, quē Græci rhogmō vocāt, torpor frigid⁹, & albid⁹ vult⁹, & in vltimo effatio, atq; vitæ periculū. alij vero in phreniticā, aut lethargicā paſſionē reciderūt, ſicuti & ipſæ paſſiones in ſemet per temporum motū venire cōſueuerūt. Hiſ igit qui in phreniticā paſſionē ex iſta deueniūt, pulſus ſenſim minuitur, atq; denſatur, & oculorū fixus obtutus mutatur, atq; mobilis efficitur, leuiter etiā tanq̄ in ſomno murmurātes nō recta ſecū loquuntur, & incerto motu, atq; tardo, ſuas trāſſerūt man⁹, vel digitos cōplicāt. Qui autē in lethargicā paſſionē deueniūt, inani afficiūtur pulſu, atq; tardo, & eorū palpebræ conducūtur, & in torpore ſenſum, vel hebetudine perſeuerant. Qui autē in declinationē paſſiōis deueniūt, plurima, vel parua accidēte humiditate releuātur, quibuſdā accedentibus ſignis. Nam pleriſq; plurimo p̄r inſteſtina exeunte vento, vel mucilēto humore, vt ſtercore, vētris ſubſedit inflatio: alij vero humore plurimo, atq; craſſo, p̄fecta dentiū diſtantia ex ore detracto loquuti ſūt, & alij ſapiētes qui.

dem sed cōcisis sermonib⁹, alij iugibus. Proprie igitur passionē supra dictā, hoc est, catalepticā, siue catochā, vt Gręci appellāt, designant febres acutę, vocis silentiū, sensuū hebetudo, pulsus magnus, ac vehemēs, & plenus, & humect⁹, & oculorū stans atq; fixus obtutus. Est autē passio celeris, atq; acuta, etiā si in chronias venerit febres. & est magna, atq; strīctura & raptu corporis, quē Gręci spasmon vocāt, fieri perspicitur, nisi p̄ immodicū fluxū diaphoreticus tanq̄ in cardiacis fuerit effectus. Huic igitur similis est lethargia, apoplexia, stomachica passio, in febribus vocis ingerēs silentiū. Itē animi defectio per nimia ieiunitatē & matricis p̄focatio, & lūbricis vocis depressio, de qua capite de lūbricis scribētes memorabim⁹. De alijs vero leuiter, atq; coactē nūc discretionem ponemus. Nanq; lethargicis maior quidē pulsus, sed tardus, atq; inanis inuenitur, & palpebrarū conclusio. Catalepticis autē pulsus maior, sed plenus, atq; celer, & vehemens inuenitur, palpebrarum attestante distantia. Item apoplecticis paruus, celerrim⁹, durus, ac sine febrib⁹ pulsus inuenitur. Siquidem hęc repente accidāt. item stomachicis qui nimietate etiam voce capiuntur, pulsus paruus, & imbecillis inuenitur cum stomachi solutione, vel tumore manifestius apparente, & frigido torpore, qui sequitur post oppressionem factam, & non antecedenti febricula cucurrit, sicut in catalepticis. Item stomachici intelliguntur ex eo quod iam frequenter fuerint admoniti passione, & propterea typorum tenuerunt tarditatem, quibus accessiones lōgo interuallo respondeant. Item a

CÆLII ACVT. MORB.

ieiunitate, vel abstinētiæ defectu, siue ex capitis causa quā Græci scotosin vocāt, demersi videntur. discernuntur hoc modo q̃ primū oculos habeant distentos, dentium concadente iunctiōe, attestāte pulsu paruo, atq; ibecillo: ita vt aliquādo interire videatur cū frigido torpore. Sed hæc & cito circūscribūt, & is qui patitur facile resurgit. Nam si perseuerauerint catalepticā passiōē designāt. Itē nō aliter facile resumere perspicitur, hi qui odore carbonū, vel vnguētorū sensuū oppressiōe vel torpore afficiūtur. Itē matricis præfocatiōe oppressæ discernūtur, primo q̃ ipsa matrix se sustollat, atq; supra vmbilicū, vel ventrem extans videatur. Antecedente querela earum partiū ante oppressiōis tempus. Aliquādo etiā longis atque solutis accessionibus admoneri egrotātes inueniūtur cū pulsu paruo, celeri, imbecillo. His etiā collū latius fiet cū palpebrarū cōclusionē, atq; frigido corporis torpore, ex duplici tertiana cōfectis. In vehemētiore accessiōe similiter alternis respōdēte dieb⁹ lethargica fuisse oppressi passiōe, & veluti cōplexu eatū fuisse, accessionib⁹ demōstrādo lethargicū simul atq; catalepticū esse cōfirmat ægrotantem nō aliter q̃ sūt ex typorū cōplexione in vna atq; eadē egritudine repēte. hæc sunt quæ intelligēda passiōe atq; à similib⁹ discernenda posuimus.

Quomodo curandi sunt hac passiōe laborantes.

Cap. XI.



Dehinc ob curationem adhibēdam, oportet egrotantē iacere sicut strūctura laborantes sæpe docuimus, adhibita abstinētia, pro viriū qualitate, atq; fomēto ex oleo dulci, &

calido capiti & medianis partibus. Sed prætactis membris, quæ frigido mortis torpore afficiuntur, calefactionibus etiã adhibitis cum obuolutione atq; modica strictione ex lanis effecta. Item ori, vel faucibus sensim infundendus humor, vel mulsum illis temporibus quibus alias passiones curantes docuimus. Clyster etiam simplex adhibendus, si ventris cessauerit officium, in declinatione vero, vel dimissione os ægrotantis sensim distendimus, atq; hircere tentabimus. Alijs item dimissionibus cataplasma medijs adhibemus partibus, & clunibus, ob abstinentiam vrinæ soluendam. Item ceruici, vel maioribus nervis quos tenôtas appellant, & musculis qui buccas colligant, quos siagôtas vocant, infectione parua olei per clysterẽ utimur, & cucurbitæ appositione nunc simplici, nunc scarificatione adiecta, ob singultum & tumorem ventris atq; stomachi. Tunc vaporationes spogiæ, atq; cerotaria releuatis partibus medijs caput tondemus, atq; apposita cucurbita, ex quibus nihil in catalepticis inuenitur. præterea scarificamus occipitium, & tempora, vel cogentibus causis alia quoq; capitis loca, si qua potuerint cucurbitæ appositionẽ accipere. Tunc fomẽto utimur olei atq; embasin toto adhibemus corpori, ac opus etiam leuioribus vtentes, quæ mitius nervorum faciant laxamẽtum. Tunc post punctiõẽ, cibum dabimus declinationis tempore varium, atq; bibilem, ut ouum sorbile, cerebrum, olus quod non sit virtutis acrioris, & magis nutritibile. Dehinc adhibemus lauacrum sine villo cibo, qui in se habeat vini qualitatem. Tunc proficiẽti egrotto pomorum quicquid damus, ut ficum recentem,

CÆLII ACVT. MOR.

vel pyrum ex melle . tunc mulsam vel aquam . atq; completo sanitatis officio & depulsis omnibus quæ passionis recursum fore sollicitant, dabitur vinum tenue, leue, sicut salutaribus præceptis docuimus.

Quomodo aliarum sectarum principes istam curauerunt passionem.

Caput. XII.



Vlti aliarum sectarum principes, quos inter etiam Chrysippus scribens de catalepticis in vltima parte libri etiam catocham nominauit, sed in his qui mediocriter tardasse, in eadē passione inueniuntur, acrioribus vtitur vnctionibus, ob stuporem articulorum, vel tremorem, hoc est cyprino admixto pipere, & nitro, & fomēto ex aqua salsa concoctis sulfure & bitumine. Dehinc perunget vnctione, quā appellauit tripticen, quā cōficiendā dixit ex calamo aromatico, ischoeno, cachry, pyrethro, irino, manna, singulorum partibus oleo admixtis, atq; contritis, sed hæc nos ob acrimoniam reprobamus. Siquidem sit passio celeris atq; acuta, etiam sicut iandudū tardantibus atq; inueteratis febribus irruerit, quippè cū chroniæ febres ista passioe necessario in superpositionem veniant, quam græcè epithesin vocāt, quæ similis fiet necessario acutis passionibus, & ob hoc mitigationē deposcat. Prohibemus etiam supra dictis rationibus vnctionem ex illo liquore articulis adhibendam, vel ex eo quicquam potandum, aut cibo admiscendum, item sternutamenta, vel rasuram capitis, aut articulorum sinapismum, aut supponenda podici acria collyria ob

prouocandum ventrem, quæ appellauit balanos. Item diagridium atque castoreum & omnia gra uabilia fomenta, ex quibus tumor magis auge tur, & soporifera pressura geminatur. His eti am compeccauit Themison libris quos periodicos dixit, adhuc quidem in iuuentute constitutus, nec dum Asclepiades in libris suis eos discreuerat. Ait enim si iam tardantibus atque insidentibus febribus apprehensiones, vel oppres siones aduenerint sensuum, atque in accessione vocis silentium fecerint, cæteris vt supra diximus similiter adhibitis ante accessionem tribus, vel quattuor horis seruatis, si venter non fuit, diagridij obolum, cum tribus vel quatuor obo lis castorei dabimus cum aqua, occipitium atq; tempora capitis inungentes thapsia quā nos seru laginem dicimus, aqua contrita, vt quendam sensum atque leuationem mediocrem per corporis faciat superficiem. Cibos etiam inquit dando solidiores, nisi præcordia fuerint in tumore constituta: quod si obstiterit, bibulos dabimus cibos. Nec dum quidem ait prouidens, quia etiam si in alijs partibus tumores fuerint corporis, sorbiles interea tibi conueniunt. Siquidem laxamentum passio deponat, quam necessario accendat, atque erigit thapsia magnificum tumorem. Est etiam castoreum acre inueteratæ qualitatis causa, sicut omnis caro reposita. Prohibemus propterea ob dentium faciendā distantiam immittendos violenter cuneos. etenim ex his cōmotæ partes atq; quassatæ asperāt tumētia. Quāobrem dentium cōcasus vehementior fiet, cū magis sit inutile: ac necessariū in tensione partibus cōstitutis, requiē

CÆLII ACVT. MORB.

adhibere, vt declinationis tempore, vel potius dimissionibus laxatis musculis, sine vlla vi digitis immissis dentium facilius distantiam faciamus. Nocent etiam succi frigidi, vt hederæ fomentatæ atq; capiti impositæ. Etenim tumores constringunt, & passionis asperāt motum. Et si qua his fuerint genere similia, sicuti in lethargicis cōtra scētarum principes scribentes docuimus, prohibemus. Est autem improprium atq; loco carēs nimium frigidis vti fomentis, in declinationibus vero calidis, atq; feruentibus iusta imitatione recentium vulnerum. In his enim priusquam tumor emerferit, frigida probantur, sed omnis sensuum pressura, vel apprehēsiō in ista passione tumoris esse perspicitur, vel hoc præcedentes super fieri. Hæc sunt quæ de catalepticis sua potentia Soranus ordinauit.

De pleuritica passione.

Cap. XIII.



Leuritis à parte corporis quæ magis patitur nomen sumpsit, latus enim ipsa passione vexatur, quod græci pleuron vocauerunt, sit autē ex varijs antecedentibus causis, vt ceteræ passiones: magis tamē pro-

funda perfrictione, aut vinolentia, aut vsu venereo, plurimo nimis potu, indigestione continua, aut percussu vehementi, aut pōderis magna subuectione, vel cursu vehementi: sed neq; secūdum has differentias differens erit adhibenda curatio. Vna est enim atq; eadem passio, ex qualibet veniens causa, quæ vna atq; eadem indigeat curatione. Hanc definiens primo de adiutorijs libro Aristoteles sic tradendam credidit. Pleuritis (in-

quit) est liquidæ materiæ coctio, siue densatio. Nec tamen differuit vtrum ne totius, quod falsissimum: siquidem phlebotomati ægrotantes liquidum sanguinem reddant, an vero particulæ, sed cum hoc tacuit, non promisit. Mitto etiam oculorum suffusionem nihil aliud esse, quàm liquoris coeuntis densitatem, nec tamen pleuritim. item Apollonius qui appellatus est Mys volumine vice simooctauo, quem de secta Herophili conscripsit: Pleuritis (inquit) est cõmuniter passio temporalis, atq; celeris, secundum laterum membranas quas hypezocotas vocant, atq; inter earum carnẽ: aliquando etiam in pulmonis partibus sepiissime sine tumore, vel ex solis causis effecta. Proprie autem tumorem secundum supradictas membranas vel carnem laterib⁹ interiectam: aliquando etiam pulmonis partem, sed in vtraq; definitione peccauit. Primo enim sunt proluxæ atque narrabiles. Secundo plurima alia prætermisit, nam necessario passioni febris non est. Corruptum autem atq; usurpatũ dicimus in pulmone passionẽ posse constitui, sicut ex consequentibus docebimus. Itẽ Asclepiades libro diffinitionum, Pleuritim dicit esse humoris fluorem, temporis parui atq; celerem interiorẽ lateris partium cum febre atq; tumore, sed erat melius tumore dicere atq; humoris fluorem. Etenim quoties ex complexa passione conficitur, tumorem perspicimus superare. Est igitur secundum Soranũ pleuritis dolor vehemens interiorum lateris partium cum febribus acutis, & tussicula, qua variæ qualitatis liquor excluditur: frequentat autem hæc passio in masculis quàm in foeminis, atq; in senibus

CÆLII ACVT. MORB.

magis q̄ iuuenibus. Tussiculosa enim atq; frigida senilis est ætas, quo intelligimus profecto hanc passionē pueros difficulter incurrere: frequentat etiā hyberno magis q̄ autūni tempore, quo hyemī vicinatur. Æstate vero difficulter occurrit. Est præterea passio acuta, atq; celeris & vehemens, & aliquando sola ex stricтура confecta. Aliquando admixta solutione ob plurimum tussiculę liquorem. Etenim ventris defluxio non implet in pleuriticis signorū concursus, sed magnitudinē passionis docet. Quapropter ex his solū dicim⁹ agnoscendā, quæ supra memorauimus. Alia vero concurrunt plurima, atq; differētia pro passionis magnitudine, ac temporū mutatione, quæ quia prætermittenda non sunt, prosequamur.

Quæ consequuntur Pleuriticos. Cap. XIII.



Prosequetur in passione constitutos acuta febricula, dolor cum tussicula lateris vehemens, atq; vsq; ad iugulum, & palam eiusdem partis perueniens, quibusdam etiam brachiū tangens, & pectus atq; illū, & est stimulosus, ac pulsosus, & igneus, iugis aut intercapedinatus, seruato ordine aut confuso, & infixus atq; perseverans iisdem locis aut mobilis, & recurrens atque mutabilis cum suspirio, & difficili spiratione, quā græci *Δύσπνοια* vocant, attestante tussicula, ali quibus arida, frequenter tamen cum liquidis excrementis & primo spumosis, dehinc sanguinolētis, ita fellofis, ac inde saniosis. sequit̄ etiā ægros supra id latus iacendi difficultas, atq; cum se supra contrarium latus verterint, dolor, vt adduci sentiant suo pondere euidentia tumentium pars

tium viscera, sequentur etiam vigilię atque siccitas, & asperitas linguę, peiorante passione augetur omnia supra dicta. Addit etiam, articulorum frigidus torpor, genarum rubor, oculorum sanguineus color, ventris fluor spumofus, ac felleus. Urinę quoque frequens, atque paulatim albida egestio, pulsus densior, celer, fortis, & veluti fluctuans, & suo percussu pressuram significans, spiratio etiam circumdolens, atque frequens, & obtusa, vultus & thoracis rosida humectatio, mētis alienatio, gutturis stridor, vel sonitus interius resonans aut sibilans in ea parte quę patitur. Accipientium etiam per vomitum recursio, & iacendi negata, atque displicens omnis positio, sputa facile siccantia, & magis salivosis ea quę fuerint contra naturā, vel in densitatem coacta. Etenim spumosa sanguinis in qualitatem transeunt, sanguinolenta in liuorem: Item fellea, eruginosa, atque prasina, vel nigra efficiunt, saniosa, fœculenta, vel fumosa & odore graua & inæqualia, mutato etiam sæpe ordine suę egestionis, itē post felleam, vel saniosam qualitatem in sanguineam transeunt, vel quamlibet coloris varietatem. Tumoris etiam vehementia luctante alia in soliditatem coguntur, alia in nigredinem veniunt, ob feruoris vituram. Aliqua ruptis vasculis funduntur, quapropter ea neque saniosa qualitas, post sanguinea perseverat, sed spumosa rursus fiet cum singulas per partes tumor quatiens liquida spiritu turbato spumofam sufficit qualitatem. In ultimo autem cogente periculo celerrima fiet spiratio, & præcordiorum suspensa adductio, pulsus inordinatus, aut deficiens, aut deserens

CÆLII ACVT. MORB.

in his quæ in peripneumonicam passionem, aut apostema transire noscuntur. At si ipsa fuerint leuigata, singula mitescunt, & vëtris egestio coagulatur, aut fellea carebit qualitate, & per tussiculâ exclusa saniosa minime in sanguinolëta redeunt. Discernendū etiā quæ sint sputa saniosa, & quæ sit sanies. Nam saniosa iam mitescentis tumoris, atq; declinantis solutione esse probantur. Sanies vero ex apostemate quod etiam vomicā dicere poterim⁹, vel certe ex vlcere probatur venire. Discernitur autē exercita inuëtione. hoc est colore, & substantia, & odore. frequēter enim terti odoris est sanies. Item saniosa admixtione aquæ facile soluuntur. Sanies autem difficile, dolorem vero peiorem, alij dexteri lateris probāt ob pulmonis vicinitatem; alij sinistri vicinātis cordis causa forsitan. Et quia frequētius sinistra dextris debiliora videntur. Item pleuritis, nunc eodē tempore febriculæ concurrît, nunc superuenit, nunc antecedit, cessante febricula perseverat.

Quomodo intelligimus pleuriticam passionem in peripneumonicam transiētem, aut in vomicam venientem. Cap. XV.



Intelligimus eos qui in augmento pleuriticæ constituti passionis proni atq; faciles, in peripneumonicam videntur, quum ceteris omnibus peiorantibus signis atq; in magnitudinem extentis solus dolor minuitur, atq; iacendi positio ex parte faciliior ac leuior supina egro fuerit visa, aucto genarum rubore. Conductu etiam superciliorum ē medio vehemēter tanq; in mor-

stitudine constitutus articulorum attestante feruore. Eos etiam qui in vomicam transeunt intelligimus ex eo, quod dolor infixus eodem permanens at loco, accedente tussicula arida, atque tremore typico, & inordinato, spiratione difficili, quam graece dyspnoean vocant, cum dolore leuiore & pulsu denso.

Quis locus in pleuriticis patitur.

Caput XVI.



Væsitum etiã est à veteribus quis in pleuriticis locus patiatur, & quidam pulmonem pati dixerunt, vt Euriphon, Euenor, Praxagoras, Herophilus, Philotimus. Itẽ quidam hypëzocota membranam quæ latera, & interiora cingit, vt Diocles, Erasistratus, Asclepiades, & eorum plurimi sectatores. Horum primi aiunt non esse in lateribus tumorem, quum neque extantia vlla earum partium inspectione sentiatur, neque rubor, nec motu, nec tactu, dolor acutus vel fortis tanquam manifestis tumoribus: accedit etiam quod facile supra id latus quod patitur, iacere possint ægrotantes, supra aliud verò quod passione liberum videtur, si se iactauerint, difficultas spirationis accedat, siquidem nunc sustentatę pulmonis partes iaceant: nunc veniti pēdere sentiantur. Dehinc etiam tussicula signum est ex accedentibus consequēs fibrarum pulmonis esudati corporis liquoris, siue canna guttutis, singula etiam & tussita de pulmone venire manifestum est, qui neque venis, neque arterijs, neque fibris contiguus, vel admixtus esse lateri videatur, vt per ipsum latera accepta excludi possit.

CÆLII ACVT. MORB.

se credamus. Vnde igitur dolores? nunquid ne pulmonis sensibiles partes in passione constitutæ causa sunt? an vero eius tumore latera viciniantia comprimuntur, & propterea dextrarum fibrarum tumor dextrî lateris dolorem facit: sinistrarum sinistri? Sed in peripneumonicis totus tumet pulmo, nec ullus tamen sequitur dolor. Sed huic quidem sententiæ contrarij aiunt propterea neque ruborem, neque extantiam, vel dolorem ægrotantes consequi, siquidem in alto tumor esse videatur. quod autem supra patiens latus quosdam iacere prohibet, alios vero contra, mitescendo releuat, illa causa est, quod incumbendo obiectu straminum pressa materia refugiat, atq; ex partibus quæ patientur, ad sanas partes rediens, dolorem non faciat. At vero partibus non patientibus expressa, atq; fugata se patientibus impartiens, & has distendens, dolorem facit. Tussicula vero fiet cum patientibus hypezocoti membranæ vicinis, atque contiguis partibus. Et tussita itidem sputa per pulmonem feruntur, siquidem in ipsum veniant ex vicinis accepta per vias mente sensas, quas logotheooretos appellat, sicuti & in vomitis contingit, quam frequenter ad externas partes verticem faciunt, vel fracto latere sanguinolenta excludantur sputa. Nam profecto insensibilis omnis est pulmo, debuit igitur nullus fieri dolor. Sed si ex oppressione hypezocotis membranæ ex pulmone vicino tumente dolor fiet, debuit magis ægrotans tunc dolere, quoties iacuerit in latus. siquidē tunc magis incumbens opprimit pulmo, dehinc etiam peripneumonicos dolere oportuit. Si enim

ex parte tumens pulmo dolorem facit, magis
 omnis in tumore constitutus facere debuit. Pa-
 titur itaque hypezococ membrana, & propterea
 dolorem vehementem facit. Siquidem sit ner-
 uosa atque lateribus infixa. Hinc denique quo-
 ties tumore densatur, ossibus vicinantibus ab-
 stenta ire latius prohibetur, & eorum conuersio-
 ne naturali quatitur motu, atque acuti doloris
 accipit causas. Item spirationum thoracis addu-
 cti spiritus vicinitate pulsata insistentabiles do-
 lores facit. Manifesta nanque coniectura est,
 quod ipsa patiatur. Siquidem tumoris augmen-
 to collectionem in pleuritidis faciat, & expi-
 rantibus sæpe ægotis nigra inueniatur. Hos de-
 nique venenatos quidam vocauerunt: igitur pleu-
 riticam videntes passionem, non simplicem la-
 teris dolorem, verum etiam febre acuta atte-
 stante totum corpus pati videamus. Etenim fe-
 bres totius corporis sunt, plus tamen pati hy-
 pezocota membranam recte dicimus, siquidem
 sint in ipsa dolores constituti.

Quæ sunt similia pleuriticæ passioni. Et
 quomodo internoscuntur.

Caput X V I I.

Similia pleuriticæ passioni dicuntur,
 dolor lateris, collectio in eius me-
 dio constituta. Item vomica, quam
 græci empyema vocant. Suspirium
 siue spiratio difficilis, quã iidem dys-
 pneam vocant. Item cum ad nares catarrhus,
 quem vocant coryzan, & anhelatio. Siquidem
 supradictis tussicula, atque spiratio difficilis ad-
 iuncta esse videatur, & febricula, & dolores ac-
 h.ij.

CÆLII ACVT. MORB.

cedentes pleuriticam passionem fingant. Sed discerni atq; internosci suis proprietatib⁹ possunt. Nam dolor lateris etiam sine febre plerūque est, & longo tempore perseverat : vel quoties celer est, sine varietate sputorum, vel excrementorum esse perspicitur. in pleuriticis vero dolor acutus, cum febribus acutis, & sputis supradictis inuenitur. Itē ab empyicis hoc est vomicosis, siue collectione laborantibus discernitur pleuritis, quod febres noxiæ atque acutæ & inordinate in pleuriticis inueniantur. Vomicosis vero vel collectione laborantibus antecedente corporis horrore frigido, atque dolore pungenti eodem tempore hoc est quo in vomicam transeunt ægrotantes sputa sequuntur, quæ antea nulla fuerant, reiecto prius pure coaceruato in latere collectionis causa. Laterum quoque veluti conuersionem sentiunt. Aliquando etiam sub ipsis extans, vel prominens collectio sentitur. In pleuriticis vero febricula ex initio vehemens. Atque sputa contra naturam, & varia reperiuntur. Item ab inspiratione difficili, & ortopnoea & catarrho quē supra diximus ad nares fieri, & anhelatione, celeritate discernitur, & febris

atque dolore, siquidem illa tarda sint, & sine febribus, aliquando etiam sine dolore.



Quomodo curandi sunt pleuritici.

Caput. XVIII.



Acere pleuriticos conuenit molli-
bus stramentis, loco lucido, atque
calido, & mediocriter amplo, sche-
mate quo se melius ac facilius ha-
beri peruiderint, adhibita requie,
& cibi abstinencia vsque tertium
diem accessionis tempore, vigilantia cum articu-
lorum tenaci, blandaque defricatione manuum
calidarum. Vaporanda etiam quæ sunt in dolo-
re constituta calidis pannis, & cum accessio sta-
tum sumpserit, lanis limpidis, ex oleo dulci cali-
do, expressis contegenda. Adhibenda fomenta-
tio lenis capiti, atq; inguinibus & sub vmbilico
locis ex eodẽ oleo similiter calido & magis quã-
do fuerint indulgentia corporis releuati ægrotan-
tes. Sin minus, addenda etiam cataplasmata ex
polline atq; lini semine, & foenugræci cum aqua,
& oleo cocta. Tũc oris collutione, & potus aque
calidæ moderate quidem ne plurima liquoris hu-
mectatio sputorũ prouocet fluorẽ. Tunc somno
dimittendus ægrotans. At si vëter influxerit, po-
terit somnus ante dimissionẽ pmittente hoc est
declinante accessione prohibitis accersiri, scilicet
laxatiuis cataplasmatibus. Sed si dolor vehemẽs
fuerit, phlebotomiã cõuenit adhibere, si nullus vë-
tris fuerit fluor intra tertium diẽ. Sin vero fuerit
adiuncta ventris solutio, in ipsa diatritho erit phle-
botomia adhibẽda, vt prædiscere possimus, vtrũ
sit perseuerans, atq; superior strictura magisq; so-
lutio, sæpe enim concurrẽs ventris solutioni san-
guinis detractio, ægrotanti nouissimam intulit

defectionem, quapropter perspicendum vtrum
 vsque ad dimissionem accessionis fluor ventris
 perseveret, vel eius meatio mordicationem quan-
 dam faciat podici, vel intestinis, suspecta etenim
 habenda est istiusmodi defluxio, atque ita adhi-
 benda phlebotomia, sed ex alio brachio, quod
 fuerit dolenti lateri contrarium, certæ rationis cau-
 sa quam sæpe memorauimus. Tunc post medio-
 crē sanguinis missionē quæ magis cōijcienda est
 ex cōiunctione q̄q̄ leuissimæ solutiōis, quiescere
 permittimus ægrotātem, atq; resumptum laxa-
 tiua perunctione curari, oris etiam adhibita fo-
 mentatione, digesto scilicet adiutorij turbore da-
 bimus sorbilem cibum ex oleo dulci confectum
 siue melle, ne liquidorū prouocetur sputa impor-
 tunitate temporis, hoc est initio, siue augmento
 passionis, dabimus etiā pultem calidā atq; madi-
 dam sine sale, vel panē ex aqua calida: sed si ven-
 ter influxerit, pultē dabimus crassiore, sed cali-
 dam, siquidem tumentes prius partes incurrat,
 tunc post cibum somno dimittimus ægrotantes
 vsq; ad solitum accessionis tempus, quæ cū fue-
 rit effecta, erunt adhibenda quæ supra memora-
 uimus congrua. Adhibēdus etiā cucurbitæ leuif-
 simus raptus. Sed cū statū cæperit accessio, adie-
 cta etiā scarificatione: cū ad dimissionē declinā-
 do peruenerit, tunc spongiarū vaporatio atque
 cataplasmata laxatiua frequenti mutatione no-
 uata, sed si ventris fuerit fluor, erit quidē his vrē-
 dum ob tumorem, siquidē immutabilis dolor au-
 geat liquidorum defluxionem, vigiliarum atque
 corruptæ digestionis causa iniciandi sunt, igitur
 ægrotantes plantaginis succo reficiuntur. Et ali-

quando simplici, aliquando admixta acacia, aut
 ptisanæ succo, quo sit præcoctus mali puni-
 ci cortex, vel myrti, aut agrestis celsæ coma,
 quam rubum vocant, aut rosa, vel galla, & his si-
 milia. Etenim alia queq; nimium constrictiue vir-
 tutis, vel multorum admixtione cōposita, in mo-
 dica densatione maiores membranarū fieri pro-
 uocant necessario tumores, quos passionis nequi-
 tia & tardare faciles, & adiutorijs medicinalib⁹
 cedere difficiles facit, adiuncta scilicet solutione.
 Quare cum prolixiores fieri viderimus dimissio-
 nes, clystere vtemur, solutione cessante. Cataplas-
 matibus autē & cucurbitæ scarificatione, cū do-
 loris fuerit dimissio. At si solut⁹ fuerit aut leuiga-
 tus dolor, vt ordinem accessionum seruans, ma-
 gnitudine tamen minutus esse videatur, urgente
 etiam solutione, iniectione vtemur supradicta
 prohibita scilicet vaporatione atque cataplasma-
 tibus submotis, & scarificatione supra dicta, ap-
 ponentes palmulas quas patetos vocant contri-
 tas, atque pannis calidis, potum dabimus calidū
 quidem, sed omnino paucissimum, vt neq; liquo-
 re plurimo sputorum, vel ventris augeatur deflu-
 xio, & tepore quodam tumentia mitigentur.
 Omne etenim frigus tussiculam cōmouet, De-
 inde denique pulticula, sed constrictior, vel panis
 ex aqua calida diligenti infusione atque innoua-
 tione calidæ elutus, & expressus, vt suæ den-
 sitatis positu elentescat. At si iugi vexatione tuf-
 siculæ, atque conatu frequenti eruptio venulæ
 sanguinem per os emitti coegerit, dabimus plan-
 taginem dimissionis tempore, oleris vice mādē-
 dam. Etenim in accessione omne quod datum

h.iiij.

CÆLII ACVT. MORB.

fuerit, corrūpi atq; acescere necesse est, olera præcipue, dabimus etiam decoctorum aquam cydoniorum. At si in ipsa accessione id facere coacti sumus insistente periculo dabimus poscam. Tūc in dimissione cibum, vt liquori soliditas accedat. Alicam ex aqua calida, in qua fuerint præcoctæ palmulæ Thebaicæ, vel mala cydonia, vt eorum frigore sanguinis fluor teneatur, feruore vero tussicula leniatur. Erit præterea si vires ægrotantis permiserint, alternis diebus dandus cibus donec passio declinet. At si imbecillitas coegerit etiam ante declinationis tempus erit quotidie nutriendus ægrotans. In statu vero mitescens atque segnescentibus sputis, & nullis irruentibus nouis saniosæ etiam qualitatis effectis sine ventris fluore, conuenit post cataplasmata atque vaporationem ante cibum dare bibendum mulsum diebus duobus, vel tribus. Etenim tussiculam mitigat, & spirationem facilem facit, liquidorum tenacitatem laxat, & eas partes ex quibus sputa feruntur, depurgat. cibum dabimus sorbilem ex melle, atque halicam, vel siliginis panem & amyllum, aut ptisanam, aut panem ex mulso, aut ouum hapalum. declinante passione, si aliqua fuerit sputorum difficultas, ob debilitatem virium, vel liquidorum crassitudinem, erit foenugræci succus admiscendus melli hoc genere confectus. Duobus diebus erit foenugræci semen infundendum, sed frequenti mutatione aqua innouanda, præfusa scilicet anteriore. Tunc donec color virescat aqua coquenda, & eliquata admixto melle, ægro supra dicta moderatione bibēda.

Potest etiam ipsum fœnugræci semē tritum cū melle lambere, vel lini semen assatum, melli admixtum, vel vitellum oui assati nucleis recentibus cōtritum, atq; decocto melli admixtum, vel simul omnia, admixtis etiam amaris amygdalis. Tunc conuenit vario iam cibo ægrotantem reficere pultib⁹, ouis hapalis, vel cerebro porcino, aut hœdino, aut agnino, coctis cum sale modico, vel pede porcino ī ptisana decocto, aut molli gallinaceo pullo, vel colūbinaceo. Tūc post tres vel quatuor dies solutis febrib⁹ adhibendū, laua crū sed ā vino tēperādū. illis quoq; partib⁹, quæ dolore tangūtur cerotaria ponēda ex oleo dulci, vel cyprino confecta admixto fœnugræci polliane, vel meliloto tuso atq; creto admixtis etiam adipibus. Utendū quoq; medicamine quod diatessaron vocant, cera, resina terebinthina, iri illyrica, pice, æquis ponderibus. Dehinc post vnum vel duos adhibendum lauacrum, & dandum vinum, apponendum malagma, quod diachylon vocant, vel diamna. Hæc ratio secundum Soranum curationis. antiquorum vero Erasistratus & Herophilus de pleuriticis nihil dixerunt.

Ad Hippocratem. Cap. XIX.



Hippocrates volumine, quo de ptisana scripsit, ad pleuriticos curandos hæc ait. Lateris. dolor siue ex initio effectus, siue supernatus principio vaporis erit curatione tentandus, in qua meliorem probamus, ex aqua calida in ventriculo, vel vesica constitutū, hunc ad modum, vel in æneo vasculo siue testeo, supposito

CÆLII ACVT. MOR.

quolibet stramine molli, ne quassatio fiat locorum, scilicet qui in dolore sunt. Probat etiā spongiā mollem, magnā, ex feruēti aqua expressā, atque inuolutā tunc apponendam, circūtectus, inquit, enim atque inclusus vapor plurimo tempore perseverat. Admouenda etiā tāquam odoramentum ori, vel naribus ægrotantibus ut spiramento adducta, suo ingressu laxamentum partibus administret. Utendū inquit etiā bono aceto, miti, macerato, & calefacto, & celeriter facello incluso: tunc appposito siue cantabro eodem genere feruefacto, vel aridæ atq; siccæ vaporationes adhibendæ: ut sunt ex sale, siue milio frixo in facellis laneis aptissime appositæ, etenim lene atq; conducibile est milium, soluentq; naturali quadam mollitudine illos dolores, qui iugulum in ipsis passionibus pulsant. Nō aliter etiā illos qui has partes pulsauerint soluit. At si dolor vaporationib⁹ minime fuerit mitigatus, vel abscessus, nō oportet plurimo tēpore in hac perseverare curatione. Etenim pulmonem vaporatio siccatur, atq; purulentum fieri cogit, sed si doloris significatio ad iugulum vel ad brachium tetenderit cum grauedine, ut etiā pectus vel mamillam tangere videatur: oportet in brachio venam diuidi, sed in eo, ex quo multa fieri detractio possit, donec plurimum rubrior sanguis excludatur, vel cum rubro limpidio liuidus. Vtraq; inquit enim eueniunt. Sed si sub pectore fuerit dolor: & ad iugulum non tetenderit, emolliendus est venter, aut helleboro nigro: aut pepilio nigro, admixto dauco, vel seseli, aut cumino, siue aniso. Vel aliud quodcunque trans

quillum admiscendum putat id est portulacā⁹ vel peplij succum præstare, quæ enim admisce⁹ mus sibi similitudinem. Hæc sunt quæ supra diximus. Deducit autem melius ventrem helleborū nigrum, quàm deducit peplion. peplios autem helleboro nigro ventositatem melius tollit, per podicem prouocatam. Hæc denique vtraque dolorem soluunt. mitigant etiam alia plurima. Hæc sunt, inquit, deducuntia siue detrahentia per effusionem, summa, quæ ipse sciui atque posui, quæ etiam in sorbilibus dantur, deductoria quæ non satis sunt insuauia, aut amaritudinis causa, aut alia qualibet, vt copiæ, vel coloris. Ptisanam igitur quādo medicamen biberit statim superbi bere nihil minus à congrua est ratione, vel quātum accipere consueuerit, dehinc paulatim inter ventris deductionem nouerit sorbenda, sed quando humorum declinauerit exitus, tunc modicum sorbeat ægrotās, vel quantum consueuit. dehinc detractio perseverare debet, donec dolor cesset: vel nihil cōtrariū occurrat. Hæc mihi (inquit) ratio est, & in succo vsus ptisanæ. etenim dixit melius esse statim sorbendi initium sumere, & in omnibus magis ventris antecedentibus deductionibus sumendo. ergo est initium sorbendi tertia, vel quarta, vel quinta, vel sexta, vel septima die, nisi intra id tempus fuerit ægritudo præiudicata. Hæc sunt quæ in primis partibus libri ordinauit. Alias quoque passiones curans, in vltima scripturæ parte rursum peripneumoniam atq; pleuritim curans, hæc ait: In peripneumónico, & pleuritico oportet inspicere vtrum ne acuta febricula, atq; dolores alterius,

CÆLII ACVT. MORB.

vel vtriusq; sint lateris. Et vtrum ascendēte spi-
ritu dolor admoneat, & tussicula vel sputa fue-
rint abundātia, flaua, vel liuida ac tenuia, vel spu-
mosa, vel florida, aut alia qualibet qualitate à su-
pra dictis differentia, sic agi oportet, vt si dolor
pungens, penetrans ad iugulum, vel cinctum vel
brachia tetenderit, venam incidamus in quacūq;
parte facilius fuerit visa, detractiōis autē mo-
dus conueniens secundum corporis habitudinē
atq; temporis, ætatis, vel regionis cōsiderationē
accipitur, plurimā enim detractiōem ostendit
celer atq; acutus dolor, quæ vsq; ad animi defec-
tione[m] erit facienda. Tunc clyster adhibendus
si inferius thorace fuerit dolor, & plurimū ægro-
tans distenderit ventrē: sed medio tempore pur-
gationis hoc est quo vētris officium cessat, nihil
(inquit) accipiendum, sed post perfectam effu-
sionem mulsum ex aceto exhiberi iubet, quod
oxymeli vocant. Item quartanum typum medi-
camine curans, tribus alijs diebus adhibendum
clysterem probat, & si passio fuerit releuata, tūc
inquit purgatione vtendum. Precauendū etiam
monet, donec dies septem intacti febribus trās-
igant ægrotantes. Tūc (inquit) tutò succum da-
bimus tenerum, atq; paruum. At si facilius age-
re coeperit sputa, attestante spiratione meliore,
& sine vilo dolore, atq; vt supra dictū est cessan-
te febricula, paulatim crassiore, ac plurimo &
bis in die vtendum præcipit succo: sin vero faci-
le hæc fuerint releuata, leni potu, atque sorbilli
vtemur cibo, hoc est succo paruo & semel in die
tempore scilicet quo leuius æger habuerit. Atq;
id intelligi vrinæ inquit inspectione. Tunc dan-

dum forbile quidem, nec prius tamē quam vrina, atq; sputa visa fuerint mitiora. Sed si medicatus plurima excluserit, necessario paruum atque tenuem dabim⁹ cibum. Nō enim potest inanitate, somno, vel plena affici digestione, neque passionis atq; naturæ conflictus sustinere, quos Græci Crises appellant. Sed cum corporis defluxio tenuem fecerit ægrotantem, retentione cessante (qua naturali vigore corporis nutrimenta tardantur) succorum nihil valebit retinere. Intellegimus autem mitiora sputa, quando sunt similia. Item vrina cum fuerit rubrior vini similitudine, nihil etiam (inquit) prohibet doloribus late ris adhibere tepores, atq; cerotaria, & vnctionē crurum & clunium pingui atq; calido oleo frequentare. Præcordia verò semine lini cataplasmare vsq; ad papillas. His Soran⁹ respōdēs ait: In calefactionibus acres esse sales, ac necessario tumorem prouocare, febrem accendere. Poscam etiam constringere, & stricturam passionis augere. Item miliū frixum graueolens & nidorosum atq; capiti graue, maxime acute febricitantiū esse perspicimus. spōgijs etiam erat melius quēquam in dimissione patientes partes vaporare, atq; oleo calido pfundere. Est præterea īpropriū, ac sine ratione, tunc vti phlebotomo, quoties ad superiora dolor tetēderit: prohibere autem quoties ad inferiora descenderit. Oportet ergo sub hoc argumento neq; difficultate tumorum impeditos phlebotomare: neq; etiam podagricos. Siquidem interiora tumere videātur, sed necessario quoties dolor ad superiora tetēderit, phlebotomiā adhibendā videmus. Siquidem sepe peior

CÆLII ACVT. MORB.

rante ventris fluore, hoc adiutorij genus prohibeatur. Neq; etiam (vt ait) oportet interiorē venam diuidi. Siquidem & exteriori & media diuisa, corpora releuentur. quippe quum e contrario interiorē prohibeant propter magnitudinem, ne tumor augeatur. Item sanguinis mutatio iners est detractiōis moderationi, sicuti de adiutorijs scribentes demonstrabimus. sese deniq; idem Hippocrates impugnat in consequētib; dicens vsq; ad animi defectum faciendam detractiōem. Quod magis vehementer est nocens, siquidem sit periculosa defectio, & neq; sit tēporaliter defectiōis causa, sensu carens egrotans, dolore releuatus, videbitur (quū resumptus fuerit) rursum dolere. Quum magis atq; magis eiusdem magnitudinis passiōis debilia corpora vehementius afficiant. Item purgatiua medicamina (quæ Græci καθαρκτικά vocant) actiōis causā stomachum tumentem atq; hypozocota membranā acuiunt, in tumorem & in periculum ventris effusionem prouocantia magnificam passiōis ingerunt vehementiam. Nutrire etiam cibo post medicamen nō oportebat. pugnat enim purgationi faciundæ illatum cibi nutrimentum. Quippe quum medicamine corruptum, officij sui careat viribus. mitto etiam quod ex initio acescere facile ptisanæ succ⁹ perspiciatur. Confectus quippe ex ordeī succo qui sit digestionē difficilis. Dehinc ægrotantis corpus non valeat tantum sustinere nutrimentum, quantum sanitatis tempore solitum videbatur. Item mulsum ex aceto (quod oxymeli appellauit) sine discretione accipimus. Est etiam immo-

dica vsque ad septimum diem cibi abstinencia, quam custodiendam ordinauit. Quippe cū nūlus uehementiam passionis sustinere valeat, nisi nutrimento quanuis paruo toleratus: & neque in declinatione passionis aliquid humanius cibo largiatur, sed in ijsdem sorbilibus perseverādum existimat succis. At cum fuerint sputa segniora, tunc (existimat) erit primo æger nutriendus, quomodo necessario hæc declinante passione occurrunt intolerato. In cæteris relinquendum temporibus egrotantem apertissime indicauit, quum semper plurimum vtilitatis adiutorium cibi, quàm cætera possunt adiutoria, largiantur. Omne etiam corpus erit vnctione coequandum, & non eius particula, quippe cum totum cibo nutriatur, ipsa quoque vnctio non exerta anxietatem ingerit ægrotantiæ, qua latentem difficultatem, atq; accessione veniente corpus prouocat incendium.

Ad Dioclem.

Cap. XX.



Diocles etiam similiter phlebōtēmat ægrotantes, eadem discretione adhibita. Purgat etiam catharticis medicamētis. Quapropter eadem dignus accusatione iudicatur. Cibus vero iuuenibus vndecima die dandū statuit, sed æstatis tempore elixum magis & frigidum. Hyemis vero assum atq; feruentem. Est enim summæ peritiæ in ordinandis qualitatib⁹ non passionum genera sed tempora hyemis vel æstatis attēdere, scilicet vt æstate tumore laborantes, frigido cibo nutriti altiora percutiant.

CÆLII ACVT. MORB.

Ad Praxagoram.

Cap. XXI.



Raxagoras signa docens futuræ pleuritidis præcauendū iubet, dādo bibēdum piper cum mulso ex aceto, vel abrotanum, aut absinthium. phlebotomat etiam nō vltra quintum diem, sed eos qui nō perfrictionē incurrerint neq; frigido tempore, & neq; senes neq; debiles corpore ante egritudinem fuisse videātur, omnia inquit corpore curāda, & fame magis vtendum, dandū bibere mulsum ex aceto, aliquādo etiam hyssopo admixto. item succum ptisanæ sorbilem, si celerius, quarta die: si tardius, sexta: atq; ex illo quotidie: item celerius senibus, atq; à sanitate debilibus, dehinc vsq; ad septimum diem ventrem emolliendum iubet, & vnctionib⁹ vtendum pauide persuadet, atq; respirationē inquit intuendam vtrum sit calida & odoris tetri. Quibus autē redūdantia est humorum in venis, exceptis senibus, & à sanitate debilib⁹, helleboro nigro purgādos existimat. Item deponendos secunda vel tertia die ægrotañtes in aquam calidam iubet, vel vtribus eos calefacere, fouendo crura donec dolor excludatur. Hic verò etiam non futuram pleuritim ex his quæ ordinat, efficit. Omnia enim constrictiua, atq; acria esse videntur, vt mulsum ex aceto, & piper & absinthium, quæ necessario tumores accendunt. Eo maxime tempore quo etiam aqua sumpta ī qualitatē deuenit fellis, ob nīmiū in alto feruorē, dehinc phlebotomari oportet etiā eos, qui ex frigore incurrisse videntur, & eos qui senilibus annis videntur affecti. Non enim ne

cessario debiles esse probantur. Quapropter etiā illis qui in sanitate corporis debilitate videbātur affecti. Exigit enī magnitudo passiōis adiutoriū. Purgatiua vero medicamina quę cathartica appellantur, præsumpūt corpus, atq; sollicitā eidem passiōi solutionē prouocant. Item fames tantum noxia q̄tum resectio cōmoda. Nūquid igitur sexta die cibum iudicamus dandum? Longa est enim ieiunitas & neq; semper quarta die, sæpe enim etiam tertia die caput implet. fit autem hoc ex aromatibus. de hinc calidæ aquæ fōmētatio importuna est, & frigescere facit ægrotantes.

Ad Asclepiadem. Cap. XXII.



Asclepiades secundo volumine celerum, vel acutarum passionū, pleuriticos phlebotomat, prædicens primo ab his, quæ locis consistūt vel cōmorātur, vtrum regio adiutoriū phlebotomiæ permittat adhiberi. se enim vidisse testatur apud Athenas atq; vrbem Romā phlebotomia vexatos, vel pei⁹ acceptos esse pleuriticos. In Pario verò atq; Hellespōto resumptos ac releuatos. Prohibet propterea sitim atq; clysterem vel ante cibum bibere, & si (inquit) oportuerit deducendī ventris causa, adhibendū semel vel secundo clysterem. Potum dat magis ac plurimum mulsū, aliquādo etiam & rutā & hyssopum cum melle. Nocere inquit radicem herbæ, quam Græci phlomon vocant, quapropter omnino dandam negat, vel certè semel dādā vbi dolor coegerit. Cibū inquit dandum præcauta secunda die, siquidē alternis admoneātur dieb⁹: & quarta, siquidem grauior sit, quinta: tertia (in-

CÆLII ACVT. MORB.

quit) die dabimus succū, & vt sæpe sufficiens semel probauimus dandum. At si plus defecerint, nutriendos etiam post accessionem quintæ diei permittimus, declinante passiōe vinum damus, & varium cibum. Huic Soranus occurrens ait, semper phlebotomādos pleuríticos, stricture cogente, & apud Romam deniq; nos (inquit) vtemur phlebotomo, nulla regionū discretione confusi. Etenim quærēdum vtrum Asclepiades proprietate regionis noceri suspicatur eos qui fuerint in eodem phlebotomati pleuritici: An vero proprietate passionis, ex quibus si primum putat, hoc est, regionum proprietate, vexari omnes oportuit, nō solum pleuríticos, verum etiam synanchicos, & qui fuerint phlebotomati, curati, & epilepticos etiam, quos phlebotomandos imperat aptissime. At si secundum, hoc est proprietate passiōis vexari putat, nō apud Rhomā solū phlebotomatos pleuríticos, sed in omni regione noceri debuit indicare. Clysterem vero recte prohibet propter acrimoniam, sed non recte semel vel secundo adhiberi permittit. Multo enim melius est omnino innoxium quicq; quā leuiter nocens. Hinc etiam phlomi herbæ radicem tanq̃ natura noxiam reprobans recte semel adhiberi, vbi dolor coegerit. Dehinc omni ex parte ratione caret, prohibere clysteres tanq̃ augētes incendia, & rutā, vel hyssopū adhiberi, quæ sunt vehementius ardentia, ob suæ qualitatis acrimoniam. Item mala atq; caduca intentione confirmat circa quartum diem cibum dandum generaliter, ac necessario quintum diem seruandum. His enim qui iugibus afficiuntur febribus, quos

ties initium ex die sumperint, quarta die necessario dandus est cibus. Nō aliter qui maiore hæmitriteo egrotāt, & ex nocte sumperint initiū. Ipse quoque Asclepiades in phreniticā passionem venturos grauitèr indicat affici quarta die. Neque tutò ante dimissionem declinante accessione dandus, vt existimat, cibus est, atque semel datum sufficere: nisi pulsus fuerit defectio. Non enim oportuit virium debilitate captata cibum dare, quum fuerit nostræ potestatis oportunè antè ægrum, quàm deficiat reficere. Vinum etiā & varium cibum declinante passione dandum recte consulit, sed non suo conueniens iudicio. Etenim phreniticis atque lethargis ante declinationem vinum dedit.

Ad Themisonem.

Cap. XXIII.



T Themison aliàs quidem pleuriticos recte curauit, peccauit autem quarta die cataplasmando, de hinc cerotarium apponēdo, ex aliquo virtutis feruentis vngendo, atque ruta. sunt enim acria. De hinc cerotarij tempus declinante est passione.

Ad Heraclidem.

Cap. XXIII.



Heraclides Tarentinus sanguinis extimens abundantiam secunda die vtitur clystere bis aut tertio, atque post paululum phlebotomat, conturbans corpora requie indigentia. Etenim quærendum quid magis esse confirmat, vtrū ne fluore ventris, aut tumore & retentione stercoreū sed si fluor est, hūc duplicat adhibēdo

CÆLII ACVT. MORB.

clysteres. At si tumor est, hunc eorum duplicat acrimonia. Credas etiā eādē iniectionē suspensam raptu quodam patientibus aduenire partibus, & propterea vchemētius nocere. Hic quoq; etiam phlebotomiæ vtilitas. vexatæ etenim tribus clysteribus vires, sanguinis prohibēt detractionē. Dehinc neq; omnes, neq; secunda necessario phlebotomandi sunt die, sicut supra docuimus. Cataplasmat etiam aqua solutis pollinib⁹ (quod Græci omen lysin appellāt) admixto fico vel panace aut chamæpity, quorū complexio ob qualitatis acrimoniam noxia iudicatur. Probat post vsum cataplasmatīs, malagma, quod Apollphanis appellamus, siue polyarchion. Item sua inuentione cōscriptū, quæ omnia sunt acerrima, & propterea recusanda. Dat præterea mulsum præbibendū in quo præcocta vel præinfusa fuerit ruta. At si sputa excludi cœperint: dat medicamē bibēdum quod conficit ex hyssopo, iride, & melle. Si (inquit) non fuerint congrue vel sufficienter exclusa, addendas absinthij drachmas sex: sed si nausea occurrerit, apium vorare iubet ægrotantes, vel oliuam ex aceto mandere. Hæc quoq; sunt acria, & stomacho inhærentia. Ipse deniq; tentatione expertus ex supra dictis eusionem fieri stomachi, ordinat ob nauseam retinendam incongruam scilicet, quæ constringere possint. Ait enim, si non recesserit sputorū emissio, sequenti die iniicienda atq; excludenda, cōmoueat iris, eadē clyster per ventrē detrahi prouocet, noxia noxijs cōmittens. Siquidem etiā per clysterem iniecta, ex eadem sint materia, ex qua sunt ea, quæ bibenda ordinauit, quo fiet vt com-

mouens tumorem, magis faciat excludenda quæ putat retineri. Dat etiam viscellum gallinaceum cum mulso ex vino, vel succo ptisanæ quæ sunt in corruptione facilia, atq; infantia & ventrem in fluore mouentia. Dari præterea vinum iubet his qui fuerint viribus debiles, nisi caput (inquit) doluerint, non aduertēs quia temporis opportunitate permittente omnibus conuenit dare: vtq; econtrario resistente, neque imbecillib⁹. Etenim si (vt existimat) valentes viribus vexat, multo magis imbecillos. Neque recte sentit ita dandū, nisi caput doluerint. Dolor enim si prohibet capitis, nō aliter etiam lateribus prohibere perspicitur, prius quàm passio declinauerit importunū datum. nanque omnia quæ patiuntur exagitat, nec solum caput. dicit etiam declinante passione gobiones pisces dandos, accedente profectu etiam carnem, atq; panem, non consiciens, quia omnis acrimonia tussientibus, vel spirationis difficultate laborantibus, vel spuentibus sanguinē inimica est: etiā declinante passioe. Simile enim quiddam facit, quale contingere videmus in externis corporis partibus vulneribus constitutis, quæ cum sunt adhuc tenera, cicatrices nouitate acrioribus exusta facile resoluuntur.

De peripneumonia. Cap. XXV.



Onsequens atque vicinum est peripneumoniæ dicere curationem, quæ nō vt priores voluerūt, à parte corporis quæ patitur nomē sūpsit, sed ab ea quæ plus patitur. Si quidem neq; sine febribus esse videatur. Perficiunt hanc passionē causæ quæ etiā

pleuriticam faciunt, vt venenum sumptū, vel ex opio atq; hyoscyamo confecta tussientibus medicamina, vel his similibus virtutibus. Item catarrhus vel coryza, vel, quod est rarissimum, synanchica præcedens passio. Nam frequentius antecedente pleuritica peripneumonia sequitur, quò fiet vt perniciosior sit antecedente, siquidem vexatis prius viribus atq; adiutorijs ex parte incassum prærogatis in secundam veniant ægri passionē. Afficiuntur autē iuuenes magis atq; ætatis mediæ: at senes vel pueri atq; mulieres difficile. Hanc igitur quidam diffiniētes passionē vt Demetrius Herophilus libro duodecimo de passionibus, peripneumonia, inquit, est tumor in totò pulmonis corpore, ex parte enim si fuerit pleuritis dicitur. Addere autem debuit cum febribus, siquidem sine his peripneumonia esse non possit.

Quæ est peripneumoniæ intelligentia.

Cap. XXVI.



Diffinire Methodici iuxta Sorani iudicium declinant. Asclepiadis sectatores aiunt esse peripneumoniam parui temporis solutionem cum tumore, atque febre, solutionem (inquiunt) ob humorum emissionem: parui temporis, ad discretionē phthisicæ passiois, quæ est & ipsa solutionis vel effluentis humoris per tussiculā exclusio. Peripneumonia (inquiunt) ad discretionem aliarum passionum, parui (vt supra diximus) temporis solutionem ingerentiū,

vt oculorum vel aurium, adiecerunt etiam cum tumore atque febre. Si quidem solutio, hoc est, eruptio parui temporis ad pulmonem fiat, peripneumonia ad eas partes sine febribus. Huic Soranus occurrens diffinitioni ait: Quum semper strictura in his obtineatur, nō oportuisse passionem rheumatismū vel solutionem dici cum tumore, sed forte tumorem cum rheumatismo. Etenim parua maioribus postponuntur. Est igitur secundum nos peripneumonia strictura vehemens, atque acuta pulmonis cum sputis & siti & febricula celeri atq; acuta.

Quomodo intelligitur peripneumonia. Cap. XXVII.



Intelligitur ex his quæ cōcurrunt. Etenim peripneumonicos sequuntur febres acutæ, grauedo thoracis, & sensus laborantium quadā difficultate laterum, atque mediū papularum. Iacendi etiam facultas supinæ positionis atque paulo erectior. Frequens etiam sedendi delectatio, atque supra latus iacendi difficultas, ita vt præfocabilis esse sentiatur, vultus rubor, tanquam florens, oculorum veluti pinguis aspectus, atque etiam splendor, scilicet in partibus albidis quæ præter pupulam videntur. Et magis cum alterna conuersatione aspiciunt ægrotantes. Sequitur eodem etiam anhelitus celeritas, tussicula sanguinolenta, atque fellea, vel fumosa iactans sputa,

CÆLII ACVT. MORB.

& in comparatione pleuriticorum fuluiora, vel spumosiora, spiratio difficilis, desiderium frigidi atq; plurimi aëris hausti rapiendi, frigidi etiam potus appetitio, os siccum, lingua aspera, ac primo subalbida, dehinc rubra, pulsus vehemens & celer, anxietas, iactatio, vigiliæ iuges, ingemens atq; turbulentus somnus. Peiorâte passione thorax etiam extantior fiet, accedente spirationis persecutione cum quodam sibilatu vehementi, atq; aspero. Sequitur etiam colli ac vultus inflatio, & oculorum aut immobilitas, aut difficilis motus, visus nubilosus vel nubilus, mentis alienatio, articulorum frigidus torpor, attestante liuore, lingua crassior atq; conductione breuiata, sudor superiorum partium, pulsus latens aut fornicabilis, quem græci myrmizonta vocât. In ultimo etiam pectoris resonans stridor, quem rhogmon appellant. At si salutaribus prosperata signis passio cœperit in melius vergere: omnium supra dictorum fiet paulatim deductio, aliquibus etiam semel amputata decisio. Quidam deniq; in pleuriticam passionem redeuntes releuati vixerunt, accedente dolore, & plurima spirandi difficultate. Etenim prædicta quæ peripneumoniam designant, vel concurrentia cōplent, sunt hæc, febres acutæ, spirationis celeritas, ac difficultas, tussicula, atq; sputorum varia emissio, grauatio sine vlllo dolore, aut cum paruo præfocationis sensu. Est autem passio generaliter acuta, atque strictura suffecta, adiuncto leui humoris fluore, quem rheumatismum vocant. quo fiet vt magis stricturam vocemus, etiam si dolor non fuerit. quippe cum insesse grauedinem atque

pressuram videamus, & asperitatem, & siccitatem, & accessionem, vel his similia signa.

Quis locus in peripneumoniacis patitur.

Caput XXVIII.



Atque in peripneumoniacis Diocles venas pulmonis inquit, Erasistratus vero, arterias, Praxagoras eas inquit partes pulmonis pati, quæ sunt spinæ coniunctæ, etenim omnem inquit pulmonem pati Herophilus, si febrē (inquit) fuerint passus, pleuriticam facit. Asclepiades vero, eas pulmonis partes pati, quæ arteriæ sunt adhærētes, quas appellāt bronchia. Item Apollonius Herophilus inquit, ipsius pulmonis venas atque arterias pati. Soranus autem cuius verissimas apprehensiones latino sermone describere laboramus, totum inquit corpus passione vexari: sed pulmonem vehementius, quod quidem æstimatum, & non ad expressam fidem accipiendum iudicavit. Est etiam inutile curationi, quippe quum nihil obftet locorum neglecta specialis apprehensio, ubi totum corpus laborare senserimus, & neque mutabilis sit adiutoriorum qualitas, pro patientibus locis, sed talis perseveret in genere, donec passio ipsa perseverat. Manifestum autem ex supra dictis, quomodo possunt similia quæque peripneumoniacæ passionis internosci accipimus. Pleuritici enim, vehementi dolore lateris afficiuntur: dyspnœici vero quos Anhelosos dicere poterimus, siue suspiriosos, sine febribus esse noscuntur. Et non solum celeri atque acuta afficiuntur passione: sed aliquando etiam tarda, atque obtusa. Nam græci chronicam

vocant. & cætera.

Quomodo curandi sunt peripneumonici.

Caput XXIX.



Onuenit peripneumonicos facere in loco medie lucido atq; calido, & ita haberi vel componi, vt reclinato leuiter thorace collocetur. Ad hoc enim passionis siue schematis genus, ipsi quoque ægrotantes releuentur, dehinc abstinentia adhibenda, vsq; ad primam diatriton. Si nulla obstiterit vrgentior causa. seruandi etiã à somno vigiles accessionis tempore, adhibita articuloꝝ rum leni atq; calida manuum defricatione. Calesfactionibus etiam lenibus ex pannis vtendũ. Tunc quum statum sumpserit accessio, lanarum appositione thoracem secus, atq; medio scapularum. Sed quæ sint ex oleo calido ac dulci expressæ. declinante accessione os colluendum, ac deinde potus dandus aqua calida. Tunc somnus permittendus, adhibita etiam phlebotomia, permittentibus viribus, sed si intra diatriton in passionem venerint ægrotantes, quod quidem est rarissimum, erit tum phlebotomia adhibenda. Si autem non in ipsa diatrito, tunc vnctione, dehinc aqua ora fomentamus, & damus sorbilem cibum, atq; tenuem ex alica. Etenim ptisana inflationem facit. Item oryza constringit. simyla quoq; in initijs grauis est. conficiendus itaq; erit vt supra diximus sorbilis succus melle, atq; anetho & oleo. At si æger sorbilia quæq; horruerit, vel recusauerit, alicam dabimus ex aqua calida, aut ouum sorbile. Tunc vsque ad declinationē totius passionis alternis cibabimus diebus, si vi-

res ægrotantis permiserint. Atque ita thoracem cataplasmamus, & interscapulam, quod græci metaphrenon appellant, leni scilicet cataplasmate, vel mulso mediocriter decocto, aut pane ex aqua calida, ex polline, atq; fœnugræco, & aqua mulsa, vel fici aridi decoctione, eius quanquam sit refflata succositas, tamen manet veluti mellofa dulcedo. Tunc cucurbita eisdem locis cū scarificatione adhibenda, sed dimissionis tempore. Leues autem, quas *κούφας* appellamus, etiam in accessione adhibere possumus, & frequentes atque multis partibus. Tunc vaporatio spongiarū & cataplasmatum apta, & si sese ad tempus grauari sentiunt ægrotantes, eorum appositionem ægre tolerantes; tamen ex his plurimum deinde commodi consequentur. Erunt adhibenda angusto licet tempore detracta, atque rursus apposita, quo etiam tussiculæ mitigetur inquietudo, & ea quæ egeruntur facilius lapsa sine vlllo tormento reddantur. Erit decoctum mulsum dan- dum, vel fœnugræci decoctio cum melle: facit etiam nucleorum contritio mulso admixta, vel amyllum aqua contritum. dabimus etiam eclegmata forbilia ex lini semine, ac fœnugræci nucleis, & melle decocto, & ouorum vitellis confecta. Quum statum sumpserit passio, gestatione leui vtemur. Quum vero declinauerit, vario nutritus cibo seruantes ac præcauentes multo tempore ex liquamine & oleo cibos, siquidē tussiculam commoueant, tunc lauacrum adhibemus, & vltimo vinum damus. Pectori autem atque à tergo circulatim cerotaria apponimus, ex oleo dulci confecta, vel cyprino, admixta iridis

CÆLII ACVT. MORB.

radice decocta vel meliloto, & secundū aliquos
 sampſucho. Sed est hoc acerrimum, quāquam sit
 calidæ virtutis. Post cerotarium vero apponim⁹
 quod appellatur diachylō, vel Mnasei. Aliqui eti-
 am adhibuerūt illud quod Nileus appellatur. Itē
 Antisophantis quæ non sunt ita vehementia, &
 propterea permittēda. Horum sane compositi-
 ones de medicaminibus scribentes, interrogationū
 docuimus libris. Ex antiquis autem Erasistratus,
 & Herophilus de ista passiōe nihil dixerūt. Hip-
 pocrates verò libro regulari (quem diæteticum
 vocauit) peripneumonice inquit remediū aptā-
 dum ex cocco, atq; galbano, atque attico melle,
 vel abrotano, ex aceto mulso atq; pipere admix-
 to, & helleboro nigro. Sūmum (inquit) est eti-
 am panacē in mulso ex aceto cōfecto decoque-
 re, & liquatum dare bibendum. Sed hæc somnia
 Soranus esse iudicauit, & propterea reprobanda,
 adiiciens, quòd mulsum ex aceto factū constri-
 gat, & sit inconueniens tumori. Item Diocles ait
 peripneumonicos qui annū sextum natu excess-
 rint, post iniectionem succo cibari oportere. Sed
 fortiores atq; validos viribus leuius, imbecillio-
 res vero plenius. Omnes tamen communiter pa-
 rum refici iubet, qui vltra annum quartumdec-
 mum fuerint hac passione ægrotantes, adhibens
 acerrimos clysteres, & propterea noxios. dehinc
 sine ratione ad dierum numerum cibum dandū
 putat. Item libro quem de passionibus atq; cau-
 sis & curationibus scripsit phlebotomandos di-
 cit, & adhibendum tempus tacuit. Dehinc ven-
 trem commouendum existimat, exagitans atq;
 exsuccans interiora. Addit etiā vnguentū na-

ribus admouendum, & succum scamonię quam
 diagridium appellamus, & helleborum & opium
 succo consparsum obsidens odoramentis pernicio-
 sissimis caput usque ad quintum diem mulsum ex
 aceto solum dandum præcepit, excitās profecto
 tumorem constrictiue virtutis causā, & immoderata
 abstinencia vires absumens. Vtitur etiam
 cum his potionibus vexatiuis absinthio infuso &
 thymo decoctis, & eisdem dans quoque transuorā-
 dum, atque sorbendum passum cum aceto & mul-
 so confecto. Quæ omnia (ut ratio demonstrat)
 sunt acria, & propterea tumori contraria. Item
 Praxagoras eandem pleuriticorum atque peripneu-
 monicorum tradidit curationem. Asclepiades ve-
 ro, secundo libro celerum vel acutarum passionū
 phlebotomiam recusauit. Siquidem nullo dolore
 ægrotantes afficiantur, & propterea si fuerit ad-
 hibita ex initio, sanguis tenuis atque subtilis exire
 videatur. Sed errans plurimum (ut Soranus ait)
 neque enim moderatio detractionis sanguinis mu-
 tatione demonstratur: Neque etiam solos dolētes
 phlebotomandos accipimus, sicut idem Soranus
 libris quos de adiutoriis conscripsit edocuit. De-
 hinc ipse Asclepiades ait, quosdam peripneumo-
 nicos dolere oportuit. Igitur etiam nunc sicut in
 pleuriticis, non ex causa reprobare phlebotomi-
 am, sed à commorantibus inquirere, vtrum in om-
 nibus peripneumoniciis obesse regionaliter videa-
 tur. Prohibet etiam cataplasmata & vaporations
 quorum est vtilissimus usus ob relaxandam stric-
 turam. Item reprobatur clysteres, atque omnia me-
 dicamina, & quidem recte, sed non suis conueni-
 ens placitis. In phreniticis enim clysteres adhi-

CÆLII ACVT. MORB.

buit. Itē libris quos de vini datione scripsit, in febricitantibus iugibus inquit utēdum clysterib⁹. dat etiam cum aqua mulsā hyssopum vel tragoriganum, & sunt hæc acria, atque medicosa, quæ græci pharmacode appellant. Mitescente inquit interea passione, cataplasmata adhibenda, atque cibis asperioribus diebus nutriendos ægrotantes existimat. Quum nos oporteat sæpe leuioribus diebus cibos dare. Tunc puriores siquidem dimissiones occurrant. Item Titus huius sectator bis in die adhibendam inquit defricationem, quā quidem veluti quassantem in acutis passionibus reprobamus. Themison vero, alia quædam de passione rectē composuit. Sed peccat iubendo eos secunda vel tertia die gestari, quoniam nondum sumperit passio statum. Iubet etiam cum scarificatione adhiberi cucurbitam declināte accessione, quum sit adiutorij genus restrictiuū, & propterea proprium dimissionis. dat etiam bibere aquam frigidam, vel frigida vicinam, & non est consequēs sorbilibus cibis atque curationi laxatiuæ potus cōstrictiuus. Si, inquit, incensa atq; longa fuerit accessio, ut ardore ac siccitate difficultatem faciat excludendī ea, quæ tussicula emitti coguntur. dabimus pityidas vel nucleos aut cucumeris semen bibendum cum aqua, aut secundum modū collecta, & sunt hæc maxime contraria. Augmenti etenim atq; accessionis tēpore etiā aqua quę nullius est qualitatis noxia pspicitur. Utitur etiam amygdalis amaris, quæ ob amaritudinē tumores vehementius accēdūt. Itē Heraclides Tarentinus eandem indicauit curationē adhibendam, quæ pleuriticis est ordinata.

Multi Empirici potionibus atque sorbilibus cibis vsi sunt. Item pityda & ruta & menta & tragoriganum & abrotanum & pulegium atq; origanum. Alij hæc singula: alij secum mixta adhibentes, sic deniq; amyllum cum aqua præcoctū atq; melle mixta admiscuerunt. Tunc amygdala amara & hæc sorbilia mouent ramo hyssopidant etiam irin & gentianam decoctam cum pulegio & anagallide herba, & eryngio, & marubio, & his similibus, quæ omnia ratione circūscripta reprobanda sunt.

De Cardiacis. Cap. XXX.



Cardiacam passionem aiunt quidā duplici significatione nuncupari, cōmuni & propria. Sed cōmunem dicunt eam, quæ substantiā in stomacho atq; ore ventris habuerit, ubi etiam moridatio sequitur supradictarū partiū, vt Hippocrates primo & secundo libro epidemion commemorat, & Erasistrat⁹ libris quos de vêtre scripsit. propriam autem dicunt eam, quæ cum sudore fuerit, atq; pulsū imbecillo, de qua nunc dicere suscepimus. Nomen autem hæc sumpsit passio, vt quidam volunt, à parte corporis quæ patitur. Siquidem putent principaliter cordis esse ægritudinem. Alij vero aliter sentiunt. Siquidem vulgus quadam consuetudine propria atque dominantia magis nominibus appellet, vt magnū mare, sacrum mare, atque luem deificam vel epilepticam passionem. Est igitur in nobis propriū, atque vicens, & dominium vitæ continens, cor: quapropter tanquam magna passio quam summæ potestatis habet, nomen sumpsit.

CÆLII ACVT.MORB.

Quid est cardiaca passio: vel quomodo eius
agnitio tradenda. Cap. XXXI.

Definitiones enim Soranus dicere de-
clinauit. cognitio igitur siue intelli-
gētia eius passionis ab Artemidoro
Sidenſi Eraſiſtrati ſectatore tradita
eſt hoc modo. Cardiaca (inqt) paſ-
ſio eſt tumor ſecūdum cor. Item Aſclepiadis ſe-
ctatores aiunt tumorem ſecundum cor corpus-
culorum coaceruatione ſiue obtruſiōe effectum.
Soranus vero (cuius hæc ſunt) tumoris inquit ſi-
gnum nullū ſubefſe quod in cardiacis videatur.
Item cor pati, non valde plurimis probabile vi-
detur: ſed ait cardiacam eſſe paſſionē ſolutionē
celerem atq; acutam, qua diſijci corpora per om-
nes viarum particulas apprehendit. Fit autē ma-
gis æſtatis tempore: atq; in viris potius q̃ in mu-
lieribus: & calidis atq; iuuenibus corporibus, vel
habitudine plenis & excercitis, ſed p̃cedētes cau-
ſæ quibus hæc paſſio ſufficitur, multæ atq; varię
ſunt: magis autem iugis indigeſtio vel vinolen-
tia, aut poſt cibū lauacra, aut poſt cœnā vomit⁹,
aut mœſtitudo vel timor, in quę conſentiens cor-
pus ſoluitur in ſudores. Emergit autem frequen-
tius quinta vel ſexta die, in febris cōtinuis, vel
ardentibus, atq; flammatis.

Quomodo intelligimus eos, qui in cardiacā
venire poſſunt, aut etiam in ipſa conſti-
tutos. Cap. XXXII.

Intelligimus eos qui in cardiacā paſ-
ſionem decliues atq; proni vidētur,
& eos qui ſunt iam in eadem conſti-
tuti, ex his ſignis quę concurrunt.

Sequitur enim in passionem pronos, febris acuta atque celerrima & flammosa, pulsus celer, densus, humilis, & quasi humectus toto accessionis tempore. Aliquādo etiam usque ad dimissionem, ut, etiam si feruoris releuatio fuerit quadam circumscriptione collecta: non tamen simili profectu pulsus quoque erigi videatur, quippe cum magis sui comparatione demersior esse noscatur. Aliquādo etiam ut inordinatus occurrit, sed non ita ut deficiēs intelligatur, sed celeritate coactus, implicatis saltibus, ordinib⁹ careat modo. Sequitur etiam fastidium, sitis immodica, somnus paruus & facilis in suscitatione, hallucinatio, hebetudo, iactatio: Item genuū gelidus stupor, atq; cubitorum & tibiārū, crescente accessione, vel usq; ad eius finē. Hæc concurrunt aliquādo non præuexatis viribus: sed ratione passionis effecta. Aliquando vero præuexatis ob nimiam sanguinis detractionem: vel ventris coaceruatam effusionem: vel cuiusque materiæ corporis immoderatā eliquationē, ut peiorantibus febribus dissolutio fiat. Addunt vel attendunt quidam etiam aëris æstus, vel vtrum temporaliter abundant solutiones, aut æger sit lactea corporis habitudine, vel communiter si tenerum atque albidum, & diffusum ac pingue habuerit corpus, & aquatum colorem, sit ne etiam hac passione tentari consuetus. Sed hæc (ut Soranus ait) sunt incerta & instabilia. At vero si iam fuerit præsens, sequitur ægros articulorum frigidus torpor, aliquando etiam omnium crurum vel manuum, aut totius corporis: pulsus densus, celer, par-

k.j.

uus, imbecillis, inanis, & quasi fluens: incremente passione etiam demersus, obscurus, tremulus, & formicabilis, & inordinatus, ac deserens, attestante halucinatione, despositione cum vigilijs iugibus, & quibusdam repentinus atque coactatus per totum corpus sudor. Quibusdam verò primum ceruice tenus & vultus, parvus, tenuis, aquatus, dehinc per totū, vt supra diximus, corpus plurimus. Tunc crassius, & tractuosus, atque viscosus, vel male redolens, tanquam lotura carnis, respiratio parua atq; anhela, & in sustentabilis, & per profectum rara loquutio ac tremula. Ora pallida, oculi concaui, thoracis grauedo, debilitatis causa animi defectus imminentibus accessionibus. Aliquando etiam translatis lingua humecta: aliquibus vero ob complexionem tumoris parui in visceribus constituti, arida atque sicca, attestante desiderio frigidi potus. Deficiente ergo, visus obscuritas, articulorum liuor, vnguis vncatio, quam gryposin vocant, & plurimis mentis integer sensus, quibusdam vero falsitas intellectus, cordis saltus crebrior. Dehinc deficiens corporis superficies rugosa, & ea quæ pereuntibus frequenter occurrunt, vt solutio ventris. Perniciosum etiam signum est inuoluntaria lachrymatio, hoc est sine vlla ratione, vel oculorum ex aliqua parte saniosa atque purulenta similitudo, vel ex oculi circulo, quæ nigro cum colore apparet nata albida, quæ in vnguis similitudinem, vel nascentis, vel crescentis lunæ cornibus respondens paulatim sumat augmentum. Hanc græci ὀφθαλμία vocauerunt, item

coaceruata atque non masticata cibi transuoratio, cum quodam sonitu, perniciem denuntiat, & magis si immutata atque indigesta post sumptionē fuerint immorata plurimo tempore, & tanquam in vtriculo moto ventre sonitum reddant, quem græci βόμβος vocauerunt. Est enim signum mortuorum corporum, vt tanquā inanimato atque insensibili tegmine cibus depositus videatur. Peius etiam omnibus cibi sumptionibus priuari fastidio, atque omnino accipienda recusare, vel etiam vinum non appetere, aut post acceptum cibum grauari potius vel febrire. Tunc rursus in solutionem recurrere, vt leuiter resumptum, celeriter restringi, vel accepta reiicere & ventrem fluere, aut labiorum pati tremorem. Mordere etiam in accipiendo cibo vel potu cochlearia, vel poculorū labra. Etenim deficientis spiritus est signum tanquam lassantis, nec valētis oris partes attollere, sed moribus inuoluntarijs succumbere: Est etiam grauius diaphoreticum delirare. Siquidem neque vini datione, neque varietate ciborum ad subleuandas vires constātius vti possumus. Itē grauius est post dationē ac resumptionē rursus in febres recurrere. Tunc cū quadā mœstitudinē latenter dissijci per sudorem, atq; marcere. Etenim solubile ac dimissum fit egrotantibus corpusculi robur, atq; vultus visus obtusus. Lingua aspera, & arida, præcordiorū etiā raptus ad supiora, & post cibū grauatio, sic enim ægotātes multis diebus marcore quodā demersi moriuntur. Neq; enim paruo atq; simplici cibo sufficiēter refici possūt, neq; multo ac solido valentius tolerata occurrere digestionē.

CÆLII ACVT. MORB.

in quibusdam etiam sine sudore vires soluuntur, & naturalis vigor, disiectione occulta, quā græci ἀδ'ηλον διαφόρησις vocant, extinguitur: quum omnis corporis habitudo laxior, atque dimissa, & friabilis fuerit facta. At si in salutaria signa venire cœperint ægrotantes, pulsus resurgit, corporis frigus frangitur, & difficultas respirationis minuitur, accedente animi quadam securitate, & post sumptionem cibi virium profectus: somnus quoque altior tãquam post laborem dormientium.

Vtrum ne febricitent cardiaci.

Caput XXXIII.



Quæritur etiam vtrum cardiaci febricitent, & plurimi quidem ante Asclepiadem febricitare cardiacos negauerunt. Alij vero contraria dixerunt, vt Apollophanes Erasistrati sectator. Item Asclepiades plurimos inquit nō febricitare. libris enim quos ad Erasistratū fecit, & appellauit contradictorios, dico, inquit, cardiacos non febricitare. sed secundo libro oxeon non inquit febricitare frequenter cardiacos. Item Themison & Thessalus, Demetrius Aponicus quosdam febricitare aiunt: quosdam negauerunt. Demetrius vero Aponicus incipiente inquit passione atque crescente omnes febricitare. Post vero cum vehementescere cœperit febris, passio recedere fertur. Igitur qui nullum aiunt febricitare cardiacum, dicunt quòd febricitantibus plurimus necessario feruor adsit, & grauedo cum difficili motu corporis, & ariditas, vel tanquam vul-

nerationis singularum viarum sensus, & rubor atque extensio præcordiorum, nihil inquirunt horum in cardiacis incurrere, quapropter neque febricitare probamus. Dehinc secundum Asclepiadem febricula est, feruor plurimus in omnibus, siue plurimis corporis partibus: commutatiove pulsus in vehementem ob obtrusionem facta. At in cardiacis neque maior est pulsus, sed magis humilis, neque vehemens, sed magis imbecillus, neque feruor plurimus, sed magis in alijs paruus corporis partibus: in medijs omnino leuissimus. Utendum igitur clysteribus in his qui sine febris fuerint iubet constantissime. Quidam vero conclusioni viarum causam febrium ascribentes, aiunt disiectionē siue diaphoresin diraratis partibus fieri totius corporis, in his vero febrem densatis, quarum ex affricatione quadā nasci ac proficisci feruorem. Apollonophanes omnes inquit cardiacos febricitare secundum Erasistratum, siquidē cardiaca passio ex cordis tumore fieri videatur. febricula quoque magni tumoris fit ex causa. Item aliqui nouelli scriptores aiunt signum esse periculosaē passionis, non sine febribus ægrotare, atque malignas passiones accedētibz fieri febribus, tunc diaphoresin venire, vel cessantibus sudoribus perseverare febrium reliquias. Sed hæc utraque Soranus excludit, nam primo dicto respondens ait aliud esse signum, aliud accidens. Nam signum, neque recedit, & semper significato coniunctum est. Accidens autem, quod græci symptoma vocant, nunc aduenit, nunc recedit, ex quibus esse intelligimus singula quæ febricitantium accidentia dixerunt, ut corporis difficilis

k.iiij.

CÆLII ACVT. MORB.

lem motum, grauedinem, tensionem præcordiorum. Etenim aliqui febricitâtes nulla ex ipsis patiuntur, si febricula secundum solutionem fuerit facta, sed feruor mordicans, atque febrem desig-
nans, tanquam ex alto quibusdam cardiacis inest. Asclepiades ait secundo libro acutarum vel celerum passionum non semper, sed frequenter ex febricula fieri hanc passionem. At si omnes cardiacos sine febribus esse voluerit, siquidem non adsint secum ipsum febrium signa, respondere poterimus, eum peccare non videndo vera febrium signa. nam manifeste atque prompte in initijs accessionis articuli frigidi reperiuntur, & pulsus humilis & imbecillus: quod secundo poterit obijci, quo putant densitatem viarum esse febrium causa. Item aliqui aiunt complexa ægritudine ægrotare cardiacos, qui cum febribus fuerint, atque ita cum aliis fuerint viæ laxatæ, aliæ densatæ: raritate diaphoresis fiat, densitate vel adfricatione febricula. Nos vero Sorani sequentes iudicium, & solutione absoluta fieri febres accipimus, hoc est raritate viarum, ut & ipsis est consequens, sicut libris de febribus docuit. Item Erasistrati sectatoribus respondebimus, falsum esse omnes febres ex tumore fieri; siquidem quædam fiant solutione. at si hoc parum etiam probauerint, cardiacam tamen nullo ex tumore fieri non negabunt. Nam quum sint ægrotantes integro iudicio mentis, & nullo sensu doloris, vel ceteris stricturæ signis afficiantur, cordis inesse tumorem erit falsissimum, atque omnes cardiacos febricitare. Sed neque periculosas passiones signo febrium designari recte dixerunt. Est enim cholericæ grauis atque periculosa

passio, quæ nunquam cum febribus fiet. Antecedere autem febres cardiacam passionem verum est. Sed aliquando sudoribus solui, sicut etiam tumor soluitur in humorem purulentum conuersus collectione suffecta. falsum etiã esse perspicim⁹, cessantibus sudorib⁹ manere febriculæ reliquias. Pleriq; enim sine febribus reperiuntur. Dicimus igitur (sicut omnes nostri methodici) quosdam sine febribus: quosdam cum febribus esse cardiacos, vt eos qui sanguinis emissionem soluuntur: quosdam vero febricitare. namq; inanibus & celatis locis, vel supra quæ iacuerint antea, apposita manu, tarda perseueratiõe occurrat plurim⁹, & mordicans ascendens feruor ex alto, febrium referens signum, attestante anhelatione feruenti cum delectatione frigidi potus. Quibusdam etiam lingua sicca atque aspera inuenitur.

Quis in cardiacis locus principaliter patitur.

Cap. XXXIII.



Ræpati in cardiacis Erasistratus, & Asclepiades cor dixerunt: Alij membranam quæ cor circumtegit: alij diaphragma, hoc est membranam, quæ à visceribus discernit intestina: Alij stomachum: alij pulmonem, atque iecur. Sed hi qui cor pati dixerunt, aiunt primo ipsius se nominis testimonio iuari: siquidem ideo cardiacæ dicatur passio, quòd ex cordis veniat causa. Nam cardiaci græci cor vocauerunt. Secundo q̃ eidem cordi, in ipsa passione cõstitutis, saltus inesse videatur, atq; in sinistra parte secūdū papillā thoracis grauedo. Tertio ipsius passiõis magnitudo, quæ fieri nõ posset, nisi aliqua corporis parte

CÆLII ACVT. MORB.

principali atque propria patiente. Est autem cor præstans atque salutaris corporis particula, præministrans omnibus sanguinem membris atque spiritum. sed his quidam occurrentes primæ propositioni responderunt, quòd passio à magnitudine nomen sumpserit. Secundæ quomodo similis arteriarum cordis est motus, grauedo etiam quibusdam cardiacis occurrit in toto thorace, & non solum in sinistra parte, quæ si fuerit, poterit hypezocote membrana patiente fuisse suffecta, vel cuiusquam alterius vicinantis corporis, si locis ascribendæ sunt causæ. Tertio dictæ respondentes aiunt, multas fieri periculosas passiones, quæ non patientis cordis habeant causas. non enim ubi magna fuerit passio, necessario propriam corporis partem pati accipimus. Quippe cum omnes partes propriæ sint corpori. Alij vero propterea magis falsum dicunt esse, cor ista passione vexari, siquidem eorum testimonio qui hoc asseuerant, si propria pars atque principalis saluti, & propterea mox pati cœperit, morte præueniat sensum. Vulnerata denique cum fuerit statim atque sine vlla mora mors vulneris antecedit effectum. At si multo paruisse fuerit læsa, nihilominus mortem necessario perfecit. Et non similiter cæteris partibus, aut emoritur, aut durescit, aut in paralysem soluitur. Sed his rursus primi respondentes aiunt, quòd vulneratum cor celerius interficiat, siquidem multis ante præcisis partibus vulnus possit accipere, & pomposa, atque coaceruata sanguinis fiat effusio, nec tamen diaphoresis. Quòd autem neque emoritur, neque edurescit, neque paralyti

afficitur, argumentum est quidem non omnino cor pati negans, sed leuiter pati. Si enim cæteris similiter partibus corporis est natura cōfectum, iisdem necessario similes sustinet causas. Nos vero cum Sorani iudicio totum videmus corpus in solutionem laxari: totum necessario pati accipimus, & neque valde nobis de præpatienti loco certandum est, ne in occulta quæstione versemur. Non enim aut significatio, aut curatio secundum hæc differenter accipitur, quā oporteat omnibus corporis partibus adiutoria prolatari. Aliqui denique alios ex corde, alios ex mēbrana quæ cor circumtegit, aiunt diaphoresi vexari, & propterea eos qui ex membrana cordis soluuntur, adiuncto dolore laborare, qui punctionibus crebris ægrū afficiat: eos vero qui ex corde, grauedinem solam sustinere. Sed his quoque respōdemus, quomodo signa sibi quæ fingunt vera existimantes secum, oporteat, sicuti supra diximus, patiētibus quibusque vicinis atque continguis cordi aliquando stimulantem dolorem, aliquando grauedinem consequi.

Quomodo discernimus cardiacos ab his qui in stomacho patiente sudaue-
rint. Cap. XXXV.



Voniā plerisque stomachicis adest in accessione sudor, atque articulo-
rum frigus cum paruo pulsu, & animi defectu & pallore, quæ omnia sūt cōmunia cū cardiacis, horum quoque discretionē faciendam existimo. Asclepiades igitur hæc discernēs ait cardiacos, atque

CÆLII ACVT. MOR.

eos qui stomachi supinitate decoquuntur, ita internosci, quòd in cardiacis omnis pulsus sit paruissimus, atque imbecillus: cordis verò saltus maior, & vehemens cum grauedine thoracis, atque spiratione præfocabili. In his verò qui stomacho patiente deficiunt, atque coaceruant, cæteris arterijs pulsus cordis imbecillus inuenitur, exceptis cæteris accidentib⁹, quæ symptomata Græci vocauerunt. Nos vero magnitudinem pulsus in corde fieri cardiacis non inuenimus. quippe quum cor ipsum pati sit existimabile potius quàm verum, grauantur quidem thorace atque præfocabili spiramento respirant. Quidam stomacho patiente cum defectione virium fuerunt, depurgati, atque rursus cardiaci quidam nulla spiramenti præfocatione iactantur. Dicendū itaq; stomacho nunc tumente, nunc deficiente in tumore feruorem atque dolorem fieri, sub his partibus pectoris quæ costis teguntur, vel ex aduerso inter palas: aliquando etiā post cibum pressuram. At verò si defectione fuerit stomachus affectus, fluor sequitur saliuarū, & humecta callositas, & nausea, vel vomitus liquidorum atque cibi, frigus etiā articulorum. initio enim nunc feruore nunc frigore afficiuntur. In cardiacis verò neq; dolor, neq; post cibum grauedo, neq; vomitus esse perspicitur, & torpor frigidus idem atq; æqualis perseverat. Dehinc sudor aliquando cardiacis crassus excluditur & male redolens, ut saniem vel cruorem simulet. His vero qui stomacho patiuntur, tenuis omnino atque aquatus sudor inuenitur. Item animi defectio, stomacho

incipiente magis accessione fiet : cardiacis verò recedente . At si vero utręque passiones eodem concurrerint tempore, obscuratur discretionis fides, sed nihil curatio impeditur . Si quidem ijsdem adiutorijs curentur . Item in cholericis & tetanicis vel tumentibus, aut matrice præfocatis, plurimus sequitur sudor, adiuncto frigido torpore, qui ita discernitur, quum singularum passionum fuerit consideratio perspecta. In alia enim vomitum : in alia colla inclinari : In alia matricem tumere : in alia tumorem vehementem esse necesse est . At si nihil ex antecedentibus causis, quę passionem facere valent, fuerit repertum, si tamen præsens atq; prouocata corporis solutio, quę cardiacam designet, certo inesse passionem dicimus, nec satis necessarium, vnde illa solutio venerit, inuenire. Non enim curatio pro differentia antecedentium causarum mutanda accipitur . Vocatur autem secundum aliquos quędam passio etiam cardimona. quam Græci cardiogmon vocauerunt. Quam necessario sequitur dolor oris ventris, quem plurimi idiotę cordis dolorem vocauerunt . Generaliter autem cardiaca passio est solutionis, atque vna acutarum & vehementium passionum. Sed aliquando huic miscentur quędam stricturnę accidentia, vt tensio, vel tumor partium mediarum quę non speciali concursu, ac significatione sint cardiacis ascribenda.

CÆLII ACVT. MORB.

Quomodo discernimus cardiacos ab his,
qui prospero sudore liberantur, quē Græci
criticum vocant. Cap. XXXVI.



Quomodo etiam prosperi sudores
quos Græci criticos vocant, habent
quiddam circa visum similitudinis
cum cardiacis, ob ipsam redundan-
tiam, quippe in solutionem vehe-
mentium, vel continuarum febriū salutarī mo-
tu venientes, vtile duximus eorum ponere di-
scretionem. Multi etenim imperiti medici pro-
speros, atque mediocres sudores constringentes,
morbosa egrotantibus reddiderunt corpora dia-
phoreticos adiuuantes, causa mortis extiterunt.
Quare eorum differentiam necessario ducimus
ordinandam, quæ varia ratione colligitur. Nam
primo ex præteritis, dehinc ex genere passionū,
& magnitudine, & temporibus, & sudoris ipsius
ordine, & quantitate, & qualitate significatio fir-
matur. Ex præteritis inquā quum consideramus
vtrum signa futuri sudoris diaphoretici, an salu-
taris præcesserint. Ex genere passionum, quum
qualitatem attendimus passionis. si enim solutio
inest, sudor etiam inutilis ac diaphoreticus esse
monstratur: sin vero strictura inest, attenden-
da magnitudo. Parua enim passio diaphoresim
pati non potest. Si autē magna fuerit, attenden-
dum tempus. in statu enim totius passionis, atq;
temporalis accessionis, vel limpidā dimissione
criticus magis sudor ostenditur. In initio autem
vel augmento perniciosus. Ex ordine inquā su-
doris ipsius. æqualis enim bonus, inæqualis malus
sudor iudicatur. Ex quātitate signum accipimus

moderationem considerantes, modicus enim sudor bonus, immodicus malus accipitur. Sed deniq; sudantes excessa moderatione, diaphoresin incurrerunt. Ex qualitate autem significationem accipimus cum tactus iudicium adhibemus. Salutaris enim sudor calidus, tenuis, & non male redolet: probatur. Perniciosus autem sudor, frigidus & iuccidus, & male redolens atq; loturæ carnis similis inuenitur. Dehinc ex præsentibus atq; concurrentibus signis confirmanda significatio. Nam diaphoreticis magis parvus atq; creber & imbecillis & inanis pulsus inuenitur, thorax etiam grauatus cum respiratione frequenti, & iactatione, ac desponsione animi, vocis etiam tenuitate, attestante pallore. Rectè autem sudantibus pulsus erectior, respiratio faciliior, ac leuior efficitur, & in somno prona delectatio, & omniū aduersorum minutio cum animi atque corporis releuatione.

Quomodo curandi sūt cardiaci Cap. XXXVII.



Dehinc cardiacorum ordinamus curationem, (Deridendi etenim sunt qui hoc passionis genus incurabile iudicantes reliquerunt.) Multos enim omnes medici iuxta sententiam Sorani liberari videmus. liuore namq; commoti, argumētatione turpi, aiunt quidam eos liberari, non qui sint, sed videantur esse cardiaci. Quapropter Sorani nos iudicium seruantes, iacere facimus locis refrigerantibus, atq; vmbrosis, & obscuris, vt sunt plerunque hypogea vel speluncosa, atq; ad aquiloniam partem conclusa, vel certè solis tactu difficilia. semper enim

CÆLII ACVT. MORB.

atque magis in ista passione solem præcauendū accipimus. Et propterea vehementiæ eius ingressum, si qua ex parte venerit, prohibemus. Conuenit etiam neque maiora loca esse: solubilibus enim plurimum aër esse perspicitur. sed neque satis breuia: sunt enim præfocabilia, & quæ facile feruorem ex ingressu hominum concipiant, quos naturalis spiratio aerem accipere, atq; reddere anhelitus raptu necessario cogit. Denique si non fuerit naturaliter frigidus locus, hunc affectabimus, specularia detrahentes, nisi sol obstitit, aut aeris inequalitas. adiungitur frigori inducto purgatio aër, ingrediens locum, qui sua nouitate ac miti accessu reficiat ægrotatē, flabellis etiam latenter aërem frigerandum dicimus, aqua frigida aspergentes solum, & ea quæ influxione sui, quam Græci aporrheam vocant, spirationem facilem egrotantibus facere valent, circum proijci iubemus, quæ tamen sine ullo percussu atque odore graui valeant aërem facere cōstrictiū, vt vitis folia, aut myrti, aut quercus & pini atque lentisci, & mali punici, vel rosæ, atque his similia. Sic enim corporis fluor aëris occurrentis afflatu densatus prohibetur. Decocto denique supra dictarum materiarum liquore, frigido tamen, terram perfundimus: co-operimenta præterea, atque stramenta tenera & tritiora probamus. etenim noua vaporazione sui corpora resoluunt. Generaliter autem ipsa lecti concubatio neque dura, siquidem vigilias faciat, neque satis mollis, vt est floccorum, vel leuium plumarum, erit procuranda. Etenim re-

cessu facili corpori cedens vtrique orarum circū
leuigat tegmina , que amplexu quodam corpus
cingendo vaporationes sui resoluant. Denique
etiam quum fuerint molliores, erunt coarctan-
da straminum velamento, ne facili (vt supra
diximus) recessu concava faciat stramina. Lecti
etiam latitudo atque spatium tātum probatur,
quantum sufficiat ægro, alterna conuersatione
alterius loci frigus accipere, ac desertum vapo-
re carere, quo mutua vice semper veluti noua
repetendo, frigida inueniat, vt sine vlla lectorū
mutatione, in eodem lecto mutatio fieri videat-
tur. In altera enim parte ægro constituto, alterā
sternere poterimus, quippe cum sæpe translati
ægrotātes ex lecto ad lectum senserint defectio-
nem, atque paruo motu asperata passionis fue-
rit magnitudo. Tunc amplexu, atque ligatione
paulo tenaci vtemur articulorum, iubentes eos
quiescere, non solum corporis officio, sed si fieri
poterit, etiam cura animorum, lecto mutato ad
grabata ægros transferendo. augetur enim solu-
tio meatu quolibet. Multum denique sanguine
fluentibus prodesse immobilitas valuit. In statu
autem accessionis fouēdum dicimus caput oleo
frigido, atq; hispano recenti adhibito, etiam æ-
quali motu aëris accommodato, densantur e-
nim corpora aëris motu percussa, atque pluri-
mus sudor, non solum cedentis aëris, verum
etiam irruentis tanquam repercussus abstine-
tur. Utendum etiam spongijs teneris ex aqua
frigida expressis, quibus ora atque colla ægro-
tantes circumtegentibus virium resumptionem

CÆLII ACVT.MORB.

faciamus,temporum interuallis innouātes. Tūc
 to rum etiam pectus atq; oris partes, eodē mo-
 do percurramus frigidaē in fundentes spon-
 gias, admiscētes etiam aceti quiddam ac iugiter mu-
 tantes , ne perseueratione tactus ex vapore tes-
 pescant,& amissō frigore nō valeant facere den-
 sitatem. Aliquādo etiā linteola tenuia tingentes
 similiter aut succo plantaginis , aut polygonij,
 aut portulacæ, aut herbæ pulicariæ, vel semper
 viuētis, aut myrti, aut rubi comæ, aut rosarū, vel
 mali punici decoctionibus, aut hypocistidis her-
 bæ, aut acaciæ resolutæ ex posca aut oleo hispa-
 no, vel lentiscino, pectori atque ori ventris appo-
 nimus. At si sudorum perseuerauerit fluor, pro-
 bandam etiā asperginē quæ suo frigore ac pro-
 pria virtute, vel obstrusione constringat, iudica-
 mus: cuius frigerantia, atq; obtrudentia tactu, &
 densantia sunt hæc, terra samia & cimolia: frige-
 rantia verò, rosa arida contusa, atq; creta. In ista
 etiam alumen scissum, plumbum exustum, atq;
 lotum gypsum, atq; mala punica, oenāthe, acan-
 tha ægyptia, quam nos latinè spinam ægyptiam
 dicere poterimus. Hæc singula commixta, atq;
 corpori aspersa per linteolum rarum, sudantib⁹
 locis, vel omnib⁹ locis prodesse probatur. Opor-
 tet autem hæc singula diligenter conteri , atque
 ad summā tenuitatē deduci , vt patientibus ir-
 ruentia in ijs ingressu quodam vehēmentem fa-
 ciant constrictionem, & nulla corpus asperitate
 afficiant, qua possit æger aliter inquietari. Hinc
 nanq; cōmotus Thessalus vnus ē principib⁹ no-
 stris eorum vsum iudicauit cohibēdum. Etenim
 recte quoq; valentib⁹ (inquit) parua cuiusquam

asperitas contagio vigilias facere solet, stramentis irruens, terga iacentium, vel alias corporis partes laceſſendo inquietat. Eſt autem poſſibile ex ſupra dictis, & oleo hiſpano, aut alio ſimilis virtutis vnctionem facere conſtrictiuā non irrationabiliter. Nanque plurimī medici ad retinendos ſudores mannam thuris oui alboribus conterentes ita vt craſſitudinem mellis ſimilarent, tota corpora perunxerunt. retenta etenim, vt ita dixerim, his virtutibus corporis ſuperficie, neceſſario ſolutio conſtringetur. Probamus etiam cataplaſmata eiſdem virtutis, ſed alia ſimplicia, alia ex ſimplicibus compoſita, vel variata: pro magnitudine etenim paſſionis extēdi, atque minui virtutes medicaminum debent, ex quibus ſunt hæc: Palmulæ nucales quas cariotas appellant, trite cum oleo hiſpano, aut myrteo, aut lentifcino, aut melino, aut roſeo aſperſo, admotæq; vel polenta, præterea & palmulæ ſæpe vino infuſæ, aut aceto, aut poſca vehementius profuerunt. Vtemur etiam præinfuſis Thebaicis palmulis & malis cydonijs elixis ſingularibus, vel admixto amylo diligenter contrito, atque creto, cogente paſſione, etiam galla tuſa, atque creta admiscenda erit, vel acacia, vel alumen & hypociſtidis ſuccus, aut rhus ſyriacus, cataplaſmatibus alijs ſimillimę virtutis, vt palmulis, & malis contritis ſingularibus, vel cum altero ex his, vel vitis folijs, atque amyllum, & rubus, quam Græci baton appellant, virgultis contuſis, & contritis, Myrto etiam, & polygonio, & ſemper viua herba, quam aizoon vocant, & plantagine, & roſa, & vicia lupina, & portulaca, & intybo, cum

CÆ LII A C V T. M O R B.

polenta, vel palmulis, & pane. Horū singula apponenda sunt pectori ægrotantis, & præcordijs, ac frequentissime mutanda, quò frigida perseuerent, atque extenta medeantur. Possunt etiam rhus Syriaci sextarijs quatuor infusi diē atq; nocte in aquę sextarijs viginti decoqui, donec quarta liquoris remaneat, atque ita colandus ac rursus coquendus vncijs duabus donec coagulata omnia fiant, inductibiliaque digitis conuoluta, nullam corpori infectionem dimittant, vt vnā vel eādē qualitatem sufficiant. Similiter enim imposita constringunt fluida, atque laxata corpora, & stomachi vigorem repræsentant. At si tumor aliquis in præcordijs fuerit, nō sine præcautione erit cataplasmatib⁹ localibus vtēdum: supra dictis deniq; erit panis admiscendus, quoniam nimietas constrictiue virtutis temperetur. At si plurimus fuerit tumor, adhibendū simplicis polinis cataplasma siue panis infusi, quod Græci omen lysin vocant, iisdem scilicet locis, sed neque calidum, ne corpus prouocet in sudorem. Nos denique iuxta Sorani iudiciū præcordijs imponere hoc cataplasmatidis genus solemus. Palmulas, quas Græci patetos vocant, conterentes cum melle leuiter præcocto, asperso lini semine, atque contrito ita, vt qualitatem faciat inductibilem, & vt sæpe diximus quæ attrectata manibus nihil de se inquinamenti dimittat Græci denique amolynton vocauerunt. Tunc linetulo illitum apponimus medicamen. Vtimur etiā pane cum palmulis, atque secundum pectus vel thoracem prioribus, & à tergo partibus aliqua ex supra dictis apponimus. Potum dabimus frī-

gidum paruum, atque paulatim, ne liquoris multitudinem corpus irrigatum laxetur, sed magis tactu frigidaë qualitatis densetur. Tempus autem cibandi si adiuncta febricula diaphoresi fuerit, erit ex feruore corporis accipiendum, sicut primo libro de febribus scribentes docuimus. At si sine febribus fuerit passio, ex pulsu signum accipere poterimus, cum leniter erectum senserimus, atque alia concurrentia fuerint leuigata, et enim nunquam ægros nutrire potest accessionis tempore quicquam datum. quippe cum magis opprimat, atque anxium faciat ægrotatem. Quapropter affectandum artis industria alijs ex rebus vires vsque ad dimissionis tempus seruare, & ita cibo nutrire. Vtîmur nanque odoramentis. Hæc enim sensim quodam nutrimento reficiunt, ac resumunt latentem adiectionem corporis facientia, & cum quadam cōstrictione ac densitate, denique neq; simpliciter, aut indiscrete omnibus debemus bene olentibus vtî odoramentis, aut omnibus acrioribus. alia etenim percutiunt, alia diaphoresim prouocant in fluxum. Sit igitur polenta infusa, atqua panis assus aceto infusus, vel mala cydonia, aut myrta & his similia. Hæc enim defectu extinctam corporis fortitudinem retinent, sicut ratio probat, atq; Democriti dilataë mortis exemplum fama vulgatum. Vtendum etiam mulso bene decoctione ventrem fluidum faciat. Oportet namq; trib⁹ sextarijs, etiam tres vncias mellis admiscere, & ad tertiam decoquere partem, & exinde singulos dare cyathos bibendos. Sic enim cor.

l.ij.

CÆLII ACVT. MOR B.

poris seruabimus vires, vsq; ad cibi tempus. Aliquando etiam pyra concoquenda duracina, quæ crustumina vocant, vel cydonia mala: cum nondum audemus quicquam de vino dando tentare his vtemur, quæ leniora proculdubio probantur. Erit enim suaue, atq; stomachum reficiens, & constringens supra dictum mulsum, tunc cū cibandi tempus venerit, quod plurima cum cautione erit apprehendendum. siquidem plerisque ex initio accessionis febrium sudores concurrāt. plerisque etiam in statu, aut declinatione. Cum itaque inhumectum atque siccum fuerit corpus, erit præcurandum vnctione olei frigidi, lentiscini, aut hispani, ora etiā fouenda aqua frigida ex spongia, singulis partibus attrectatione. Tunc collutione oris aqua frigida dentiū limus detergend⁹. Dandus cibus simplex, sed aliquantulum coagulat⁹, ac frigidus, ne statim sudorem corpori moueat adiectus. Sit autem eius materia panis ex aqua frigida diligenter elutus, vt sui careat difficultate. Itēque oryza & alica ex aqua frigida, vel suauitatis causa quiddam decocti mellis admixtum. Pultes etiam non oleatæ, oua hapala. At si vires minime fuerint reparatæ, febribus declinantibus, vt totius passionis minui magnitudinē demonstrent varius est dandus cibus, vt cum prædictis demus aliquid pomorum, vt pyra duracina, & cætera quæ stringere valent, & vini similitudinem seruant. Sed hæc nunc cocta, nūc sincera dare debemus, mala etiam cydonia atq; ea quæ orbiculata vocāt, & mespila, & paleales vuas vel pensiles, quæ iā dudū fuerint siccatae, & damascena, carnis etiā

quiddā sed neq; indigestibilis, neq; difficilis, neq; pinguis neq; bromosā, sed eius quæ sit & digestionē facilis & corporis densabilis, ac nutritibilis, & sufficiens leuamento fortitudinis extinctæ, vt sunt pulli colūbarum, vel gallinæ pastę, asse, perdoes, attagenes: quorū omnium pectora magis offerenda, & horū interius, cocta ac tenuiter accurata ex oleo & aqua, & anetho, & sale. Facile enim corrumpunt curiosæ, atq; grauabilis condituræ. Item si friabilis fuerit caro assata, tanquā cornea efficitur. Quapropter si quisq; delectatiōe affectus accurari voluerit, erit primo coquenda, tunc assanda. dandi etiam porcini pedes, ora, auriculæ, & summitates articulorum: dandum etiā cerebrum & vulua. dehinc hœdina caro, vel mollium caprearum, vel syluestrium caprarum, aut aprorum clunes, quas Græci *ψόιας* vocant. Itē ex mari mullos, squillas, banchos, acus, labraces. At si fastidiosi fuerint ægrotantes, damus spōdylos & cōchylia, buccina, peloridas. Si hæc omnia fastidio erunt, dabimus ostrea, & echinos. Itē olerum intuba, plantaginem, asparagos. si neque ita vires surrexerint tanq̃ in cōtinuationē humaniorē indulgentiam pro dedignatione passionis accipiētes, ad vini dationē descēdimus, quod ita summū generaliter probamus, vt albū, atq; non confusum, & subausterū & mediij temporis eligamus, qualia sæpe ita vina probantur, quæ surentina dicuntur, vel falerna, & tripolina, vel albana quæ in Italia nata probantur. Item græca, chia, & lesbia. At si febres tenuerint corpus, leuiora, atque tenuiora offerenda erunt vina, vt sunt in Italia sabina, & tyburtina, & gentiliter

CÆLII ACVT. MORB.

Surrentina appellata, vel in Asia trifolina. At si febres nihil obstiterint, erit melius surrentinū, vel trifolinum, atque albanum. Si vehementer corpus in solutionem disijci viderimus, ex frigido torpore vexari sine vlla febricula, dabimus nutritiora, ac firmitiora vina, vt setinū, & falernum. sunt enim hæc efficacia & quæ facilius omnia quæ de vino speramus, accelerent, sufficientia fortificare, & totam releuare habitudinē corporis. Omni etiā parti atq; particulæ sese inferre, & per omnes tenuas vias celeri potu percurrere. Alia quoque nutrimenta secum trahere, & inducta corporibus insinuare. Sed hæc cum primum dantur medio cibo sunt offerenda cum alica, vel quolibet simili suco. Aquata etiam atque parua moderatione temperanda, vel certe cum pane dissoluto atque infuso danda. Dehinc paulo plus ac mediocriter mixta cum aqua frigida, ac recenti, vel niuium liquore. Conijciendū etiam vt mediocriter cibum demus, sed per interualla frequentius, præsentientes iam fuisse digesta prædata: quapropter melius erit paulatim atque frequenter offerre, quàm semel ægrū nutriendo grauare. Multi etenim largioribus cibis oppressi, refracti sūt potius quàm resumpti. Nā sicut parua scintilla plurima coacervatione lignorum opprimitur, vel lucernæ flammā accersens, olei multa infusione frustratur, parua autem adiectione, atque sumptione recrescit, & rursum ardescit. Non aliter corporis virtus insupra ex immodicis nutrimentis oppressa mortis dabit effectum. Signa autem detrahendī vī

ni hæc sunt. Primo torpor atque stupor corporis infractus, pulsus erectior, sudoris quoque fluxus primo non frigidus, dehinc abstinetur somnus insequens, & ad omnia quæq; facilis ægrotantis accessio. Tunc denique oportet non densè atque semel vinum detrahere, sed paulatim subducere, & magis si febres nullæ fuerint reperiæ. At si post sudoris abstinentioniam, febrium fuerint accessiones subsequutæ, & ægrotantes sufficienter resumptos senserimus, omnino vinum extemplo detrahim⁹. Sin vero adhuc imbecillos viribus viderimus, dabimus vinum moderatione cautissima. At si forte cibum reiectauerint, debilitate stomachi concurrente, constrictivis medicaminibus utemur, non solum anterioribus partibus, sed etiam posterioribus pectoris apponentes, addita articulorum ligatione, & appositione cucurbitæ, multa flamma subiecta, quæ infligenda erit ori ventris, atque interdum à tergo, nunc ante cibum, nunc post cibum. Qui quidem frequenter ac pene continue erit offerendus. At si in toto non tenuerint cum vino accipientes, tunc ex aceto dabimus quicquam. Si neque ita, rursus ex aqua tentabimus dare. plerique enim ex vino atque aceto sumentes, cum accepta non tenuissent, aqua coniuncta magis cibos tenuerunt. In his vero qui fastidio vexantur, erit tentandum ciborum varietate pugnare. Solent enim veluti tentandi pulmenti causa ex multis parua sumendo vnam facere cibi sumptionem. Affectanda etiam odoramenti resumptio erit, vel nutritivum cataplasmatum atque in-

CÆLII ACVT. MORB.

ductionum appositio. At si omnis spes fuerit absumpta, erit per clysterem cibus iniiciendus, sed neq; ptisanæ, aut cuiusq; labilis qualitatis, quod facile lubrica faciat intestina. Est enim hoc perniciosissimū in cardiacis, quippe fastidio attestante ventris fluorem commouere. Quapropter erūt hæc ex lenticula adhibenda, & primo paruissima. Tunc vino cū aqua panis attritus & expressus, sic enim corpori fiet additio, atq; vires resurgūt, & stomachus iam dudū supinus fortificatur. Altiora constringētur. At si omnes partes fuerint solutione laxatæ, similiter hæc omnib⁹ sunt adhibenda, in illis etiā quæ occulta diaphoresi contabescunt. Differentia etenim accidentiū mutata videtur: genus autem passionis idem manet. Dehinc si profectus quisq; fuerit supra dictorum adiutoriorū, erit implēda resumptio vsq; ad perfectionē desideratā, sed tunc à lauacro temperandum, aut multo tardius adhibendū. At si febres perseuerauerint, vt in marcorē venire ægritudo imeditetur, quē Græci marasmon vocant, ad eius curationem descendemus, sicuti libris de febrib⁹ scribentes docebimus. Hæc est secundū Soranū cardiacorum methodica curatio.

Quomodo aliarū sectarū principes cardiacos curauerint.

Cap. XXXVIII.



Ntiquorū plurimi cardiacorū curationē tacuerūt, aliqui vero mēorasuerūt, vt Serapiōis, atq; Heraclidis sectatores, & quidā Herophili, itē Asclepiades & Themison paruissime quidem, at iisdem deceptionibus implicati, phlebotomāt enim, & clysteres adhibēt acerrī,

mos, & ob calefaciendū articulorū frigus pannos applicant calidos, & lanas oleo infusas, ac sulfure fumigatas. Terunt etiam oleo veteri ac sycionio cum pipere sulfur & cachry & ammoniaci guttam, & lasericum cū bulbis. Cataplasmant præterea ex lasere & bulbis, symplesmatibus vtētes, quæ nos aspergines dixerimus, item & calce cum pipere, cibis acribus vtentes, atq; edacibus: alij salsamēto, & lasere, & per totum diem atq; noctem vino vsq; ad ebrietatē replerūt. Alij vero in aquam frigidam ægros deposuerunt. Eudemus Themisonis sectator ait per clysterē aquā frigidam iniiciendam. Sed hæc omnia grauiā, atque execrabilia, & ægrotantibus perniciosa esse perspicimus, etenim phlebotomiam nihil iugulatione differre ratio testatur, quippe cum hæc faciat quæ ipsa nititur passio, mentem disijcere, & corpus in mortem per sudores soluere, ac ad sua primordia reuocare defluxionem, atq; casum virium augere. Quibus deniq; cōmoti eorum successores aiunt esse eos phlebotomādos qui prona ac decliues in cardiacam sint passionem. Nō aduertētes, quia ipsa quoq; in passionem prona decliuitas nulla re alia corpus affici quā solutione testatur. Clysteres etiam adhibentes corpora resoluunt, & ob acrimoniam aperiunt, quos vtiles probauerunt. Sed aiunt coaceruatam atq; celerem per superficiem corporis insumptionem retineri cum ad ventrem, vel intestina fuerint cōuersa fluentia. Hoc quidem si more mechanico, ac simili miraculo se facere posse promittunt, vt aperientes ventris interiora, superficiem corporis claudant, erit credibile quod promittunt. Sin

vero, vt in omnibus videmus, superficiem fluens
 tia augeri potius q̃ minui interiorum fluxu, de-
 bilitate crescente cognoscunt, contrarius procul-
 dubio clysteris vsus accipitur, atq; fluentium re-
 laxator. Dehinc consequens non est, imò etiam
 incongruum iudicandum articulos igneis medi-
 caminibus confricare, vt ex alto ad semet ma-
 teriam ducāt: iniicere quoq; intestinis acriora, vt
 illuc concurrens ex articulis materia, atq; ex om-
 ni corporis superficie attrahatur rursum ad altio-
 ra corporis conducta, similis erroris esse proba-
 tur. Est igitur melius propria viarum ac natura
 spiramenta seruare, & non infracta corporis for-
 titudine, acutiori atque celeri solutioni corpus
 aptare, feruentia vero & ignea & vrentia ad visa-
 mentis simplicia, quæ appellāt phantasiā, sunt
 frigori atq; torpori congrua. Ad virtutem tamē
 incōgrua, est enim solutioni accidēs atq; comes
 corporis frigid⁹ torpor, qui feruentibus rebus au-
 cta passiōe necessario duplicet. Ieruiūt enī domi-
 nātibus appēdentia. dehinc acria, siquidē nō sint
 mitigatiua, celeritatē passionū acutiorē faciunt
 adiuuādo. Prohibemus iniectionē aquæ frigidæ,
 siquidē celerrime calefacta interiorū feruore ad-
 luuet solutionē, faciat etiā delectatione quadā vē-
 tris officiū prouocari. Nō aliter & in aquā frigī-
 dā deponēdos phibemus ægrotos, nō enim ma-
 net lenis atq; mitis cōstrictio. Itē ex sinapi cata-
 plasma phibemus, siquidē sit recorporatiuæ vir-
 tutis, quā gręci μετασύγκρισσι vocāt, cū passio
 atq; eius celeritas mitē demōstret atq; exigit cu-
 rationē. Pręterea sinapisimi acrimonia hortationē
 fieri sudorū, nemo est qui nesciat. Sicut enī semp

Iachrymā cōmouet oculorū actioris humectatio collitiij,nō aliter supradicta cōtingunt. Itē bulborū putamina molliūt,nō cōstringūt. Illa vero quę eorū corpulēta vidētur,recorporatiuę virtutis esse noscūtur. Reprobamus etiā aspergines ex calce atq; fēcibus,& pipere. Hęc enī singula corp⁹ incēdūt,& in ignis vicē suburūt, & superficiem corporis vulnerāt:quo fiet vt sæpe trāsitrū faciant in grauissimos tumores. Nō sunt hęc deniq; ex genere miriū adiutoriorū. Est etiā iners alliū dare atq; laser,& salsamēta,vel cōmuniter actiores cibos:sunt enī digestionē in vētre difficiles,atq; in spiratione corporū tardi,& inflāt. Hęc nūc cōtēter omnib⁹ respōdēda. Etenim Tarētinus Heraclides phlebotomat atq; clysterizat,& calidis,& laxatiuis vtitur cataplasmatibus. Nūc quomodo Asclepiadem adhuc quidam rectē loquutū accipiant,& ea quę posuit principalia,retractemus.

Vtrum rectē Asclepiades cardiacos curauerit. Cap. XXXIX.



Hic quoq; secūdo libro celerū,vel acutarū passionū prouidēs ne qua sit in corpore cruditas, clysteres adhibet operātissimos,ob trāsuerسیونē faciendā. Primo nesci⁹ quæ sit opans in cardiacis causa,& tāq; Herophil⁹ sectator indigestionē,atq; corruptionē intuendā existimās. Secūdo ignarus quia post antecedentē diē esse in corporib⁹ indigestio potest. At vero cardiacorū passio frequēter quinta,vel sexta diē emergere perspicit. Tertio est grauis,atq; noxia clysteris iniectio,nō solū solutione laborātibus celeri, sed etiā in strictura affectis. siquidem cōmoueat atq;

CÆLII ACVT. MORB.

turborem corporis efficiat, quando fuerit operosior ac frequens, vt Asclepiades iubet. in diaphoreticis vero interfici liuor esse probatur. Ipse denique Asclepiades de peripneumonicis scribens confitetur noxios esse clysteres, dicens: clysterū genus non in peripneumonicis solum noxium, sed in omnibus etiam sine febre passionibus insidiosum, atq; vexabile corporum, eorum vsum iudicamus. Item specialiter indicans iniectionum vexatione eas corporum solutiones augeri, atque iactationes, & sitim vehementem. siquidem sint inquit, virium captrices. item clysterum vexationem etiam in pleuriticis demonstrauit. Similiter & in phreniticis tanquam interfectricem metuit ventris turbatam solutionem, quorum debuit memor neq; in cardiacis clysteres adhibere. Alios enim plurima stercoreum grauatiōe oppressos, & propterea sudātes salutare est releuare clystere ad mentis alienitatem detrahendam, sed hoc simplici atq; miti vſu clysteris, quos ita affectos nō dicimus esse cardiacos. Item post iniectionē adhibet cataplasma sinistrę mamillę constrictiue virtutis, sed corpus ob excludēdum frigidum torporem calefaciēdum probat vnctionibus olei veteris, ac defricandum manibus calidis, & panis circumtegenda loca, ex quibus calefactiones atque vnctiones superioribus dictis excludendas asseruimus. Constrictiua vero cataplasmata non solū sinistrę mamillę erunt apponenda, sed omni pectori, atq; præcordijs. Erat autem Asclepiadi consonans approbanti tumorem in corde constitutum, similiter laxatiua cataplasmata eidem adhibere, dehinc est incongruum, atq; non conse-

quens affectare per clysterem è corde aliquid trahere, & constrictiuis cataplasmatibus è superficie corporis materiam ad id quod patitur reuocare, vt stricturam quam esse in tumore cordis aduerterat, duplicare videatur. iubet etiam dari vinum noctibus, diurnis, atq; iugiter, sed id vinum cui salem miscuerimus, & appellauit tethalassomenon. Cito enī inquit currit, ac labit, & ad omnia corporis membra perueniet. Cibus dat beatam cū lenticula, & appellauit seutlophacen, vel lenticulā cum ptisana, aut oryza, aut alica vel aliqua ex maritimis, & quid vltra inquit? ea nos dare conuenit, quæ ægri fuerint voluntati gratissima. Probat autem vinum dandum post cibum: siquidē solum facile penetret ac pertranseat corpora, non aliter q̄ si sine vlla fæce per liquatoria fundatur, quorum cavernæ, nullis obstantibus, facile accipiunt, atq; reddunt accepta. At si post cibum (inquit) datum fuerit, manebit: non aliter q̄ si cum fæce, vt supra dictū est, in liquatoria fundatur. iubet etiam meracum mixtum dari. Hac enī ratione (inquit) exustæ viæ tanq̄ ex igni conductæ sudorem retinendo constringunt. Est nunc iners & inertiae plenum tota die atq; nocte vinū dare, & cibo nutrire. Plurima enim adiectioe nutrimenti vires opprimi necesse est. Item ptisana ventrem commouet, in fluorem lapsum, suæ faciē qualitatis: contraria deniq; lenticulæ qualitati probatur. Vinum quoq; incongruum, atque intemporale, & immodicum probatur. Incongruum, siquidem sit salsum, quod appellauit tethalassomenon, & propterea ventrem soluat, & ex omni corporis parte vires deponat, sit præterea

CÆLII ACVT.MORB.

inflabile, atq; virium vexabile non solum ægro-
tātibus, sed etiā sanis hoībus. Forsitan hoc & fer-
uens dederit. Tacuit enim frigidum dādum, cul-
pans deniq; libris, quos de lue conscripsit, Cleo-
phanti sectatores vinum frigidum dātes. Immo-
dicum diximus, siquidem plurimum det atque
extentum, & meracum temperamento quērit,
cum etiam sanī quanto plus biberimus, tanto
plurimum sudoris effundimus. Intemporaliter
autem: siquidem ante declinationem dandum
iussit. Est præterea ridiculum, quòd post cibum
dandum vinum propterea dicat, ne citius curans
corpora pertranseat, probans econtrario falsum
dandum quo citius corpora penetret, ac suos ef-
fectus exhibeat. Hic est ille Asclepiades frigi-
dans, atque calefaciens, exantians atque re-
plens, & contrarijs semper vtens rebus, in his
passionibus.

Vtrum rectē Themison cardiacos curauerit.

Caput XL.

Themison vero quædam rectē dixit
se perspicitur ob cardiacorum cura-
tionem, quædam prauē. vino nan-
que cum amylo trito cum bulbis
& ammoniaci gutta cū vino & o-
ui albore & pipere trito cum sinapī corpora de-
fricanda existimat. Dat etiam cibo alleum cum
pipere, dehinc in scaphulam deponi iubet ægro-
tantes, quæ sit aqua plena calida. Item post cibū
adhibet gestationem, siquidē sint, inquit, imbecil-
la, ac debilia nimium corporis officia, & indige-
ant hoc adiutorio, quo parti etiam caro commo-
ueatur, sed promota substātia, hoc est spiritu, hoc

est nutrimento, ex quibus concreta perspicitur. Quæ omnia facere valet gestatio, omni corpori suffundens materiam. Mox deniq; inquit alleuatos, atq; magnitudinem accipientes pulsus inuenimus. Sed hæc Asclepiadis nullis sunt adiungenda. demonstraui enim feruentium medicaminum fricamenta esse necessario noxia, & sinapi. Tentat etiam inflabiles cibos, & quanquã hæc sint omnibus celeribus atq; acutis passionibus inimica, multo tamen vehementius cardiacis. Gestatio vero & incongrua & intemporalis esse probatur. Incongrua inq, siquidem sit laxatiua, omnis etenim motus viarum efficit raritatẽ. Intemporalis autem, siquidem post cibum fieri iubeatur. Etenim si sanos post cibum vexat motio, non permittens naturæ quadam requie ac tacito motu ad suos effectus accepta perducere, quid sperare de ægris ac solutione laborantibus poterimus? Pulsus vero post gestationem erigitur cardiacorum, nõ ob resumptionẽ virium, sed ob turbationem corporis motu conceptam, ex qua magis adiuuari passionem dissolutione corporis iudicamus. Hic ratio celerum cum febricula passionũ curationis terminatur. Nunc transfundendum ad eos qui sine febribus esse noscuntur.

Libri Secundi finis.

CAPITA LIBRI TERTII.

- De synanche. Cap. I.
Quæ consequantur synanchicos. Cap. II.
Quomodo curandi sunt synanchici. Cap. III.
Quomodo synanchicos aliarum sectarum principes curauerunt. Cap. IIII.
De apoplexia. Cap. V.
De conductione quam græci spasmon vocant, & distentione quam tetanon appellant, & earum speciebus. Cap. VI.
Quomodo discernim⁹ raptum quem græci spasmon vocant à tremore atq; saltu. Cap. VII.
De curatione. Cap. VIII.
De hydrophobia. Cap. IX.
Quæ est diffinitio siue agnitio hydrophobiæ. Caput. X.
Quæ sequuntur eos qui in hydrophobicâ passionem proni ac decliues esse videntur. Cap. XI.
Quæ sunt similia hydrophobiæ & quomodo internoscantur. Cap. XII.
Vtrum ne animæ an corporis passio sit hydrophobia. Cap. XIII.
Quis locus in hydrophobicis patiatur. Cap. XIII.
Vtrum noua passio sit hydrophobia. Cap. XV.
Quomodo curandæ sūt hydrophobiæ. Cap. XVI.
De acuto tormento quod græci ileon vocant. Caput. XVII.
De satyriasi. Cap. XVIII.
De cholericis. Cap. XIX.
Quæ sequuntur eos qui colerica passione afficiuntur. Cap. XX.
Quomodo curandi sunt colerici. Cap. XXI.
De defluxione, græci diarrhoeā vocant, Cap. XXII.

CAELII AVRELII NI METHODICI SICCEN-

sis Oxeon Liber Tertius:

De Synanche.

Caput I.



Elerum cū febricula pas-
sionum curationem præ-
scriptis tradidim⁹ libris;
nunc autem earum quæ
sine febribus esse noscun-
tur ordinabim⁹, quo cun-
ctarum perfecta distinctio
cōpleatur. initium namq;
à synanchica passione su-

mem⁹, quæ nomē à suspēdij similitudine habet
q̃ non aliter q̃ laqueus præfocans interficiat, nā
græci Anchonas suspendia vocauerūt: siue quòd
spirītū continendo spīrationē neget, græci enim
συνέχειν continere appellāt. Alij vero etiam Cy-
nanchen, vel lycanchen hanc passionem vocaue-
runt, siquidem frequenter hæc animalia afficit.
Nam canes cynas, lupos lycos vocauerunt, quo-
rum quoq; similes voces siue vlulatus in synan-
chica passione constituti, cum præfocari cœpe-
rint, emittunt. Synanches igitur alia est sine ma-
nifesto indicio, alia cum visibili atq; manifesto:
& alia intra oris spatium, alia exterius, alia ex
vtroque hoc, exteriori atque interiori: parte dex-
tra vel sinistra, aut in vtraque, denique quidam
specialem discretionem etiam nominibus posue-
runt, vt Valens physicus libro tertio curationū.
Eam igitur quæ sine manifesto tumore est, sine
nomine reliquerunt. Eam vero quæ cum mani-

CÆ LII A C V T. M O R B.

festo, si in vtraq; (aiunt) parte interiorū fuerit, cy-
 nanchen vocandam, siquidem faciat difficultatē
 spirationis, atq; oculorum prominentiam, & lin-
 guam procidentem tanquam canibus auidis sæ-
 pe contingit, cū ea quæ minime transuorare pos-
 sunt, admonente natura auiditate impauida mi-
 nas contemnentes inuadunt, quæ sæpe faucibus
 inhærentia atq; ancipiti retentione tardata, neq;
 percipere, neq; reddere valuerūt. Eā vero, quæ in
 altera fuerit parte, paracynāchen vocauerūt. Itē
 in exterioribus, atq; vtraq; parte tumore consti-
 tuto hyanchen appellauerūt, siquidē suum colla-
 his sēpissime inflationibus afficiantur, quos græ-
 ce hyas appellāt. At si interius atq; exteri⁹ & in
 vtraq; parte fuerit tumor, tunc proprio nomine
 synāchen memorant nūcupandā. At si in altera
 fuerit parte, parasynanchen. Nihil autem refert
 speciales differētias proprietate nominum sepa-
 rare. Antecedentes causæ quibus hæc sufficitur
 passio aliquę sunt occultę, aliquę manifestę, atq;
 cæteris quoque communes passionibus, maxime
 tamen conabiles atq; laboriosi vomitus, plus eti-
 am si post cibum iam corruptum: Item vinolen-
 tia, vel niuis potatio, aut exclamatio vehemens,
 atq; eodem modo perseuerans, quam græci mo-
 notonon vocant. Item Catarrhus & actiores ci-
 bi præter consuetudinem accepti, item feruētia,
 atque ignita medicamina pota, vel purgatio per
 helleborum prouocata, quibusdam etiam foemi-
 nis menstrualis retentio purgationis. Afficiuntur
 autem hac passione magis viri quàm mulieres,
 quorū plus ætatis mediæ & iuuenes, quàm pue-
 ri atque senes. Hanc diffiniens Asclepiades pas-

flonem secundo libro explanatorio aphorismorum Hippocratis synanche, inquit, est humoris fluor, siue humectatio faucium, vel summitatis ipsarum sæpiissime ex capite accidens, sed hoc peccanter diffiniūt. Omnis enim humoris fluor quē rheumatismum vocant, multi liquoris est lapsus, siue egestio. In synanchicis verò tumor videtur, & non, vt supra diximus; humoris plurimi egestiōes, nisi hoc aliquādo ex pressura venerit. Nos vero iuxta Sorani sententiam synanchen dicimus difficultatem transuorandi, atque præfocationem acutam ob vehementiam tumoris faucium, siue in locis quibus nutrimenta transuorauimus. Adiecta est autem transuorandi difficultati præfocatio celerissima, siue acuta, ad discretionem tumoris tonsillarum siue vuæ. Vbi enim synanche fuerit, etiam tumor necessario locorum superdictorum consequetur, sed non illico, vbi tumor fuerit eorundem, etiam synanche nuncupatur. siquidē qui mediocri difficultate fuerint transuorandi impediti, nondum synanchici videntur. Hæc enim in magno tumore passio intelligitur habere substantiam. Item ad discretionem præfocationis illatæ per laqueum. Est enim ipsa quoque acutissima, atque celerissima præfocatio, sed non ex tumore descendens.

Quæ consequantur synanchicos. Cap. II.



Equitur autem eos qui iam passione tentantur querela sine vlla ratione, atq; difficilis motus colli, & gutturis. Item saliuatio plurima præter tumorem, & subdolens faucium sensus, cum asperitate sensibili. Itē difficultas trans-

CÆLII ACVT. MORB.

uorandi liquoris soliti saliuarū more collecti, tūc spirationis velut impedimentum tanq̃ obstantis crassioris humoris. Surgente vero ac crescēte passione sic vt manifesto tumore fuerit rubēs facta, videbitur tumor faucium, atque vuę, & supra linguam partium, & summitatis gutturis, cum difficultate transuorationis omniū acceptorū. Præfocatio etiam pro tumoris modo, spirationis difficultas, & nausearum prouocatio. Dehinc siccatensio si quis os ægrotantis aperuerit, & digito linguam oppresserit, inuenitur. Crescēte vehemētius passione, omnium tumor efficitur, colli atq; vultus, & humoris crassioris, ac saliuarum fluor, oculi prominentes, sanguinolēti, & venarum extensio. At si peius increuerit, linguæ vltra dentes ad exteriora prolapsio, ariditas siue siccitas faucium, articulorum gelidus torpor, pulsus celer, densus, iacēdi difficultas, & magis in supino schemate, vel in latere, frequēs etiam sedendi cupiditas, item loquutio non articulata, sed confusa, atque cum dolore. At si in exitium passio cœperit ferri, liuor vult⁹, vocis amputatio, gutturis atq; pectoris stridor, & recursio, siue recursus poti liquoris, pulsus defectio, quā græci ἀσφυγμία vocāt, & quibusdā caninus vocis sonit⁹, quibusdā oris spumatio. Tūc etiā necessario mortis effectus. At si sine manifesto tumore fuerit passio, sequit̃ colloꝝ tenuitas, cū extentione atq; subrectione inflexibili. Itē vult⁹, oculorū cauitas, frontis extētio, color plūbeus, spirationis difficultas plurima, nullo, vt supra dixim⁹, manifesto tumore, siue inflatione aliqua apparēte, neq; in externis partibus, hebetudo plurima, atq; imbecillitas ægrotantis,

& celerrimus, vel acutus cū præfocatione mortis effectus. At si circū colla se ignis acer infuderit, siue in pectore apparuerit, & fuerit perseverans, frequētissime bonū portēdit, siquidē ascensus tumoris ex alto ad superficiē venire videatur. At si sine vlla ratione adiutorij cuiusq̃ medicinalis beneficij repente nō apparet, salutē negabit. descēsus enim à superficie corporis ad altiora monstratur. At si forte nō secūdo irruens, vel ex alto acceptus ad superficiē fuerit ignis acer, sed antecedens passionē, aut eidē cōcurrens, omnia mala significat. Humor autē plurimus, siue saliuarum fluor in crassitudinē coactus si in statu apparuerit, mala ostēdit. Post statum vero passionis, salutaria pollicetur. Aliās enim plurimā præfocationē significat, aliās corporis laxamentū, in quibusdam etiā tantū tumor increscit, vt stricturā faciat in faucibus atq; gutture, & mento. Est autem passio stricturæ acuta, atq; celeris, & vehemēs, & sæpissime continua, aliquando intercapedinata.

Quomodo curandi sunt synanchici.

Caput III.



Portet in passione cōstitutos, iacere loco lucido, atq; moderatæ amplitudinis, nullo etiā odore corrupto, calido. Est huiusmodi laxatiuus aer, & qui primus tumētibus partibus misceatur, iacendi schema esse supinū cōuenit, paulo leuatius capite collocato, firma atq; immobili positiōe, vel qua se magis releuari ægrotantes dixerint. Omnis enī motus dolidus est tumore oppressis. Ianis etiā mundis ac mollibus & nō infectis, dulci atq; calido oleo ifusis colla protegēda

CÆLII ACVT. MORB.

cū thorace, adhibita articulorū blāda fricatione. Trāsmittitur enim naturalis vaporis laxamētū, etiā ad illas partes quæ patiūtur. Adhibēda quoq; requies & abstinētia vsq; ad primā diatriron cū gargarismate laxatiuo, cuius species siue materias paulo pōst subijciemus. Adhibēda etiā formētatio olei dulcis calidi, & apponendæ exterioribus partibus vesicæ oleo dulci calido semiple:næ. Adhibenda etiā phlebotomia si vehementer passio coegerit, intra diatriron. Etenim indiget repentina sanguinis detractiōe, ob celerrimū laxamentū. Si autem minus necessitas impulerit, in ipsa diatriron, vel durantibus viribus etiam post ipsam phlebotomiā poterit adhiberi, si tunc necessitas emerferit faciendi. Cuius facti rationē de specialibus adiutorijs scribentes docebimus. Igitur itra diatriron phlebotomato erit post detractiōem sanguinis caput fouendum, atq; colum oleo calido, & ex eodem auribus quiddam immittendum, tunc gargarizandum. Potum dabimus aquam calidam, vel mulsū, & non coaceruatim, sed paulatim, ne transuoratione graui ac percussu tumentia indignentur. At si in ipsa diatriron flebotomiā adhibuerimus, oportet post detractiōem factam circū vngere corpus ægrotātis oleo dulci, atq; calido, & faciē aqua calida mediocriter fouere. Tūc sorbilē cibum dare, sed omnino tenuē, vel fluidum, vel panē ex mulso tinctū. At si transuoratio fuerit difficilis, qua obistente nō percipiāt ægrotātes accepta, erit sufficiens viribus fulciendis mulsū guttatim faucibus infusum, perseuerandū etiā vsq; ad declinatīōē passionis in alterna dierū cibi resectiōe. Cō

uenit præterea post phlebotomiam sequentibus diebus cataplasmatibus uti, quæ circum colla erunt extrinsecus apponenda, miti tamen simplicitate confecta, ut est panis calidus ex aqua & oleo, vel mulso diligenter emollitus, vel pollines tritici, aut hordei, aut seminis lini, aut foenugræci. Singula hæc siue commixta ex calida & oleo & melle, vel aqua in qua fuerit hibisci radix, aut cōtrita & admixta. mutāda præterea frequētius erūt hæc cataplasmata, ne p̄seueratiōe sui corrupta corporis exhalatiōe in acorē veniāt. erūt etiā calefaciēda, quo tardi⁹ maneāt euaporata, positis extrinsec⁹ saccellis ex cātastro aq̄ cocto cōfectis, vel vesicis calida & oleo semiplenis. Cōuenit etiā spōgiarū vaporatio, expressarum ex aqua calida, aut admixto oleo, vel decoctione mitium materialium laxatiuæ virtutis. Apponendæ quoq; spōgiæ collo atq; gutturi, & his partibus quæ haustū negāt, vel ori & naribus, iubendus æger apto ore ad semet vaporē rapere. Descēdētes enī ad altiora haustu raptæ vaporationes tumorē relaxāt. sūt etiā gargarismata cōgrua cataplasmatib⁹ ut oleū dulce est, atq; calidū, vel calida & oleū, tūc mulsū aquatū, & decoctū, & lac singulare, siue cū melle, aut aqua admixtū, ut oīa detergātur, quæ forte lactistactu fuerāt derelicta, ne remanētia feruore locorū in acorē veniāt. Itē vt edū decoctiōe cantabri atq; glycyriæ, vel lini seminis, ac foenugræci, sed nusq; ad crassitudinē succi decoctiōe ob viscosā tenacitatē humorū fluori cōnexa difficultatē faciāt spiratiōis. Tūc etiā decoctiōe hibisci, vel maluæ agrestis, aut myxarum syraram, aut musci herbæ atq; palmularum pinguium, vel fici

m.iiij.

CÆ L I I A C V T . M O R B .

succulenti. Item succo halicæ aut ptisanæ. At si passio cœperit declinare, cōuenit etiā cybariticū & creticū passum. Ea vero quæ sunt leuiter strīngentia quæ appellant stymmata, nunc incōgrua iudicamus. His enim vtemur quoties initia fuerint passiōis, leuib⁹ adhuc querelis affecto ægro tante, aut dolore leui in faucibus, vel vua. Tunc enim etiā Thessalus adhibendā poscā iudicauit, siquidē pronos atq; in passionē synanchicā declines, nec dum tamen patiētes vocauerit. Utendū deniq; nō solū posca, sed etiā decoctiōe leuiter cōstrigētū materiārū, vt rosarū, palmularū thebaicarū, lēticulę, myrti, lētisci, mastichis, quæ singula erunt in mulso decoquenda, vel quolibet ex supradictis succo, quoties viderimus constrictiuam virtutē admixtione laxatiui liquoris esse frangēdā. facit etiā oryzæ succus, atq; diacodion medicamen mulso resolutū, ac sæpe substātia seruata faucibus illitū. Nō aliter etiā quod diamoron appellatur, & dioporon, & dyamyrthinon, siue Andronios, & Polyidæ sphragis, & Anthera cū melle, & omne medicamē quod confectū sit ex malo cotoneo, aut punico, vel rosæ floribus, vel mali punici cortice, siue galla, vel omphacio aut lycio, & his similib⁹, sed in augmēto passiōe cōstituta illis vtemur, q̄ supradūdū memorauim⁹. humore p̄terea ex feruore nutritū, si glutinosum viderimus factū, tāq; in oculis supnatātē, spōgia calida deterginus, sin vero in alto fuerit cōstitutus, dypyrēnā imissa p̄fecto eius capite lana molli, ac lipida. Etenī si remāserit, p̄focationē magis accelerat. At si nimīū altiora tenuerit, vt videri non possit, erit tenuādus, dādo mulsū, sed p̄coctū. Est enī

efficacioris virtutis, quā si non fuerit coctum. Quidam etiam ptisanam dederunt paruo sale admixto. sed sunt fugienda quæ usque ad sensum veniunt mordicationis: siquidem tumoribus prouocatis fluor quoque humorum crassescat. At si venter officium non agnouerit, etiā clystere vtemur, iniiciētes aquam calidam cum oleo, nunc solam, nunc admixto melle. Etenim surgens ex isto liquore vaporatio collaxat tumentia, & egestus venter facilia facit spiramenta, non solum synarchicis, sed etiam sanis hominibus. Manens enim alienitas grauat, atque oppressione quadam acerrimas facit corporis exhalationes, quibus tumentia prouocentur, caput impleatur. Sed post clysteris usum erunt etiam cucurbitæ cum scarificatione apponendæ, dimissionis tempore. At si continuatio fuerit, initio lucis, quo tempore etiā cæteris districtiuis adiutoriis vti cōducit. Apponendæ alię igitur collo tenus, vel gutturi quę loca anthereona Græci vocauerūt. Item ceruicis siue neruis maioribus quos tenontas appellant. Itē singulas ex utraque parte sub auriū lacunis, quibus in locis etiam faucium positio esse perspicitur. At si passio perseverarit, & æger ad perfectam curationem fuerit mollis, ut ferri cuspide metu se contingi prohibeat, sanguisugas, quas Græci βδέλλας appellant apponemus iisdem locis, quæ supra memorauimus. Tunc post earū casum si minime factam sanguinis detractionē viderimus, cucurbitas apponemus, ut præfecta sanguisugarū vulneratione raptu cucurbitæ detractio compleatur, & olei fomēto vtemur, atque cataplasmatibus consequentibus & vaporatiōni

CÆLII ACVT. MOR.

bus, dehinc epithematib⁹ oleo calido infusis, tūc superpositis spongijs ex eadem materia expressis vaporamus. Etenim saccellorum ficcā vaporationem tanq̃ densabilem reprobamus. At si maior fuerit tumor ipsam quoque linguam scarificamus, atq; fauces & palatum tenui ac lōgio re phlebotomo. etenī locali sanguinis detractiōne tumentia relaxātur. Tūc post scarificationē mitibus gargarismatibus vtemur. Si declinare passio cōeperit, etiam subunctionibus faucium, vel interiorum vtemur, vt melle decocto, vel medicamine confecto decoctione agrestis maluæ, & fœnugræci seminis, & lini cum amylo & melle, & oleo vel vuæ passæ medio proiecto, ac secreto semine contritis cum pane vel decoctione lini seminis, vel melle & passio cretico quibus incocta sit radix agrestis maluæ, vel alicæ, atq; lini seminis pollines. At si passio perseverauerit, secundo vel tertio scarificationem adhibemus, nō solum gutturi, vel tonsillarum vicinitati, quam Græci anthœona vocant, & nervis maiorib⁹ ceruices quos tenontas appellant, sed etiā occipitio & palis, & interscapulæ, quod Græci metaphrēnon vocant, & pectori. Etenim quanq̃ vehementer loca transuorationis patiantur, cæterę quoq; partes corporis necessario consentiūt. Multi deniq; nō aduertentes rationem reuincendę passionis sola auersione materiæ pugnantes, atq; in liquidis causis ponentes principaliter aiunt inguinibus cucurbitas infigendas tūc præcordijs, tūc supra mammas cum scarificatione, dehinc gutturi atque collo eiūsque partibus. At si declinatio fuerit confirmata, dabimus cibo pultem atq;

qua sorbilia, vel porcinum cerebrū, longē seruātes omne quod fuerit acre, siue immodice appetibile, vel inurens, vel vinosum, vel asperum, aut aridum, vel quod valeat transuorationis loca lacerare, facile etenim passio ex occasione parua recurrit. Apponenda etiā cerotaria ex oleo dulci, aut cyprino, vel glaucino, aut irino confecta, vel malabathrino, cum radice hibisci. Tunc lauacro vtendum ac deinde vino.

Quomodo Synanchicos aliarum sectarum principes curauerunt. Cap. III.



Antiquorū Hippocrates libro quē ad sententias Cnidas conscripsit, ex utroque inquit brachio synanchicos phlebotomari. Sed hoc erit euitandū, siquidem coaceruata sanguinis effusio, animi faciat defectionem, & propterea prohibeat tantum detrahi, quantū sufficiat ad relaxādā strīcturam. Diuidit etiam venas sub lingua constitutas, quod est non solum inutile, verum etiam noxium. siquidem incongrua sit ex locis patientibus sanguinis per venas detractio. Plurima etenim in exitum prouocata materies confluens, necessario completis locis abstenta modum superat detractionis, vt grauatae partes potius aduentu, quā reuatae recessu materiae videātur. Dehinc subleuandarū venarū causa erit. laqueus circūdandus, & tunc maxime, quādo sine vllō manifesto tumore synāchica fuerit passio. Laqueus autem, quod praefocatio ē augeat, nulli dubium est. quinetiā sanguinis fluorem ex supra dictis venis difficile

CÆLII ACVT. MORB.

posse abstineri perspicitur. Neq; enim aliqua cō-
 strictiua adhibere sine vilo periculo poterimus,
 neq; diuisa colligare erit cuiquam possibile. Est
 etiam naturale tumentia loca post diuisuram in
 fluorem sanguinis facile deuenire. vtitur quoque
 gargarismatibus calidis, atq; vaporatib⁹, quo-
 rum materiam non enarrauit. Dehinc caput cor-
 radi, & iugiter vaporari iubet spongijs, tunc cō-
 tegi cerotario, atq; lana. potum dat aquam cali-
 dam, & mulsum, passione declināte succo cibā-
 dos dicit, cuius speciem non enarrauit. Nescius
 etiam quòd in plerisq; declinatio post quinque
 dies, vel sex adueniat, & sit immodica vsque ad
 eius initiū cibi abstinētia. Vaporare verò opor-
 tet, sed nō caput magis q̃ colla atq; gutturis ex-
 ordiū, quod Græci anthereona vocāt. Tūc post
 vaporationem fouere, atq; cerotarium declināte
 passione apponere. Itē neq; potū, q̃tum dandū,
 vel quomodo, vel quando, manifestauit. Præter-
 ea secundo libro de morbis clysterizādos inquit,
 atq; purgatiuis medicaminibus releuandos, quæ
 Græci cathartica vocant, quorum ex acrimonia
 magis tumentia prouocātur. phlebotomari quo-
 que ex locis sub mamilla constitutis, noxiū atq;
 putidum iudicamus. Noxiū, siquidem plurima
 oporteat corpora diuidi, cum neq; facile sub vi-
 sum venæ deuenire possunt. Putidum, siquidem
 sine vlla difficultate ex brachio potuerit sangui-
 nis approbari. detractio. Dehinc iugis atq; coa-
 ceruata materiarum detractio, clysterum & pur-
 gatiuorum medicaminū, & phlebotomiæ, vexa-
 bilis esse perspicitur. Itē si plurima (inquit) præ-
 focatio occurrerit, clysteris auliscum quem nos

tibiam dicere poterimus, faucib⁹ inquit immit-
tendum, incendens hyssopum, sulphur, bitumē,
quorum rapere odorem præcipit ægrotantem,
per eandem fistulam, quorum sine dubio prom-
ptus est error. Nititur enim immittere fistulam
faucibus, quæ neq; aërem tenuissimum percipe-
re possunt vi passionis oppressæ. Dehinc austero
fumo ægros implēdos existimat, quo sæpe etiā
sani præfocatione afficiuntur. Ultimo etiam ex
duobus brachijs atq; venis sub lingua constitutis
sanguinem detrahendum probat, quod supra
damnantes frustrauius. Non enim sine multa
corporis vexatione fiet. Diocles verò libro, quo
de passionibus & causis & curationibus scripsit,
sanguinosos inquit homines ex utroq; brachio
phlebotomandos. Eos autē qui minus sanguinis
habuerint solum scarificandos. Tum felle tauri
cum herba pediculari quā staphida agrian vo-
cāt & nitro & cocco cnidio iugiter inquit vngē-
dos, vtēs etiā gargarismatibus ijsdem. Dat quo-
que sub lingua piper continendum, vaporans
spongijs collū, & cerotarijs contegens, præcipiēs
ægriū tenuandum ultra q̄ fas est. Neq; nūc so-
los phlebotomandos sanguinosos probamus: sed
omnes passione affectos, permittentibus virib⁹:
neq; ex utroq; brachio, vt supra docuimus: neq;
acerrimis vtendum vnguentis, & gargarisma-
tibus, sicut neq; in tumoribus oculorum simili-
bus inunctionibus. Etenim staphisagria etiam
sanos plerunque synanchicos fecit. quum re-
pente inflationem faucium fieri cogit. Dehinc
omnino neq; tenuari deducendo corpus siue ei⁹
habitudinem, cōuenit medicīnæ, sed relaxare tu-

CÆLII ACVT. MORB.

mentia rebus congruis ac remissiuus. Item Praxagoras quarto libro curationum synanchicos clysterizat, & sudoribus puocatis deducit, aliquando etiam phlebotomat, dans quoque medicamentum vomificum, quod emeticon appellant. Tunc vum præcidit, vel aliquando diuidit, & pice lenta vulnera curat, sed horum iudicium ex alijs accipiendum probamus, nam vomitus ingens distentione & præfocatione sæpe peremit. Dehinc tumens vum laxatione indiget, non amputatione, sicut neque alia quoque corporis partes, quæ necessario erunt mitigabiliter relaxandæ. Erasistratus secundo libro anatomicorum de singulis passionibus scripto, in quibusdam inquit synanchicis vaporazione utendum spongiarum, atque cataplasmatibus, & ex vino medicamentum transuorandum quod catapotium appellauit ex castoreo confectum, sed omnia peccante. etenim vinum constringit, castoreum vero acerrimæ esse virtutis nemo negat, quæ indubitater sunt tumori contraria. Herophilus de synanchicis nihil dixit. Asclepiades verò secundo libro celerum vel acutarum passionum inquit, synanchicis conuenit sanguinis detractio atque ventris depurgatio, & cataplasmata & oris collutiones & gargarismata, & superunctiones tenuabiles, atque apertibiles ut sunt ex hyssopo, origano, & thymo, meliloto, absinthio, fici coctione, nitro, staphide agria, centaurea, elaterio, felle taurino, cedria, adiiciens etiam cucurbitæ usum cum scarificatione. Negans quidem quicquam posse sanguinis elicere, siue, inquit, quod cum febribus sit passio, siue quod maior causa sit tumentium partium, quæ contrario raptu

superet cucurbitæ feruorē, & non possit efficere detractiōē. Tum phlebotomiā probat ex frōte faciēdam vel angulis oculorum, vel venis quę sub lingua sūt, vel ē brachio. At si maior (īquit) passio fuerit, diuidendæ sunt fauces, hoc est tonsillæ, & partes supra vuam constitutæ: etenim summa est in his æqualis siue par incisura, quā appellauit homotomiam. Dehinc à veterib⁹ probatam approbat arterię diuisurā ob respirationē faciendam, quam laryngotomiam vocant, varię ac multipliciter peccans. Omne etenim quod acre fuerit atque tenuans incendet humorem. Ipse denique in phreniticam venturos passio-nem multa inquit affici materie, ad hæc eiusedē acrimonia. Est etiam noxia & patientibus locis phlebotomia, sicut supra docuimus. Item clysteribus vtendum ob auertendam materiam, vel auocandam à locis patientibus inconsequēter iubet. Est enim contrarium detractiōi per venas ex patientibus locis faciendæ, quam ipse probauit. Item inordinaliter scarificandum primo, dehinc phlebotomandum iudicauit. Etenim locales detractiōes insidente atque infirmata, & stante passione, adhibendas probamus. Est etiam inexerciti medici ob febrium causam suspicari materiam raptu cucurbitę non elici. In vsu enim videmus sine vllō impedimento in febricitantibus effectū cucurbitæ prouenire, atq;eductam detrahi materiā. Adducitur nāq; caro & spiritus & sanguis. Dehinc neq; crescēte accessiōe cucurbitas isigim⁹ tēpore quo ad altiora materia cōducitur. Est præterea tumētū partiū

CÆLII ACVT. MORB.

molestissima atq; periculosa diuifura. vehementes namque sanguinis effusiones efficit, & quæ prohiberi minimè possint. Si enim easdem constringere voluerimus, celerrima præfocatio cōsequetur. At si abstinere neglexerimus, celerior mortis effectus sanguinis effusio perspicitur: vel si forte sanguinis fluorem effugerit quis, cancrum atq; gangrænā nō effugiet, ob augmenta tumoris. Non enim naturali habitu cōstituta condiuidentur, quanq̃ constrictiue tractata sæpissime tumescere videntes, in tumore constituta cū diuifura fuerint, at si constringendi caruerint facultate, vehementius in tumorem venire desperare poterimus. Nā omnino in tanto tumore, in quo digitorū immissio improba esse perspicitur, atq; cataplasmatum, & anagargarismatū vsus æger atq; difficilis ægrotanti videtur, quomodo nō altiorū diuifura inimica saluti probatur? Est etiā fabulosa arteriæ ob respirationem diuifura, quā laryngotomiam vocant, & quæ à nullo sit antiquorum tradita, sed caduca atq; temeraria Asclepiadis inuentione affirmata. Cui ne nunc occurrentes, latius respondere videamur, aut tantū scelus angusta oratione damnemus, libris quos de adiutorijs sumus scripturi, respondebimus. Themison verò sine febribus passiones rectè curare Asclepiadem probās, huic accusationi subiicitur. Serapion primo libro curationum clysteribus synanchicos euacuat, atq; phlebotomia, & cataplasmatibus, & vnguentis acriorib; vtitur, & prouocatiuis & apertiuīs, quæ anastomatica appellant. præcauet autem in omni abstinentia cibum vel potum dare. sed est etiam hic facile

accusabilis. Etenim acris atq; tenuantia excitare tumorem nemo dubitat, phlebotomia verò adiecta clysteribus vexabilis esse perspicitur. Dehinc dicens materiā nomina, ea ex quib⁹ adiutoria cōficiūtur scribere neglexit, cū nullo alio quolibet adiutorio minus utilis cibatio, atq; potus probentur, arte adhibita, atq; formata. Heraclides Tarētinus tertio libro curationū de internis scribens, eos, inquit, qui sanguinis multitudine vexantur clystere præpurgatos phlebotomamus, nunc ex brachio, nunc ex venis, quæ sub lingua sunt, vaporantibus spongiarū admotis collo atq; gutturi, ex aqua calida, in qua fuerit præcocta ruta, vel pulegium. Tunc cataplasma apponēdo probat quod omen lysin appellam⁹, ex mulso confectū. Cui erit admiscenda chamæpitys, vel iris illyrica, aut ficus. Nocte vero, inquit cerotarium apponendū ex irino oleo, atque resina iusta parte, in cōparationem pōderis cere. In his vero quibus locorum crassitudinē suspicatur, vngēdas inquit fauces melle atq; omphascio, & anagargarismate vitur mulso, in quo præcoquit ficū, vel organū, & admiscet piper. Dat etiam elaterium in pondere denariorum septē. Multis vero obolū dimidium cū melle & aqua, aut mulso. Dehinc medicamen quod appellauit emeticon vomificæ virtutis, & conficitur hoc modo: Origani atq; heracleotici panacis manipulum accipiēs, demerge, inquit, in vasculum rubri æris, tum rhus quod appellamus rubrū heminas quatuor, atq; cepulas germanas viginti, quibus circūtollemus exteriorem corticem, & has quasantes immittimus. Tūc infundim⁹ vinū Chiū,

CÆLII ACVT. MORB.

vel Rhodiū, aut Cnidiū quatuor heminis, & sub sole ante ortum caniculę viginti diebus, atq; post ortum viginti diebus pōnemus. Tunc cum fuerit liquor insumptus infundemus alias quatuor heminas, atq; alia sub sole linquimus. Tunc iisdē diebus mittimus medicamentū in pilam, & cōterentes formamus trochiscos, quorum maiores erunt drachmarum singularum, & dimidię. Alij vero drachmarū singularum, item alij dimidiarum drachmarum. singulos dabimus, viriū comparisoni congruos, cum mulso, vel pro electario cum melle. etenim vomitum humoris viscosi efficit & ventrem deducit. Aliqui, inquit, etiā melanteriam admiscēt, & tapsiæ succum obolos tres. At si difficilis fuerit vomitus, penna oleo veteri intincta, atq; faucibus immissa prouocandum probat. Vtitur etiam aliquādo medicamine ex omphacij succo, & elaterio confecto, atq; diagridio cū nigro helleboro, & sale, si fuerint in vomitum difficiles ægrotantes, vel elaterio cum aceto & ruta, & rursus elaterio cum sinapi & salib⁹. Eos inquit qui perfriktiōe synanchici fuerint effecti, phlebotomari prohibemus, atq; clysteribus depurgari, ceteris vero omnib⁹ ex quacūlibet causa synanchicis effectis erunt hæc adhibenda, fulciendos etiam omnes iudicat vel nutriendos sola aqua, vel mulso, cetera quoq; ciborū prohibet. Sed hoc omne experimentum siue tentatio promptissime ex occultis suspicionib⁹ videtur esse prouisa. Etenim empiricus solā seruationē intuēs, quā teresin vocāt, sanguinosos nūc phlebotomandos existimat, non aduertens quia omnes synāchicos ob stricture vehemētiā oportet

tet phlebotomari, permittētibus virib⁹. Deniq³ ridendū est etiā, q³ eos, qui ex perfrictione synāchici fuerint effecti, phlebotomandos negat, non aduertens præsētia, & inquirēs factorū causas. Noxia etiā sunt cataplasmata, quæ adhibenda probat, atq³ vaporationis genus acrimoniæ causa earū specierū quas admiscēdas iubet, siquidē sunt incendiosa. Itē vomifica, quę emetica appellat, etiā nō tumentia in tumorem faciūt deuenire, etenim ferulago, quā thapsiā appellāt, sufficiens est etiā putredinē partiū quas attigerit facere, atq³ inflare naturali habitu cōstitutas. Non aliter etiā illa quę cōficiūtur ex cepe & omphacij succo & rhu rubro, vel horū similib⁹. Itē oleū vetus acre est. Illa vero, quæ cathartica appellat, per clysterē adhibenda, quæ nos purgatiua vocamus, turborē magnū faciunt, atq³ stomachū vexant, & cætera quæq³ neruorū. Est præterea iners, tempus dandi cibi nō definire. Nostræ etiā sectæ quidā adhuc veterū errore detenti, insuetas graues materias adhibēdas probauerūt. Nūc vrinam siue simū humanū, cum melle, & myrrha, atq³ ruta, nūc centaureā & absinthiū, & abrotanū, & thymum, & aristolochiā, & tymbrā quā nos satureiam dixerimus, & sinapi. Nunc pythagoricū atq³ Isyperium trochiscū nomine inuentoris appellatū, nūc polyidē sphragida quā adpellāt atq³ cōstrictiua, tum vnctiones & cerotaria ex vnguentis sampsuchi atq³ rois marini quorum singula tumoris sunt prouocatiua ob feruoris nimietatem, atque desiccandi virtutem, & re corporandi, cū sit celeritas passionis, ac simplicibus curanda virtutibus.



Apoplexia dicta est, q̄ tanq̄ ex letali percussu repētīnū faciat casum. Est autem oppressio sæpe sine febris repentina, & quæ sine febris priuēt corpora, & semper celerissima, & nunq̄ tarda esse probatur. Sed ei⁹ antecedentes causæ cōmunes cum cæteris esse accipiuntur, magis tamen iugis adustio, & perfrictio vehemens, & indigestio frequens, lauacris exercita, vsus etiam veneris, & magis in senib⁹. Item vulneratio membranæ, in pueris vero etiā vehemens saltus membranæ cerebri. Quibusdā igitur ante casum nullū præuidet signū, quibusdā vero præcedūt quædam significātia passio-nem, vt grauedo, vel dolor capitis, aut vertigo, aut aurīū tinnitus, & in solitos vsus difficilis motus, vult⁹ mœsticudo, saltus membrorum, & magis præ cæteris partibus labrorum, tremula loquutio, & veluti minus expressa, aut interruptio proferēdi sermonis, sine vlla ratione, vel obliuio mox dictorū, vultus etiam plenitudo, egestio-num difficultas. Sed hæc cōmuniter antecedunt, vel præeunt etiam his qui in epilepsiam, vel furorē vēturi vidētur: irruēte passione vocis amputatio sequitur, & mentis opressio ex repenti-no casu, immobilitas perfecta totius corporis, atq; conductio vultus. Quibusdā etiā suspensio palpebrarum, atq; oris hiscens distantia, pulsus densus, & quadā persecutiōe fugatus, articulorū gelidus torpor, parua respiratio, color plumbeus, atq; inuolūtaria lachrymatio. Peiorante passione atq; in exitiū egrotantis crescente, vultus addu-

ctio, ita ut longior nota videatur imago, præcordiorum prominentia, atque totius corporis frigidus torpor, pectoris stridor, & superiorum partium sudores frigidi, immobilis etiam & super suspensa palpebrarum ac superciliorum positio. At si passio fuerit leuigata, & in salutaria deuenierit signa, corporis fugabitur torpor, atque frigus redeunte feruore, partes etiam quædam saltu errantes mouebuntur, in his qui omnino caruerant, & distillat⁹ humor faucibus transuoratur, quod difficile, nec tamē prisca intercessione impeditur. Punctus etiam vel inclamat⁹ ægrotas palpebram mouet, atque labia cōducit, significans sese audire vocantē posse, & vniuersali dicto, quod Græci catholicon vocant, quidam prima die moriuntur, quidam duobus, vel tribus diebus superuiuiunt. Alij vero saluantur, quorum alij statim sese resumunt, alij paralyti partium, vel partium corporis vexantur. Item quidam parua cōuersione mentis afficiuntur, ut aut alienentur, aut tristes, & somniosi videantur, ut si eos quisque ex somno excitauerit, aliquid alienum loquatur. Est autem passio strictionis, atque celeris & acuta, & vehemens, & in senibus abundans, & hyemis tempore & autūni fine. Vocatur etiam à quibusdam paraplexia. Vehementius autem in ista passione patitur caput, sicuti coniiciendum ex his quæ antecedunt atque corporis oppressio. Et sunt difficiles curationes fortium hominum, debiles etenim oppressionibus magis superantur, atque ferre maiora adiutoria minime possunt. Hinc etiam specialiter difficili⁹ viris curari perspicimus, atque senes & pueros, à perfectis ætatibus, & tabidos magis quam qui habitudine videntur. Item eos qui præ-

CÆLII ACVT. MORB.

tacti fuerint ægritudine, magis q̃ qui nulla fue-
 rint morbi contagione sauciati. Adiuuat etiam
 difficultatē hyems, nō solū q̃ corpora denset, ve-
 rum etiam q̃ quibusdam adiutorijs oppugnet,
 vt gestationibus liberis ac nudis. Similis autē ac
 vicina est apoplexię lethargia, epilepsia, matricis
 præfocatio, secundū aliquos, & paralytis & gra-
 uatio, quam Græci caron appellāt, & dissolutio.
 Discernitur ergo à lethargo, siquidē ōnis lethar-
 gus in febrē atq; cū febre fiat, rarū habeat pul-
 sum, & neq; semper sensibus priuet. Apoplexia
 vero & sine febribus fiat, & paruū atq; densum
 faciat pulsum, & repentinum tanq̃ ex letali per-
 cussu faciat casum. Itē q̃ ex membranę vulne-
 ratione apoplexia fiat, lethargia vero nūq̃ discerni-
 tur etiā ab epilepsia. siquidem epileptici quidem
 totius corporis conductione agitētur, & spumas
 agāt, apoplecti vero nūq̃. Item post accessionem
 epileptici integro habitu cōsurgāt frequentius,
 apoplecti vero paralytin partiū sustineant. Item
 apoplexia acuta atque celeris semper accipiat. Epilepsia
 vero etiam tarda sæpissime inuenitur. Item matricis
 præfocatione discernitur. siquidē præcedat capitis querela,
 matricis præfocationē. Item in accessione conducta atq;
 sese sustollens matrix inueniatur, in apoplecticis vero
 hoc nūq̃ contingat. Dehinc cessante accessione apoplectæ
 foeminæ nesciunt gesta. Illæ vero quæ matrice
 fuerint præfocata, resipiāt atq; narrēt quēadmo-
 dum fuerint oppressæ. Itē matricis præfocatio
 tarda esse perspicitur, hoc est chronia. Apople-
 xia vero nūq̃. discernitur etiam paralyti apople-
 xia, quanquā idem multis videatur veteribus vt

Hippocrati & Diocli & Praxagoræ, & Asclepiadi Titienſi & Demetrio, & ſi qui præterea. inquiunt enī apoplectos toto corpore vitiatos paralyſi. Parapoplectos vero particulis. Themilon vero capitis vel in capite paralyſin cum mentis impedimēto proprie apoplexiā vocat. In alijs vero partibus corporis, ſine impedimento mentis, hanc ipſam paralyſin. Sed non oportet certare de hijs ex quibus curationis ratio nō ſumetur. Solum tamen commemorandum eſt, quòd apoplexia celeris atq; acuta natura intelligatur, paralyſis vero propria quæ dicitur, tarda ſemper intelligatur. Itē grauatio & diſſolutio inter reſumptionem veniunt, & nunq̃ præcordia ſuſpēdunt. & neque difficultatem reſurgēdi vt alij faciunt. curationem vero principaliter apoplexiæ nullus nobiliū priſcorū tradidit. Siquidē paralyſi generaliter hāc aſcribendam. ſolus Hippocrates ait, apoplexiam vehementē ſoluere impoſſibile. Imbecille vero non facile. Itē aliarū ſectarum ſucceſſores aceto atq; oleo caput fouent, ceteras autē partes corporis vino & oleo lanis cōtegentes rudib⁹, atq; intrectatis. Secūdo ſtudioſe caput fouēt, admīſcētes hederā vel ſerpyllum, aut peucedanū, quorū fugienda eſt acrimonia atque conſtriſiones. Adhibenda eſt igitur paſſioni congrua curatio. Nam locandi ſunt ægrotantes loco lucido mediocriter, atque calido. Utendum etiam articulorum blandi tactus continentia, atque limpidæ lanæ teſtione medijs partibus capitis & collo. Adhibenda etiam olei ſomenta dulcis atque calidi, & expreſſa ex aqua calida ſpongia vultus circuntegendus. Potus

CÆ L I I A C V T. M O R B.

dandus aqua calida, vel mulsum distillādum sensim faucib⁹. Adhibēda etiā phlebotomia, nō necessario expectata diatrīto, dimissiōis tamē tempore, vel circa primæ lucis exortū, cū ex aliqua parte corporis frigidus torpor visus fuerit egelari. Etenim qui prius q̄ hæc prouisa sunt, in materiæ detractiōne festinare latēter accessiōis tempore decepti phlebotomiā adhibēt, vel certe iam expirātes egrotos phlebotomādo nihil prodesse potuerūt, siquidē neq; materię fieri potuerit exitus, cū corpus desertū exitum sanguinis negat. Quāq; diuisa venula videatur adhibēda etiā abstinentia, vsq; ad primā diatrīton, tum vnctio calida, atq; spōgiarū calida expressarū vaporatio, & sorbilis cibus, vel panis aqua calida infusus, vel mulso. At si ventris officiū nō cessauerit, clyster simplex adhibēdus, cū cucurbitę appositione cū scarificatione, tempore quo sæpissime docuimus, occipitio atq; omni spinę spongiarū vaporatiōe vtendū, & cataplasmatib⁹ laxatiuis, tū radendū caput totū, & multis partibus eius cucurbitę similiter apponēdæ, & vsq; ad declinatiōne passionis, alternis dieb⁹ cibus dandus vel si virib⁹ fuerint ægrotātes fatigati, erunt quotidie nutriēdi. At si passio declinauerit, cerotaria apponēda, & in oleū, vel in calidā & oleū deponēdum, atq; fouendū corp⁹. Tūc varius cibus dandus, adiectis oleribus, tunc piscibus & volantū carnibus, dehinc etiam lauacrū adhibendū, atq; pomorū quicquam dandum, dehinc vinum. seruāndus etenim magis est supra dictorum cōnatus atq; coaceruatus vsus, ob passionis difficultatem. At si quisquam ex apoplexia liberatus

aliquas corporis partes paralyſi vitiauerit, harum curationem ex libris quos de tardis paſſionibus ſcribentes docebimus, ſumendam iubemus. Eos verò qui membranæ vulneratione in hanc paſſionem cadunt, ita curandos monemus, vt inferius demonſtrabimus.

De Conductione, quam græci ſpaſmon vocant: & diſtentione, quam Tetanon appellant: & earum ſpeciebus. Cap. VI.



Onſequens eſt de conductione atq; diſtentione, & earum ſpeciebus dicere. Vtraq; igitur paſſio ab accedente nomen ſumpſit, conductio, à conducendo atque contrahendo: extentio, ab extentione pati-

entium partium. Sed eius ſpecies ſunt, emproſthotonia, & opiſthotonia, quas nos prorum raptum, atque ſupinum appellare poterimus. Alterum habeo quod in anteriora conductionem facit, alterum quod ad poſteriora. Sed antecedentes cauſæ ſupra dictarum paſſionum, ſunt hæ, percuffus maiorum neruorum, quos tenontas appellant, vel ſupra ipſos iacendi iugis poſitio, duris incumbens ſuppoſitis, vel graue quicquã ceruicibus impoſitum, vel meracum potũ, aut profunda perfriſtio, aut, vt ſæpe contingit, vulneratio neruorum, vel muſculorũ, atq; vinum iſdem vulneribus manentibus potum, vel frigidum, & magis eo tempore, quo ſordibus carentia purgari vulnera videntur, vel in cicatricem venientia, ſæpiſſime raptus occurrit. Aliquando etiam celius, hoc eſt, adhuc vulneribus in tumore conſtitutis. Eſt autem iuxta diffinitionis formam con-

CÆLII ACVT. MOR.

ductio, quam *ispasmon* græci appellant, inuoluntaria tensio, atque conductio partium cum vehementia & acuto dolore, ob strictionis nimietatem. Distentionem autem, quam tetanon vocant *Asclepiadis* sectatores dicunt extentionem corporum, ut alij verò partium, nescij quomodo etiam voluntate tēdimus quasdam partes, & in his qui *satyríasi* vexantur, vel *podagra*, extensio est genitalium partium, vel pedum, nec tamen distentio, quam græci tetanon vocant. Alij aiunt distentionem esse tensionem musculorum secundum colla, atque buccarum, quos *siagonitas* vocant, cum tensione ac dolore effecta. Alij nostræ sectę scriptores pro tēsione conclusionem vocauerūt, sub alio nomine id ipsum significātes. hanc enim causam passionis esse voluerunt. Sed his omnibus communiter respondendum est, quomodo causa à passione plurimum differt. Dicendum est igitur non quæ causa sit distentionis, sed quæ sit distentio. Etenim causa, siquidem sit occulta, discrepat, atque pro captu mentis signorum varia esse inuenitur. Ea vero quæ concurrunt passioni, hæc esse cōductioni prompta atque manifesta, & omnibus intelligibilia esse probantur. Et est amandum ut vires patiuntur ex his quæ non discrepant disciplinam tradamus. Secundum nos igitur, distentio est siue extentio quam, ut supra diximus, tetanon græci vocauerunt, inuoluntaria tensio, recto atque inflexibili porrecta incremento collorum ob vehementem strictionem, siue tumorem. Raptus vero posterganeus, quē *opísthonon* græci vocant, est inuolūtaria refractio ob nimiam strictionem, siue tumorem. Pronus item

raptus, quem græci emprosthotonon vocauerunt, inclinatio colli in anteriores partes inuoluntaria, ob vehementem tumorem siue stricturam. Sed inuoluntaria hæc dicta sunt, ad discretionem eorum, qui voluntate sua colla hoc schemate componunt: ob tumorem autem, siue stricturam, ad discretionem qui ligationibus tormētiosis organi eas partes positas habent. Tentantibus igitur in has passiones deuenire hæc obueniunt, difficilis ceruicis motus, iugis oscitatio, & magis locis volentibus, sequitur etiam non sine dolore iacendi positio, atque neruorum maiorum quos tenontas appellant, levis tentio, & durities, punctio interpellans ex spina vsque ad occipitium, atque bibendi difficilis transuoratio, contemptibilis tamen, temporum dolor & magis eo tempore crescens, quo hîscere atque os aperire voluerint patientes, auditus grauis, linguæ impedimentum, & imprompta loquutio, saliuarum fluor, continuus surarum atque vestigiorum dolidus sensus, & sine ratione veluti ridens vultus, cū quadam mobilitate suarum partium. Ascendente passione atq; erumpente distētio dura, & durities partium fiet, cum dolore vehementi colli, atq; musculorū qui buccas colligāt, rubor vultus, & colligatio supradictorū musculorū, dentium quoq; concubitus, hoc est, incūbēs cōfixio, sudor plurimus, articulorum frigidus torpor, pulsus obscurus, extensio colli, spiratio difficilis, contractio crurū atque manuum, & infusi & destillati liquoris in os recursio per nares fiet, quibusdam etiam mentis alienatio, cum celerissima spiratione sequetur, gutturis & pectoris stri-

CÆLII ACVT. MORB.

dor. Sed tetanicis recto ductu distenta magis videntur colla atque ita, vt inflexibilia fiant. Opisthotonicis vero contractus ad posteriores partes fiet, cum nimia tensione, atque dolore dorsi, & clunium. His etiam crura conducuntur, & neque manus distenduntur, digitos conductos atq; implicitos habent vt Hippocrates ait, & maiorem digitum, hoc est, pollicem cum cæteris tenent, vt frequentius contingit, se quoq; continere non possunt, sed quadam mobilitate resiliunt, cum dolor irruerit. Hi sunt peiores tetanicis, & omnes ab alteris, quoties non sine vulnere sed in vulneribus propriorum ac salutarium locorum his fuerint affecti passionibus. Empirosthotonicis autem colla conducuntur in anteriorem partem, atque mentum pectori configitur, tenduntur ilia, & præcordia cum frequenti delectatione urinæ egerendæ, & difficili flexu digitorum. Liberari verò ex his omnibus difficile est ægrotantes, si in vulneribus spasmus emerferit, vel si spinæ fuerit innata durities. At si sine febribus spasmus irruerit, facilius liberantur. Febrem verò secundum Hippocratem in spasmum venientem, salutarem accipimus. Spasmodum autem in febrem, perniciosum. quanquam eius excludant sententiam, dicentes quia secundum ipsum febres corpora grauant, multo magis geminant incommodum, cum vehementibus doloribus. Laxat enim, inquiunt, tumorem naturalis ac mediocris feruor: febrium verò acer, & contra naturam immodicus, vexat. Quapropter ex minutione eorum, quæ passionis sunt spem futuræ sanitatis melius accipimus.

Quomodo discernimus raptum quē græci spasmon vocant, à tremore atq; saltu.

Caput VII.



Discernens raptum à tremore, atque saltu Demetri⁹ Herophilī sectator ī corporib⁹ inquit raptu vexatis, motum fieri per extentionem, atq; cōductionem: in ijs verò qui tremore afficiuntur, agitatione crebra. Item in his qui saltu afficiuntur, leuabilem & possibilem motū fieri indicauit, & magis in partibus sensibilibus, ac neruis qui volūtario motu subiecti sunt: spasmū verò etiam in colligationibus membrorum fieri sensit: & non solum in quibusdam sensibilibus partibus: verum etiam in his quæ sensu carent, atq; ita inquit, gaudio quædam membra saltum sustinere, quædam verò nunq̃: item senectute tremorem fieri non raptum asseruit. Addendum tamen quomodo sine vlla distentione saltus mouetur, atq; tremor efficitur: cum tensione autem vehementi raptus membrorum fiet. Item secundum Asclepiadem extensio atq; conductio partium tarda, & perseverans esse perspicitur: spasmus verò breuissimi tēporis & celerrimi tremor. Sed saltum ab his discernentes quidam Asclepiadis sectatores aiunt, non extensione vel conductione fieri, sed lauatiōe ac depositione: quod quidam non consenserunt: etenim ex tanta lauatiōe inquit atq; depositione sustinent atq; leuata vt deposita, extentionem, atq; incuruationem vel flexum probant. Hos deniq; motus manū, quos ita fieri perspicimus, medium aiunt esse sal-

CÆLII ACVT. MORB.

tum raptus atque tremoris magnitudine. Hac distantia temporis iugem extentionem atque conductionem in tremore fieri magis quàm in saltu, raram verò in raptu. Item paruam extentionem ac conductionem in tremore, maiorem vero in saltu, item ingentem in raptu. Dehinc nomen quoque dicunt communius esse atque latè diffusum. saltum solemus etiam cordis saltum vocare & arteriarum motum. Hippocrates denique inquit frontis venas saltum sustinere, & neque tremor in his partibus fiet, est enim passio neruorum. Sed his respondendum est, oportere etiam venas atque arterias & raptu vexari, atq; tremore affici, quantum in ipsis est, siquidem etiam motus earundem partium, alios atque alios fieri magnitudine atque temporis distantia differenter videamus.

De Curatione.

Cap. VIII.



Egrotātes iacere oportet loco sufficientis magnitudinis, lucido mediocriter, atq; calido, nullo etiam odore infecto, mollibus atque calidis stramentis. Prima enim celeritatis morborum mitigatio est straminum mollities. Dehinc sine cibo facimus ægrotos vsque ad primam diatrítionem, si vires permiserint, summo cum silentio iacentes. Tum lanis mollib⁹ ac mūdīs oleo dulci & calido infusis colla circūtegemus, & buccarum musculos quos siagonitas vocant, & maiores neruos cervicis, tenotas appellāt: tū clunes atq; omne quod doluerit. Sed ob permanentē feruorē erūt extrinsecus apponēdi saccelli, vel cuiusq; materię vaporatio

nes, aut vesicæ oleo calido repletæ, aut pāni calidi, aut, vt supradictū est saccelli lini semine torrido plenī, vel cantabro feruente aqua, & oleo decocto. Articulos quoque manibus tenentes calefacimus, & sudorem ob pressuram ac turborem venientē pānis calidis excipimus. Frigescit enim permanens & consensum partium in passionem germinat. At si vehementes fuerint dolores, erit adhibenda phlebotomia, dimissionis tempore atque ante tertium diem, si passio coegerit: si minus, in ipsa diatrīto, aut post ipsam, viribus permittentibus. Tunc colluere aqua calida permittimus, & potum accipere. In ipsa verò diatrīto oleo dulci atq; calido, & mulso corpus omne perungemus. Ora etiā aqua calida fouētes, tūc cibo nutrim⁹ sorbilli, atq; tenui ex alica, vel amylo, aut pane ex mulso, vel pane insuccato ex eodē mulso, oportet enim etiā cibū ebibi potius q̃ masticari, ob dentium conclusionem: quā leuiter digitis aperire tentabimus, prohibētes ligneos, vt pleriq; adhibēt, cuneos, etenī quassationē partiū atq; indignationē faciūt, toto tēpore cibi sumendi permanētes. Tū cæteris diebus ea q̃ fouimus cataplasmatibus curamus, dehinc etiā spinā totā lini semine cū polline, & foenugræci semine, singularib⁹ vel cōmixtis ex aqua mulsā cataplasma mus, superponentes extrinsecus quicquam de supra memoratis calefactionibus, quò possint cataplasmata multo tempore calida permanere. Itē per clysterē oleum calidū injicimus, vel calidā & oleū, aut aquā, in qua fuerit decoctū semē foenugræci, vel radix agrestis maluæ. simul etenim & stercorea detrahimus præminentia, & tumentes

CÆLII ACVT. MORB.

partes fouendo relaxamus. Vtimur præterea cucurbitis, & magis cum passio sumpsit statum. Sed in accessione, leuibus: in dimissione verò, etiã scarificatione adiecta. Erunt autem infigendæ occipitio & collo. Sed aliquando ante impostas cucurbitas, expressas spōgias ex aqua calida & oleo aut decoctione foenugræci, aut lini seminis, aut hibisci apponemus. Aptæ etenim vehementer ex his vaporatio lentescens liquoris nervis laxandis accipitur, & quæ musculos buccarum, quos siagonitas vocant, sit sufficiens relaxare. Tunc post vaporationem cataplasmatibus vtendum. Aliqui deniq; non sine ratione commoti etiã teneris & exercitis pellibus agnorum, vel hædorum oleo calido tinctis atq; madefactis loca patientia vaporauerunt. Damus etiam oleum calidum ore continendum, & quanquam omni tempore conueniat, magis tamen cum cataplasmata apponimus hoc probamus faciendum, quo ex interioribus quoq; buccarum colligatio laxatur, cibū dātes alternis diebus, donec passio declinet, si vires ægrotantis permiserint, in iisdē perseverabimus, solam aquam calidam vel mulsum calidum, dimissionis tempore, offerentes. Tunc cum ex parte passionem mitigatā senserimus, embasim olei, vel aquæ & olei adhibemus: cuius rationem atq; ordinem libris specialium adiutoriorum docebimus. Dehinc quotidianis diebus humaniore cibo nutrimus, præcauentes etiam nunc dura quæq; ac difficilis transuorationis dare mandenda, sed magis pultes offerentes, vel olera, vel cerebra, vel pisces teneros, & omne quod facile accipi, ac digeri potest: ne ob vehementem masticationem

naturales colligationes buccarū, quas græci chalinos vocant, moueantur. Erunt præterea loca ipsa quæ patiuntur cerotario curanda ex oleo dulci, vel cyprino confecto. Item diachylon medicamento, & quod appellant Mnasei. Tunc etiam acopis utemur quæ fiunt ex amylo, atque adipe, & ex infusionibus ac decoctionibus foenugræci, & lini seminis, & his similibus. Tunc lauacrum adhibemus, præcauētes aquam frigidam, dehinc dabimus etiam vinum, ut sæpe docuimus, qualitate atque natura & quantitate congruum. Veterum medicorum Erasistratus tetanicam passionem nō memorauit. Herophilus verò nihil plus inquit, nisi quod vehemens opisthotonia rectiora faciat ea quæ nodorum spinæ euulsionē arcuata videtur, & quæ febricula irruēs passionē soluat. Item Serapion primo libro curationū sic inquit curādos tetanieos, quēadmodū phreniticos, quas propter sumēdæ sunt cōtra ipsū respōsiones, quas de phreniticis dicētes docuimus. Itē ex his curationē huiusmodi passionis tradiderunt. Hippocrates libro quem ad sententias Cnidias scripsit, cerotario inquit vngendos opisthotonicos, & aqua calida eorum crura fouenda. Iacere iubet in lineis stramentis, utens ad ventrem mouendum collyrijs quæ appellauit balanos, & potionib⁹ ex radice bryoniæ & dauco atq; vino cōfectis. Offert præterea farinam coctam tepentem in partem cibi, ut sæpissime facit, permittens etiam vinum superbibendum, quando voluerint ægrotantes. Tetánicos verò phlebotomat, non aduertens adhibendā vere phlebotomiā, sed non solam. Nō enim dignū atq; sufficiēs tantæ passionis vnum

CÆLII ACVT. MORB.

adiutorium esse probatur. Item collyria siue balsani & potiones suprâ memoratæ, & vinû intèporaliter datum patientibus, contrariû atq; saluti noxiû monstratur. Alia enim tempore importuna neruis officiûnt. Item secûdo libro quem de moribus scripsit, ait esse aliquâdo cõducibile tetanico sine vulnere effecto atq; primû corpore & habitudine vigenti, æstatis tempore plurimæ frigide ablutione, siquidẽ feruorẽ reclamet ac reuocet. Dat etiã nigrû helleborû cû pipere, & lacte asinino carne cõcocto potat, atq; sternutamentum cõmouet. Mirâdum igitur q; in his qui tali passione afficiûntur frigida vt edû existimat Hippocrates, qui iamdudû ait frigida quæq; esse inimica ossibus, neruis, dẽtibus, & cerebro. Sternuta menta etiã cõmouere tumores nulli dubiû est. Item asininû lac nulla ratione laxare tumẽtia p̃batur. Dehinc stomachû euertet: siquidẽ sit tetri odoris & saporis. Itẽ helleborû nigrû neruos obsidet, atq; purgandõ, vel deducẽdo corpus exagitat. Diocles libro quo passiones atq; causas atq; curationes scripsit, tetanicis inquit adhibẽda mictoria medicamina, quæ appellauit diuretica. tû ventrẽ deducendû atq; vacuandû, dat etiã bibendum passum aquatum pueris, vel his qui ex vulnere in passionẽ ceciderûnt. prohibet etiã cibû dari, & iubet ea quæ passione tendûntur vaporari, & emolliri. Item tertio libro de curationibus similiter clystere vtitur, & vinum dulce dat bibendû, adhibens voporationes nunc siccas, nunc humectas, & vngit cerotario, atq; lanis pariẽtia cõtegit loca. Sed ex his primo mictoria vesicam mouẽtia omnes prouocât neruos, qui tunc summo atq;

que attento sensu habitantur. Dehinc clysteres acerrimi adutendo tumores asperiores efficiunt, quos adhibendos existimant. Est etiam vinum repugnans, priusquā passio declinauerit. Et quāquā omne, magis tamen dulce quod opportune datū inflat, denique etiā sanos & indigestos atque inutiles & implicitos facit. Est etiam profecto peccatius prohibito cibo vinū dare. Itē vaporatiōes humi de siccis atque aridis repugnāt, & vsus cerotariorū soli passionis declinationi cōueniēs inuenit. Praxagoras tertio libro curationū vaporationib⁹ vtitur, & clystere & vomitu. Quanta autē vexatio sit vomitus, arbitror superfluum dicere. Est enim etiam impossibilis vsus eius in his, qui neque ad trāsuerandū potū os aperire possunt. Heraclides Tarentinus secūdo libro interiorū passionū tetanicos & opisthotonicos clystere curat, & prepoat iure gallinaceo & lasere, cum primō sint hæc ventris inflabilia. Itē laseris virtus acerrimā, clysterum verò incendiosa. Dehinc Asclepiades secundo libro celerum vel acutarū passionū, incipiente, inquit, dolore tetanicos aqua calida fomentamus, nocte atque die scilicet, ut præter incōgruæ qualitatis percussum etiam temporis peccato atque immodicæ quātitatis dolētia prouocētur, cū sit tunc mitigationis atque blandimenti opportunitas. Interea inquit saccellis ex milio confectis, vel cachry, vel salib⁹, quæ quidē sine dubio ob acrimoniā acutis passionibus sunt cōtraria, tanquā acre collyriū his qui acutis doloribus oculorum afficiūtur. Hic præterea etiā inquit aridas vaporatiōes operatius mederi quā cataplasmata medent. Non aduertēs, quia tunc nerui ob colligationem

tumoris indigent laxamento atque indulgentia. Ex siccis autem vaporationibus, ut etiam ipse confitetur, siccantur, & tenuantur & arescunt corpora. Conuenit etiam (inquit) cataplasma simplex quod omen lylin appellat, pueris atque mulieribus, & viris quorum corpora fuerint dimissa, atque molliora vel tenera, cum potuerit id omnibus conueniens dicere. Quid enim tam vanum atque (ut ita dixerim) ridiculum, quam ob usum cataplasmatum naturam vel ætates ac vitæ consuetudinem præseruare? Dehinc possunt pueriles ætates vel muliebria corpora non liberè educata, neque molliora inueniri: quo fiet ut communiter in omnibus utilissimum cataplasmatum adiutoriū prohiberi videatur. Ob istius errorem qui non manifestis intentionibus res aduertendo falsis curationibus implicatur, adhibet etiam clysteres acerrimos atque vehementius operantes, salutarem putans ex his febrem generari, quo raptus siue adductio materiæ e partibus patientibus ad intestina fiat. Quæ igitur maior accusatio esse potest acerrimi clysteris, quam quod febrem facere promittatur? Quid enim utile ex eo sperare possumus, ex quo id perficitur quod etiam sine tetanica passione graue corporibus existimatur? Probat etiam vehementes feruores similis acrimoniæ, iubens sacculo sale pleno aqua calida tincto partes que patiuntur vaporari. Tunc duobus cauteriis alternis sales incendi, ut ex ipsis inuadens quædam spiratio penetret altiora. Sed horum acrimoniam iam pridem reprobauimus. Idem ignem plurimū accendens & superponens ægotantem omnes spondylos spinæ oleo per diem atque noctem iugiter

fricat, at est vehemēter culpabile. Omnis etenim impressio & tumentia & dolorē geminat. Itē iugiter diem atq; noctē id facere iubet, vsu etiā sanos potest quadā vexatione in cōsensum mittere, quippe cum sæpe in vno latere iacentes, atq; eodē tardantes schemate vexemur. Itē plurim⁹ densat, deniq; etiā in feruentibus lauacris corporis superficies perspicitur. Et quid vltra dicam? cū sit euaporatiuæ virtutis paroptesis, tetanos autē mitigatione indigeat, ob celeritatem sui. Itē ait cucurbitam vtilem magis q̃ phlebotomiā huic probari passioni, nisi (inquit) febres prohibuerit materiæ detractionē: vel in venis plurima fuerit plenitudo. Tunc enim erit phlebotomiā adhibenda in ipsa vehemētiae summitate. difficile enī inquit detractionē fieri corpusculorū posse tēpore dimissionis. sed dicimus cōtra neq; raptū cucurbitę posse febrib⁹ cohiberi, sicut in ipso sæpe ope probauimus: neq; melior phlebotomiā, vel plati⁹ or vsus cucurbitę esse potest. etenī in augmento phlebotomiā locū habet, quo tēpore cucurbitā adhibere nō licet. Neq; cucurbitę tēpore phlebotomiā, quo noxia probat. tēpus etiam phlebotomiæ illud est, quod etiā aliorū amputantiū adiutoriorū, vt est dimissionis, in totius augmento passionis. in accessione enī simpliciter mitigantibus vtemur adiutorijs. Asclepiades autē ob extinctā falsis intētionibus causam neq; aptū scire potuit phlebotomiæ tempus. Declināte igitur passione ægrotantes nutrit, atq; succis & sorbilibus cibis. Sera igitur si fuerit quā expectandā ob nutriendū putat, aut vt sæpe cōtigit post decē dies effecta immodica atq; interfectrix ex tāta abstinētia

iudicatur. Dehinc quæ ægrò adhibenda sint, docere neglexit. Vtrumne piscium an volantium vel quadrupedum, sed omne genus corruptibile atq; inflabile. Hic verò linquens verè resumptoria adiutoria, quæ magis fuerant demonstranda, aliena ordinauit. Hæc sunt quæ Asclepiadi respōdenda probamus. Communiter autem respondēda est omnis alia, quæq; fuerit acrior materia. Et enim quidam, sicut Clodius Asclepiadis sectator memorauit, laser, quē græci opon cyrenaicon vocant, cera inuolutum bibendum tradiderūt. Dāt etiam castoreum præbibendum, & ferulagine, cū euphorbio colla perungunt, atque spinam. Itē plerique superficiem vulnerant ignis vstura, & ex sinapi atque fico adhibent cataplasma. Alij frigida fouent, cum nimiam viderint tēSIONem, & post perfusionē frigidæ fricant calidis rebus. Alij vtūtur etiam baccis, & thymo, & origano, & nepeta, & hysopo, & herba seluia, & butyro & cedria, & herba pulicaria, & semper viua, au si etiam quidam viscellum ranarū dare, quæ omnia prompta atque manifesta peccata probantur. Alia enim ob acrimoniam tumorem prouocāt, yt euphorbium, & ferulago, & laser, & sinapi, vel his similia. Alia constringendo perfectam strictionem contendunt, yt herba pulicaris, quam silphion vocant, & semperuiua, quam aizoon vocant, & aqua frigida. Viscellum autem ranarum experimentum esse dicitur, & est odiosum: in semet nihil habens commodi, quod ratio probet.



Eīnde hydrophobia quę nomē sum
 p̄sit ab accidēti. Est enim vehemēs
 tumor aquę. Nā gręci timorē pho-
 bon vocant, aquā hydor appellant.
 Qui denique detracta litera delta
 adiiciētes gāma hygrophobiā vocauerūt, q̄ oēm
 liquorē metuat, sed cōsuetudo magis primū obti-
 nuit nomē, siq̄dē plus aquā timeāt egrotātes, vel
 q̄ iter cæteros liquores plurimū p̄stet. Alij quoq̄
 phobodipson appellāt, q̄ cū timorē sitiāt. Itē Po-
 lyb⁹ pheugydron: siq̄dē aquā fugiat. Nos deniq̄
 aq̄fugā dicere poterim⁹. Itē Andreas q̄ cynolyf-
 son vocauit, veluti ex rabie canina morbū cōce-
 ptū. Accēdens autē causā passiōis, est canis rabi-
 di morsus, velut quidā memorāt. Cēterorū quęq̄
 aīaliū q̄ sint simili rabie obnoxia, vt luporū, vrsorū,
 leopardorū, equorū, & asinorū. Hoīm hydro-
 phobarū quidā deniq̄ i hydrophobicā passiōē
 deuenerūt soli⁹ aspiratiōis odore ex rabido cane
 abducto, cū deflectiōe q̄dā naturalis spiratio ve-
 xata venenosū aērē adducit, & talib⁹ inserit par-
 tib⁹. Itē alij rabidi aīalis vnguīb⁹ lēsi in rabie de-
 uenerūt. Memorāt deniq̄ sic mufierē i hydropho-
 bicā passiōē venisse, cui facies fuerit leuiter à par-
 uulo catulo laceffita. Itē quidā à gallo gallinaceo
 pugnante leuiter læsus in rabiem venisse dicitur.
 Sartrix etiā quēdā quū chlamidē scissam rabidis
 morfib⁹ farciendam sumeret, atq̄ orę stamina
 cōponeret lingua, & artuū iuncturas lamberet
 assuendo, quo transitum acus faceret faciliorem,
 tertia die in rabiem venisse memoratur. Est prę-
 terea possibile, sine manifesta causa hanc pas-
 sionem corporibus innasce, cum talis fuerit stric-

CÆLII ACVT. MORB.

ctio sponte generata, qualia venena. Interea post morsum quidam celerius in passionē veniunt, quidam tardius. Ideo etiam post annum aut eo amplius afficiantur, sed magis plures post quadraginta dies.

Quæ est diffinitio siue agnitio hydrophobiæ.
Caput X.

Est agnitio hydrophobiæ appetentia vehemens atq; timor potus, sine vlla ratione, ob quādam in corpore passionē, adiectum est autē, sine vlla ratione, atq; ob quādam in corpore passionē, q; alij timeant potū, vt veneni admixti suspicione, vel arte prouidētes, quia si intemperate sumpserint, periclitabūtur. Neq; illico hi ratione timētes, hydrophobi esse vel dici possunt.

Quæ sequuntur eos qui in hydrophobicā passionem proni ac decliues esse videntur.

Caput XI.

Sequitur eos qui in istam passionem proni ac decliues esse noscuntur, cū iam p̄tangi coeperint, anxietas quēdam sine vlla ratione, atq; iracūdia, & corporis difficultas, insolitus motus, sōnus etiā suspēsus atq; turbat⁹, vel vigilia, & simul cibi corruptio, stomachi grauedo, crurū atq; brachiorū extēsis, oscitatio iugis, & ip̄gens leuādī volūtas, insueta etiā querela aēris tanq̄ astringini, quīs serena fuerit quies: Item difficilis toleratio atq; tædium, & recusatio imbrium, parua bibendī voluntas contra consuetudinem. Obtinente passione appetentia bibendī atque timor, & primum ad ipsius aquę vīsum, secundo etiā

si eius audierint sonitum, vel nomen. Dehinc timor fomentationis olei, pulsus densus, parvus, inordinatus, quibusdam febricula, saltus stomachi, torpor, atque stupor articularum, subreptio atque extentio præcordiorum ad superiores partes, & officij ventris abstentio. Urinæ reddendæ paulatim frequentatio, tremor atque conductio nervorum, vox obtusa & velut latrabilis, * & corporis spui similis, siue canina inuolutio, spiratio difficilis, iactatio corporis omnis ad ingressum hominum, tanquam secum aquam afferentium. Rubor vultus, atque oculorum & corporis tenuitas, attestante pallore cum sudore partium superiorum, ventri frequens tensio cum seminis inuoluntario iactu, lingua prominens. In ultimo etiam singultus, & vomitus fellis ac frequentius nigri, quibusdam etiam timor manus oculis tenus admotæ, vel circum tractæ, quidam se agnoscere fateantur esse naturalem vel consuetum aquæ liquorē, cum sibi monstratur, sed commoueri cum viderint, ut seipse quoque Soranus vidisse testatur in hac passione constitutum sese hortatum liquorē ut sumeret, nec tamen potuisse. aiunt & militē quendam, ut Artorius memorat, in passione constitutum sibi indignatum quod in bello nulla timuerit vice, sed nunc aquam cum vidisset, quæ esse consuetudini iocunda solet, metu inenarrabili terretur. Item Eudemus Themisonis sectator memorat fuisse hydrophobum medicum, qui cum prænosceret periculum, suppliciter ingredientes exoraret, & cum lachrymarum fluore guttis destillantibus tangeretur, exiliens vestem consciderit. Dehinc Soranus memorat se infantem hy-

drophobum vidisse vbera matris expauescentē. Item ait quendā Atheniēsem sibi retulisse, quod viderit hydrophobum ex domo fugatū ad locū venisse, vbi inclusus corpore implicato vitā finierit, sed in ipso loco fuisse canem iacentē, quem rabie accensus repente accurrens momorderit. Communiter autē est passio strīcturæ, atq; vehemens & acuta, vel celeris. etenim ob nimium tumorem & humoris defectū ægrotantes celeriter interficiuntur. Nec Demetrio danda fides est dicenti quod etiā tarda hæc passio possit esse, hoc est diuturna, quam Græci chroniam vocant, si quidem dicat in ista passiōe leui tumore affectos biennium transegisse. Neq; Asclepiadis sectatores intelligibile quiddam asserunt, qui propterea passionem tardam putant, quia post plurimum tempus morsus inflicti morte afficiuntur. Cum non oporteat illud tempus ægrotanti imputari quo nondum rabie vexatur. quippe cum passio necdum corpus afficiat, & cum emicuerit, non habeat superpositiones, seu dilationes, quod specialiter tardis afficiuntur passionibus, & ob hoc celerrime ægrotātes interficiat, non solū vt acuta, sed etiam vt continua passio.

Quæ sunt similia hydrophobiæ: & quomodo internoscuntur.

Cap. XII.



Similes sunt hydrophobicæ passioni phrenitis, mania, quam nos furorē, siue insaniam dixerimus, sed hæ discernuntur, siquidem plus in ipsis caput patiat, in phreniticis vero etiā febres sequantur. Item in hydrophobicis plus stomachus & sine febribus esse perspiciatur, & acuta

sit atq; celeris passio. Mania vero etiā tarda frequentius inueniatur. Eudemus Themisonis sectator inquit melācholiā esse hydrophobicā passionem, sed ab hac quoq; discernitur. siquidē tarda sit melancholia, acuta vel celeris hydrophobia. Alij quoq; aërophobas aiūt esse similesūpra dictis, sed internosci. siquidē aëris sit timor, qui generaliter phreniticis ascribitur. Etenim phrenitici quidam aërem lucidū extimescūt, quidam obscurū. item Andræ sectatores memorāt esse pantophobas, quos nos omnīpauos dicere poterimus, siquidem omnia timere dicantur. si vere tamen hæc esse poterit passio. Discernitur autē qd nō solius pot⁹, sed omniū rerū timorē faciat.

Vtrum ne animæ an corporis passio sit hydrophobia. Cap. XIII



Quæsitum etiā utrū animæ an corporis passio sit hydrophobia, etenim quidem esse aiunt animi passionem. siquidem appetere vel desiderare sit animæ speciale, nō corporis. Deniq; purpurā cupientes, vel statuā, vel militiā, aut regnū, aut pecuniā, neq; venis neq; neruis ægrotare dicūtur, vel arterijs, sed animæ affici passiōe: quo fiet vt etiā hydrophobia animæ sit passio. Est enim appetentiā potus, quippe cū timor & inæstitudo & iracundiā passionēs sint animæ. Timēt igitur aquā hydrophobæ, quo necessario animo ægrotare noscūtur. Nā ōnis phantasia cuius diuersitates latini visā vocauerunt, vt Tullius, siue illa naturalia, siue contra naturam fuerint, animi non corporis esse noscuntur. hydrophobæ igitur phantasia iactantur, scilicet ea quæ contra naturam esse videatur, quo

CÆLII ACVT. MORB.

assumitur eos animi affici passione. Sed his qui hæc asserunt cōsentiendum non est. etenim appetere vel delectari potu, sicut etiā mandere ex corporis quadam nascitur passiōe. Timor enim per consensum animæ corporis compatiētis nasci perspicitur, quo fiet vt corporalē esse passionem hydrophobicam manifeste perluceat. Etenim antecedens morsus, ex quo causa descēdit, vtique corporis fuit, & non animæ. Antecedentia autē atque consequentia, vt est singultus & difficilis corporis motus, & grauedo, & his similia corporis esse noscuntur. Nam animæ passionēs, vt Philosophi volunt, nostri sunt iudicij: hydrophobica autem passio ex corporis necessitate descēdit, quo fiet vt sit corporis passio, sed etiam animæ occupet qualitatem, tanquam in furiosis vel melancholicis.

Quis locus in hydrophobicis patitur.

Cap. XIII.



Icina etiā quæstio est supra dictæ, quis nam in hydrophobicis locus corporis patiatur. Equidem Democritus cum de Empirosthotonicis diceret, nervos inquit: cōijciēs hoc ex corporis conductione, atque veteri tentigine. Item Asclepiadis sectatores alij membranā aiūt cerebri, siquidem secundum Asclepiadem omnis passio quæ mentem turbauerit in ipsa consistat, vt phrenitis, lethargia, epilepsia. quo assumitur, vt etiā hydrophobica passio eidem membranæ ascribatur, quæ animum cōturbat. Alij aiunt diaphragma pati, siquidem in ipso sit dolor constitutus. Arthemidorus Erasistrati secta-

tor, & Artorius Asclepiadis sectator de hydrophobia scribentes atq; plurimi nostræ sectę scriptores aiunt stomachum pati: siquidem singulatus sequatur & vomitus fellis, & appetentia insatiabilis bibendi. Quorū singula stomachi passionis esse noscuntur. Consentire tamen etiā membranas cerebri. sed nonnulli Asclepiadis sectatores stomachum atq; ventrem pati dixerunt. etenim bibendi appetentiam non solum stomachi parvissimis vijs, sed etiam ventris fieri probāt. Vomitus quoq; vtriusq; partis effici passione. Itē Gai⁹ Herophili sectator libro quo de timore aquę scripsit, ait cerebrum & eius membranam pati. Etenim voluntario motu seruiētes nerui atque stomachum colligantes initium vel originē inde sumpsisse noscuntur. Magnus vero Ephesius secundo libro epistolarum, ait sigillatim esse dicendū, omnia quæ difficultate motus in hac passione afficiuntur, pati. Hoc est cor, stomachum, diaphragma, caput, ilia. Non enim pulsus malignum fieri posse suspicatur, nisi prepatiente ea parte corporis, vnde initium sumit, quę necessario sine vlla fuerit vexabili passione. Pulsus mutari in peius nūq̃ potest, neq; difficultas spirationis fieri, si diaphragma atque pulmo naturali positiōe maneāt, ac nullo modo tentata, neq; tētigo frequens atq; vltra naturam, nisi virilia siue radi⁹ virilis fuerit in tumore constitutus: neque visa mentē fallentia, quę Gręci phāta smata vocauerunt, nisi capite patienti fieri possunt. siquidem in ipsa vel in ipso sensus omnes sint constituti, vel q̃ sensuales vię ex ipso ad cor referantur, quorum nihil est ad medicū necessario peti

tinens. sufficit enim agnouisse caput pati tēpore quo mens fuerit alienata; quippe cū etiā ex antecedentibus signis pati noscatur. Præcedit enim quibusdā dolor capitis atq; aurium tinnitus. Visus quoq; falsitas prouolantiū veluti animalium minorum, tanq̃ culicū, quapropter palpebratione frequentant. Nec nō etiā vultus feruor cū rubore per ora insinuans, attestante lachrymarū fluore, cum angulis oculorum sanguinolētis, exstantib⁹ venis ex vtraq; parte temporū apparet, sed horum singuliratione cōmoti vera quidem, sed deficiente, hæc posuerūt. præpatitur enim ea pars, quæ morſu fuerit vexata. Vnde initium deniq; passionem sumere nemo negat. Patitur enim totum corpus, quod probamus ex his quæ singuli dixerunt. Cum enim alij alias asserunt pati partes, omnes pati consentunt. Fit autē probabilius ex his quæ manifeste hydrophobicos sequuntur, saltus mēbrorum, raptus siue contractio neruorū, sitis timor, tentigo, abstinentia, vel retentio egerēdorū. Plus tamē stomachū pati, atque ventrē recte dicim⁹. In ipsis enim plurima sunt accidētia signa, & manifestiora, vt singultus, saltus, retentio, cōductio, vel cōtractio, sitis intolerabilis. Sed nihil horū ad curā necessario refert, vbi enim passionē iuenerim⁹, eidē parti iuxta magnitudinis cōparationē adiutoria adhibemus.

Vtrū noua passio sit hydrophobia. Cap. XV.



Vidā logicorū quæsiuerunt pro loco vtrū noua passio sit hydrophobia, vt si nouā inuenirēt, nouā etiā causā atq; curationē iquirerēt, quod à nobis quidem alienū est, fieri enim potest vt particulares vel

speciales passiones nouæ fieri possint, generales autem vel principales, quarum dominio cæteræ quæq; subiiciuntur, fieri nūquā possint. Hæc deniq; consuetis atq; congruis curationib⁹ similiter curantur: sed vt plenius omnia perspiciantur, singulorum placita siue visa vel existimationes ordinamus. Etenim quidam aiunt nouam esse hydrophobicam passionem, quidam negauerūt. Et alij omnino, vt Artemidorus Sidenfis. Alij specialiter, vt Caridemus sectator Erasistrati. Item nō nouam esse passionem plurimi dixerunt, sed ob astructionē probādæ nouæ passiōis aiūt neminē veterū hāc memorasse passionē, sed soli inquirūt nouelli inuētores eādē aduerterūt. Certe si sunt apud veteres, nec tamē memorata cognoscitur. Secūdo cōfundit atq; turbat hæc passio nō solū inertes, sed etiā artifices: quo pbatur ob tantam ostētationē magnitudinis noua iueniri. Dehinc aliarū passionū causæ apprehensibiles sunt, scilicet actiua atq; operātes, quas synecticas vocāt. Istius autē passiōis incōprehēnsibilis est, quod est signū probabile nouæ passionis. Additur etiā q; sit incurabilis. sed his cōtraria sentiētes falsum esse inquirunt, q; hāc passionē nullus veterū memorauerit. Etenim Democrit⁹ qui Hippocrati cōuixit nō solū hanc memorauit esse passionē, sed etiā eius causam tradidit, cū de opisthotonicis scriberet. ipse quoq; Hippocra., etsi nō p̄cipaliter de ipsa passione tractans, sensu tamē dictorum hāc memorasse mōstratur. In prædictuo libro dicēs phreniticos paruibibulos, sono quolibet pulsatos tremore affici. Alienatione autem mētis hydrophobas vexari videm⁹, quapropter hos Hippocra. phreniticos dixit paruibibulos,

CÆLII ACVT. MORB.

quos brachypotas vocant, hoc est, q̃ modicum biberent, ob timorē liquoris. Item polybus hanc passionem memorauit, dicens aquifugas cito intrare, quos pheugydros appellauit. Homer⁹ quoque hanc agnouisse passionem probatur: conijcit enim per figuram cum de Tantalo dicit. Itē ubi inducit Teucrum occisis octo, Hectorē non potuisse percutere, atq; ita loquutum vt diceret se hunc interficere nō posse rabidum canem. Cum igitur memorauit Homerus ex quo fieri hydrophobæ possunt, erit consequens, vt &, quod fieri possint, scierit. Itē Comicus Menander inducens senem irascentem istius passionis imaginem vinolentis adscripsit, dicens non posse bibere eos qui vinū vsq; ad vexationē potant. Ratio quoque hoc ostendere videtur, etenim superioribus temporibus aut erant canes, aut non erant: sed nō fuisse nemo quis dicere audeat. Passionis etenim causam prompte Homerus memorauit. Si igitur fuerunt, etiam rabie affecti sunt, quo fiet vt cum fuisse causa ex qua hydrophobæ fierent, atque homines qui fierent vel pati potuissent demonstretur, erit rationabile, vt apud antiquos hæc passio fuisse credatur. expauescere autē siue confundi, vt aiunt, non solū inertes, sed etiā artifices hac passione, non necessario signum est eandem incurabilem pronuntiandi: etenim plurimæ aliæ passiones non aliter videntium mētē confundunt, vt satyriasis, apoplexia. Item causa præcedens, eius passionis incomprehensibilis vt putant, nō est: quā plurimi medicorum atq; philosophorum tradiderunt. At si esset, incōprehensibilis, quod ex ea sequetur, manifestum esse ap-

prehensibile, nulli negāt, vel si esset incōprehēsi-
bile, id quod sequitur, hoc est passio, non tamē in-
curabile. At si incurabile, nō necessario nouū, vt
neque carcinoma. Sed aiunt principaliter ex his
quæ sequūtur vel designant hydrophobicā pas-
sionē nihil esse eiusedē propriū, vt singultus, qui
quanq̃ eos sequatur, sit tamen cōmunis eorū qui
hydrophobę non sunt. sitis etiā sequitur, atq; vo-
mitus fellis, sed febricitātib⁹ hæc sæpe cōtingūt.
Item turbatio mētis atq; timor, sed etiā phreni-
ticos sæpe comitātur. Si igitur nihil p̃priū sequi-
tur hydrophobas, sed sunt ōnia communia alijs
passionibus, non poterit noua passio nuncupari.
Nos quoque his consentimus. videtur etenim
hæc passio etiam frequentare quibusdam tempo-
ribus, vel locis, vt apud Cariam atque Cretam.
Hæc enim insula aliorum venenosorum anima-
lium difficilis atq; pene libera, sola canum rabie
vexatur frequentissime. Poëtarum quoque testi-
monium longē vetustissimum atque non rectis
necessario verbis destinatum, accipiendum du-
cimus. Item Hippocrates magis phreníticos me-
morauit, non hydrophobas, paruibibulos: nā in-
quit eos qđ in quibusdā phreniticis frequētare
videmus, aut fastidio possessos, non solum ad ci-
bum, ve ūetiā ad potū, vel certe traductos visis,
quæ Græci phantasiā appellāt, vt (ait Eudemus)
accipēdū non existimēt potū, vel suspitione de-
lirationis affecti admixta putēt venena liquoris
tremūt quoq; nōnunq̃ debilitate neruorū, & ad
omnē sonitū cōmouētur, scilicet alienatiōis p̃-
prietate & nō necessario hydrophobicæ passio-
nis. Quapropter alijs vtēdū est rationib⁹ ad de-

mōstrādū nō esse nouā hydrophobicā passiōē.
Quomodo curādī sūt hydrophobæ. Cap. XVI.



Vrandos hydrophobas cōuenit iace-
re loco mediocriter calido, atq; luci-
do adhibita articulorū defricatione,
seruatos etiam insomnes vsq; ad la-
xamentū temporale. His quoq; par-
tibus quæ rapiūtur, vel conductione vexantur,
calidis atq; mundis lanis, vt pannis prætectis, ad-
hibendæ etiā molles vaporationes. In statu ac-
cessiōis dulci atq; calido oleo clam lanis tinctis,
vel foris à cubiculo infusis. Tū immissis, ne visu
liquoris ægrotātes in commemorationē timoris
reducātur. At si aliqua fuerit indulgētia passiōis,
quæ erit apprehendēda, si etiā febres fuerint ex
minutione feruoris, si etiā nō fuerint minutiōe ti-
moris, erūt phlebotomādi ex brachio, quo vena
facilior occurrerit. Ita in fluētī sanguine aduer-
tenda sunt ægrotātiū ora, atq; manu excipiēdus
est fluor, ne sonitu perculsi cōmoueātur. In dia-
trito vero erūt primo pungendi, sed pānis oleo
tinctis (eorū enim tractu latēter corpora perun-
gentur) extergēdi quoq;: at alia fouētur alijs cali-
dis atq; immūdis cōsequēter pānis, vel linteolis:
tūc post perūctionē cib⁹ dādus tenuis & sorbi-
lis: quo latēter cū cibo etiā potus inducatur: &
panis aqua infusus, vel alica ex aqua, facile enim
accipiūt, sed oportet magis tēpora dādi seruare
cibū & potū: quod fiet hoc genere, vt ex obliquo
fabulātes de consueta vita loquant, lauacra me-
morādo atq; bibēdi copiā. Tūc si egri his dictis
placidi pmāserint, fidēter offerim⁹ potū dimis-
sionis tēpore inuēto. At si cōmoti, vel irati fue-
rint, audito lauacro, vel potu, erit differenda obla-

tio: dandus interea potus in fictili vasculo subtili
cauerna perforato, tanq̃ sunt papillæ vberū, &
dandus ægrotātibus, præfecto obstaculo oculo-
rum, vel temporaliter clausis fenestris. Est enim
omnifariā mitigatione passionis prouidendū vt
nulla occasio detur excitādi furoris. Oportet de-
niq; etiam ministros aptissimos esse, & primo vt
sint taciti, neq; fabulas iniicientes, sed ei⁹ respō-
dentes dictis, & ipsa respōdentes, vt cedenter ac
sine vlla cōstantia eum cōsentiendo coerceant:
Atq; eius visa, quę mentis falsitate efficiūtur, ei-
dem sensim displicere, atq; incredibilia faciant.
Dehinc cōuenit laxatiuis cataplasmatib⁹ thōracē
curare, & à tergo inter vtrasq; palas, quod Grę-
ci metaphrenū vocāt. cum autē statū sumpserit
passio, etiā cucurbita apponēda iisdē locis, cum
scarificatiōe, tū spōgiarū vaporatiōe vtēdū, quę
quidē latēter erunt ex oleo atq; calida exprimē-
de, & apponēde obuolutę pānis vel linteolis, ne
humoris sensus aut sonit⁹ exagitēt ægrotantē.
Tunc etiā caput detondendū & iisdē adiutorijs
cōcurandū: gestatio adhibēda, in lectulo suspē-
so, siue portatoria sella. At si passio pseuerauerit,
iisdē pseuerabim⁹ adiutorijs. Illud etiā erit affe-
ctandū, vt si omnino potū recusauerint qualibet
tamē parte quiddā liquoris assumāt, & nulla in-
dignatiōe ægrotātes afficiātur visu pterriti. Qd̃
ita facere poterim⁹, si calidā atq; oleū ex clyste-
re per podicē iniiciamus, vt hoc si fieri potuerit,
diurnis dieb⁹ paruū quidē: tūc enī potuerit cō-
tineri. Nā si fuerit plurim⁹ humor, sua redūdātia
ac pondere prouocat excludi. erit enī ei⁹ cōtinē-
tia utilis ad minuendā sitim. Nam neq; solum

CÆLII ACVT. MORB.

dysentericis iniectionē medicamen superiora inua-
 dēs sepe stomachū atq; caput vexare accipim⁹,
 siquidem eò necessario perueniat, sed etiā calida
 & oleum peruenire posse concipim⁹, quo parti-
 bus iisdem irrigationis præbeat laxamentū. Post
 iniectionē deniq; manibus admotis impressione
 moderata ex inferiorib⁹ ad superiora ducētes li-
 quorem ascendere prouocamus, declinante pas-
 sione erūt ægrotātes resumēdi, sed multo tēpo-
 re à lauacro abstinendi, atq; vino, ne in periculū
 redeant. At si ex ista passione vt sæpe contingit
 satyriasis fuerit effecta, erunt adhibenda ea: quæ
 paulo post dixerimus. Antiquorū autem medi-
 corum nullus istius passiōis tradidit curationē.
 Aiunt deniq; Themisonem quāq; volentem nō
 potuisse: siquidem ex rabido cane quondam fue-
 rat vulneratus, etsi eius curationē assumeret mē-
 te: quippe scripturus continuo admonitus in eā-
 dem laboretur. Democritus vero iubet origanī
 decoctionem dari, atq; ipsum poculum quod bi-
 būt in sphæræ rotunditatem formari. Est autē
 hoc genus decoctionis acerrimum atq; stomā-
 chum vexans, & incendens. in quo etiā idem
 sibi repugnare perspicitur. Ait enim hydropho-
 biam esse incēdium neruorū. Item quidam me-
 dici, vt Artorius memorat, alios in vasculū ple-
 num frigida miserunt. Alios in puteū posuerūt,
 saccis immisos vel inclusos, vt necessitate bibe-
 re cogerentur. Alij in aquā calidam, nescij quod
 passionis curatio illa sit, non vt bibant ægrotan-
 tes, sed vt bibere velint. quod fiet cū passio fue-
 rit adiutorijs destructa. Multi deniq; etiā bi-
 bentes raptu affecti sunt grauiore. Quapropter

etiam toto corpore infundendos, vt putant, & in aquam frigidam magis vexabile comprobamus. Omne etenim frigus extendit tumentia. Nam propterea, vt Artorius dixit, raptu interficiuntur. Item Aristoxenus ad corruptionem atq; abundantiam liquoris intentus, prædandum dicit potum, atq; clysteribus vtendum, cõmuniter omnibus, depurgatiuæ vel temperatiuæ virtutis, sed hæc tumore passionis intendẽdo geminat comitãtia. Item Tullius Bassus etiam sternutamentis vtitur, & clysteribus, cũ generaliter hæc passio mitigatione indigeat ob acutissimam celeritatem, & nõ, vt hic putat corporatiuis adiutorijs sit aspergẽda, quæ Græci metasyncritica vocant. Itẽ Niger eius amic⁹ etiã albũ helleborũ dedit. Eudernus autẽ phlebotomans helleborũ dat secunda vel tertia die, atq; cucurbitas affigit vsq; ad partiũ pustulationẽ. Itẽ Agathin⁹ libro de helleboro cõscripto iubet etiã dari helleborũ in initio passionis. Alij podicẽ cataplasmandum iubent helleboro. Alij collyria ex ipso facientes quæ appellauerũt balanos, podici supponũt. sed erunt cõmuniter omnes culpandi, cum sit passio acuta atq; celeris, & vehemẽs, ac sæpissimẽ cõtina. quippe cum nunquã purã atq; syncerã habeat dimissionẽ, & est helleborũ recorporatiuæ virtutis, ac propterea tardis passiõib⁹ cõueniẽs, quas Græci chronias appellant, & in earũ principaliter lenimẽto, atq; regulis ciborũ ægrotante præparato, quod Græci diætã vocant, quod vtiq; non sine tempore prolixo fieri potest. Sine his igit̃ nĩhil veneno differet helleborũ datũ. Est etiã graue vsq; ad pustulationẽ corporis cucurbitis

tas apponere. Et simile quiddā, tumentes oculos ligneo baculo inūgere. Itē quidā castoreo potandos iubēt hydrophobas, alij rosaceo oleo, alij digridio, aut elaterio, aut lacte vel pinguib⁹ incōgrue iusculis, & agitātes atq; grauātes ægros, & nō eo tēpore quo p̄mitti potuit vsus supra dictorū, pręcautiōis causa effugiēdæ passiōis. Nūc etiā præsens indigeat cōgrua curatione: clystere depurgant vel tēperāt vim veneni, quæ semper post effectā passiōē cōtemnēda est, vrgentiore cogente cœnoteta. Itē nihil aliud q̄ potum dare quoqno mō nitūtur, nūc gelu, vel niuē offerētes egrotis, nūc viridē ficū, vel pyrū, aut cucumerē, & his similia, alij calami p̄forati initiū ori egrotantis immittūt, dehinc ex alia parte per aliā cauernā aquā infundunt. Alij poculo lineo panno subter imposito, vel beluæ pelle potandū putāt, scilicet sup̄stitutione traducti, q̄ naturalis auctoritas beluarū quę canib⁹ est cōtraria, timorē egrotantiū soluat. Sed hæc quæ vulg⁹ per experimēta p̄bata putat, longē aliena ab arte mōstrātur. Alia quoq; quæ faciēda ordinauerūt, ratiōe reijciēda sunt, vt ea quæ sūt vinosa ante declinationem offerenda. Itē frigida sunt ob tumorē incongrua, constringūt enim atq; extendunt stricturæ difficultatē, ex qua sine dubio hydrophobica passio confecta probatur.

De acuto tormento, quod Græci ileon appellant. Cap. XVII.



Tormentū dictū est, q̄ existiment ægrotantes cōuolui, atq; torqueri suorum intestinorū verticula, vel quòd spiritus ob abstinentiā clausus sese in

uoluēs,vinctiōes atq; tormēta efficiat,vel q; vehe-
mentia dolorum supra eas partes quæ patiūtur
egrotātes arcuati cōuolutiq; plicētur.Salimach⁹
autē ait quosdā Pythagoricos apud Siciliā medi-
cātes græco nomine phragmō vocare,siquidem
obtrusis naturalib⁹ vētris officijs fieri videatur.
Item hāc passiōē tertio libro acutarū vel cele-
rum passiōnū Asclepiades diffiniuit hoc modo.
Tormētū est cōtortio extenta, atq; lōgi tēporis
intestinatorū.sed hoc improprie dixit,q; sit etiam
lōgi tēporis tormentū.Est enī acuta atq; celeris
passio.Deniq; hoc intestinatorū dicim⁹ tormentū
esse,cōtortionē extentā,atq; pñciosam.sunt enī
eius antecedētes causæ cōmunes,quæ etiā alias
facere valēt passiōes, sed magis perfrictio,indi-
gestio,atque cibi grauabiles & inflabiles, vel no-
uī,aut venenū potū,aut cibo datū,aut fungi co-
mestī,sequitur autē in passiōe cōstitutos ven-
tris vehemens inflatio,& intestinatorum,& dolor
nimius iliorū , atq; ossium, quæ à pube vsq; ad
ilia perueniūt,quæ Græci ephēbia appellauerūt,
totius quoq; ventris atq; superpositæ cutis infla-
tio,membranæ maioris,quā peritonæū vocāt,
scilicet quæ omnia interius tegit atq; cōtinet vi-
scera.Cōsensus etiā vesicæ & officiij vētris per-
fecta abstinētia,stomachi euersio per nauseam,
saluarū fluor,sitis vehemēs,spiratio hirta,atque
anhelatio,articulorum frigidus torpor , pulsus
densus, singultus, exitus per podicem venti ni-
hil releuantis,ac si quicquam per clysterem fue-
rit iniectum,aut non admittitur ob nimietatē
stricturæ , aut admissum retinetur exitu nega-
to:aut si fuerit redditū,erit cōnexum pinguibus

ac vesiculosus. Mulieribus etiam matricis adductio ad superiora fiet, vomitus quoque humorum pinguium, qui in vetriculo & ipsius orificio adherescebant cōtumaciter. His vero qui perniciosius atque specialius iactatur, etiā stercoreum vomitus fiet. Tūc quoque pulsus concidit, nigrescit corpus cum nimia linguæ asperitate. Aliquando etiā vt Heraclides Tarētinus memorat, quarto libro de internis passionibus intestinorum verticula distētis cutib⁹, apparent, cum peritoneo disiecto sola fuerit superposita cutis. Alij vero memorāt ventum per podicē redditū sine odore tetro perniciosum fore, ac si fuerit odoris tetri salutē promittere. in illis enim ob nimiam strictionem, tanquam liquatus spiritus purior excluditur. In his autem ob quandam laxamēti facultatē infectus exhalationibus stercoreum, excludetur. Torminosā igitur ab ista passione, quam specialiter tormentū diximus, magnitudine differre monstramus. Hi enim leui dolore afficiuntur, & ob hoc ventriculosi siue torminosi vocantur. Item discernuntur dolore ventris. Ventriculatio enim superius magis ventre est, atque sub præcordijs, & sæpe sine intestinorum tormēto. Discernitur etiam à colī vexatione, est enim principaliter colī vexatio vni⁹ intestini passio, atque tarda, quā Græci chroniam vocāt, & diutissime pseuerās. Tormētū autē soli⁹ acutę passiois, est omnium intestinorum vexatio. Itē alij hanc passionē Chordapson vocauerūt, quod nō aliter quā chordę intestina tēdātur. Nā veteres Græci intestina chordas vocauerūt, sed hoc quoque nomē alij cōmune vocabulū tormēto posuerūt, vt Hippocrates, Praxagoras, Euriphon Gnidi⁹.

Alij differre dixerunt, vt Diocles libro de passio-
nibus atq; causis & curationibus scripsit, etenim
tormentum non sine ructationibus dixit, atque
permisso per podicem vento, sine stercore ege-
stione, ventrem quoq; non necessario durum fie-
ri, & clysteris iniectionem accipere, doloris etiā
initiū superioribus magis accedere. Item reiice-
re ægrotantes, si mediocris fuerit passio, humorē:
si vehemens, stercore: & neq; iniectionem clyste-
ris admittere, ventrem quoq; durum, atq; exten-
tum iugiter in orbem tumoris subleuatū, inte-
riores autem intestinorum partes doloribus affi-
ci, stomachum quoq; immobilem ac fixum, vel
inflexum permanere. Sed de his huic dissentire
necessarium non est, oportet enim intentionem
adhibere, atq; intelligere q; sit passio stricture,
atq; acuta vel celeris, & vehemens. Quapropter
habendi sunt ægrotantes loco mediocriter calido,
atq; lucido, adhibita requie cum silentio, & absti-
nentia cibi vsq; ad primam diatriron, prohibito
quoq; somno, donec accessio declinet. incipiente
autem eadem, articulorum adhibenda est blāda
ex manibus calefactio, & partes quæ doluerint
contegendæ mundis, & mollibus lanis. Apponē-
da etiam mediocris vaporatio, qua mitigari do-
lor possit, vt sunt panni calidi, atq; lintheola, vel ve-
sica calida ex oleo semiplena, vel saccelli ex can-
tabro calido completi, vel polline, vel lini semi-
ne ex aqua mulsā. Cum autem statum sumpse-
rit accessio, iubemus eos, si pati potuerint, iugiter
foueri oleo dulci atq; calido, scilicet vsu dextero,
quo prærepto nuper infuso mox nouum super-
fundatur oleum. At si dolor coegerit phleboto-

mandi erunt, scilicet ex brachio dimissionis tempore. Et si ante diatriron id factum fuerit, fouentes primo os, deinde colluere permittimus ex aqua calida, dabimus potum paruum, ob mitigandum. Si enim plurimum sumpserint grauatis tumentibus, prouocabitur passionis asperitas, sicut fiet cum graue quisquam cataplasma apponendum putauerit, ex plurima, atq; corporosa indutura. At si in ipsa diatriron fuerit adhibita phlebotomia, parum differentes ob resumptionem vnctione corpus curam⁹, & sorbile damus quidam, tenue, atq; panem ex aqua calida non quidem plurimum. Ea enim quæ ob appositionem cataplasmatidis exterius admoti asperantur, hæc magis plurimum distenduntur cibis vberioribus grauata. Alternis deniq; diebus cibum dabimus, donec passio declinet: dehinc cataplasmata adhibemus ex pollinibus, & lini atq; foenugræci seminibus, ex mulso confecta, vel calida & oleo, illud eurentes, vt calida perseuerent plurimo tempore, & neq; valida atq; robusta inductione grauabilia fiant pondere. Faciunt enim ægrotis dolores augeri. Tūc etiā cucurbitas apponim⁹, sed eas quæ sint osculo latiores atq; labijs flexis. Lenius enim atq; blando tractu arripiunt membra. Tūc etiam scarificatione vtemur, vel in cucurbitarū vicem, ne earum pondere graue quicquam ægrotautes sentiant, vitrea apponimus vascula, vel testea, quæ græci āphoras vocauerūt. Tunc spōgijs vaporamus expressis ex calida, & oleo, vel decoctione foenugræci, aut lini seminis, aut agrestis malue, & rursum cataplasmamus. inijcimus etiam per clysterem oleum calidum, vel calidā

& oleum ex supra dictis decoctionibus quicquam . Est etiam consuetum nobis aquam oleo dulci æquali modo commixtam , cum hibisco coquere, donec aqua insumatur. Tunc oleum remanens concepta lenitate, atque pinguedine ex radice supra dicta , injicere per clysterem. Nam si solum oleum fuerit cum radice hibisci nō admixta aqua decoctum , necessario nidorosum fiet . Adhibemus etiam encathismata ex calida, & oleum, vel quaruncunque laxatiuarum materialium decoctione. Cum autem declinare passio cœperit, etiam embasim adhibemus ex oleo, vel calida & oleo , aut decoctione laxatiuarum materialium, non sine cautione, declinanda est enim perfrictio , quapropter erit facienda in calido loco, vel balnei fornice , quē appellāt achicholum, siue cameram . At si sensus aliquis , permanens erit duritiæ , cataplasimabimus ex ordei farina , & adipe porcino recente , & pice liquida. Tunc cerotaria apponemus, & malagmatum leniora, ordinantes etiam lauacrum , & varium cibum, & vinum ultimo , præcauentes multo tempore frigida quæque , atque indigestionem & inflabiles, vel acres, & minus digestibiles cibos. Veterum autem medicorum , vt Hippocrates secundo libro de morbis , communiter inquit, frigeranda superiora , particulariter autem adhibenda vomifica medicamina , & phlebotomia ex brachio , & capite . Tunc sacculum aqua calida plenum deponendo iubet ægrotantes facere , etiam collyrium decem digitorum quem appellauit balanum , atque hunc summo tactu felle taurino vngendum . Tunc si nihil perfecerit

CÆLII ACVT. MORB.

clysterem adhibendum . Vel si hoc quoq; minus
 valuërit, & folliculo artis grariæ immittendum in-
 quit ventum per podicem, quo distantia ventris
 atque intestinorum replicatis folliculis fiat, tunc
 statim adhibendum clysterem probat, detracto
 supradicto folliculo, & podicem cum spongia
 obstruendum, atque in aquam calidam ægro-
 tantem deponendum. Utendum inquit primo tē-
 pore passionis melle decocto, atq; vino. Secundo
 libro epidemion multum vini meraci, atq; frigidi
 dari iubet, donec somnus vel dolor fiat crurū,
 suspitione causarum sollicitatus: existimat enim
 vel constituit fieri passionem incendio superiorū,
 & frigore inferiorum. Contrarias igitur virtute
 materias adhibendas iudicauit, non intuens pas-
 sionem ex tumore fuisse confectam. deniq; prin-
 cipio vomitus, quem adhibendum probat aspe-
 rat eius celeritatem, siquidem disijciendo corpo-
 ra commoueat : phlebotomare autem conuenit
 non post vomitum, sed laxamenti causa, non vt
 Hippocrates affectandum putat, ob frigidādum
 corpus. Dehinc ex brachio non ex capite neq; si-
 mul ex multis partib⁹ phlebotomare, etenim re-
 pentina sanguinis effusio defectum faciens non
 sinit congruam fieri detractionem, vel quantum
 magnitudini passionis est conueniens: collyrium
 autem felle taurino perunctum, omnifariam no-
 cens accipimus, etenim ob acrimoniam fellis at-
 que mordicationē tumentia prouocat in feruo-
 rem, & ob longitudinem digitorum decem im-
 missum premit eas partes, quæ neq; tenuem li-
 quorem sine grauatione accipere, vel ferre valēt.
 Nam ex ærario folliculo quid dicere oportet, si

vbi inflationis metus est, imittendum extrinsecus
 existimat ventum, atq; quod est maximè pecca-
 ti, frigidum his partibus, quæ etiam naturali ta-
 ctu prægrauantur, non aliter, q̃ si quemq̃ in teta-
 nica passione constitutum cum sit potestatis, la-
 xatiuis curare virtutibus, eundem organis disten-
 dere contendamus. Aduertendum igitur, quoniã
 magis roborat vexationem, vel duplicat corpo-
 ris inflationem, adiiciẽs grauiora, quo etiam per
 clysterem liquorib⁹ magis prægrauet corpus, &
 tumentia importune vento vexata, etiam liquo-
 ris percussu intemporaliter feriantur. Item spongia
 apponenda quam probat, extẽta magis premit.
 Vtitur autem vino, malis quidem, sed suis simili-
 bus consilijs. Neq; enim temporaliter declinatio-
 nem passionis obseruauit. Præterea vsu immodi-
 co, siquidem plurimum dari iubeat, & intempe-
 rato, quod sæpe in sanitate constitutos alienari
 mentẽ perficit. Tunc etiã incongrue, siquidẽ fri-
 gido. Omne etenim frigidũ, tumẽtia auget: repu-
 gnanti iudicio vinum dare perspicitur, effectum
 somno atq; dolori crurum ascribens, somnus et-
 enim leuigata atq; soluta passione efficitur. Do-
 lore autem peiorante & asperato tollitur. quod
 ita manifestum est vt demonstratione non indi-
 geat. Diocles autem libro quo de passionibus at-
 que causis & curationibus scribit, phlebotomat
 in passione constitutos, atq; cataplasmatibus cu-
 rat ex polline, quod græci omen lysin vocant, &
 adipe & vino, & fœce. Tũc præpotat atq; clyste-
 rizat, ex abrotani semine cum mulsã, ex aceto &
 aristolochia & cumino, & nitro, & fœniculi ra-
 dice decocta ex vino, admixta aqua marina, vel

CÆLII ACVT. MORB.

passo, vel acriore vino, siue lacte cum decoctione lini feminis, & mellis, vel similibus. Quarto autem libro de curationibus iuuenes, inquit, atque habitudine robustos, & magis quibus dolor ad latera fert, phlebotomādos pbo ex manu dextera interiorē venā, & submittēdos in aquā calidam, fotis, ventri iniicere admixto sale clysterē, & rursum in aquā calidā deponere, & fouere. Præpotādos autem iubet etiā medicamentis, hoc est, panacis dimidia drachma, in mulso ex aceto tepido resoluta, & myrrhæ obolos duos cum peristereonis herbæ folijs in vino albo, vel cumino æthiopico. Adiuvat etiam plurimos plumbi catapotium transuoratum. Impellit enim pondere, & excludit obtrudentia. Diurnis, inquit, præterea diebus sitientibus potandum vinum dulce, vel aquam temperatam, aut marinam cum vino albo, aut centauream herbam, aut nitrum vel eius spumam, vt ea quæ potuerit soluat. Dāda etiam forbilia, vel cantabri lotura cum melle, vel bromi succus, vel ptisanæ, aut cū farina oleria cocta, alia ex adipe, alia ex halica atque sale, sorbendum etiam & iuscellum scari piscis, & carabi, & buccinarum & cancrorum. Tunc resumptio, inquit, adhibenda. Cuius quidem materies percurrerit quas superfluum est recensere. Etenim ex supra dictis varia atque iners commixtio materiarum demonstratur. Non enim solos oportet iuuenes phlebotomari, sed etiam alios in alijs ætatibus constitutos, neque semper ē dextera manu vel interiore vena, sed etiam ex sinistra atque exteriorē facta, detractio enim tumentia relaxat. Vus atque acrimoniæ causa erigit in feruorem tu-

mentia . Est præterea vexabilis præbibendi medicaminis potio , etenim sunt acria atque mordentia & quæ non sint mitigatiua celeritatis, neque tumoris relaxantia . Plumbum vero transuoratum premit quidem , atque impellit pondere , sed tactu necessario frigidat , atque intestina densitate coacta vexatione distendit , iussella autem in corruptione facilia , & infantia esse noscuntur . Item ptisanæ , eadem perficere:vinum quoque in augmento inimicum . Præxagoras tertio libro curationum clysterem iubet adhiberi , dans medicamina purgatiuæ virtutis, atque per vomitum corpora desiccare, cōtendit etiam potandum mullum, ex aceto cum pipere atque nitro , & recenti lacte cum mulso , & aqua . dat etiam radices circa vesperam comedendas, prædato aut super dato oleo. Vritur præterea ad podicem collyrio & inijcit, atque præpotat absinthio ægrotantes cum aceto, & vino lyncero, cum oleo irino, sed vomitu vritur , donec stercora faciat euomi. Aliquos etiam post vomitum phlebotomat & vento per podicem replet, vt Hippocrates. Item libris de causis atq; passionibus & curationibus vinum dulce dari iubet , & rursum Hippocratis ordinem sequitur, cōgerens omnia peccata & nihil aliud quàm facere diruptionem intestinorum affectans , per acrimoniam medicamentorum tentat, & inflabilem potionum, & iniectione virtute similium, quæ infesta tensione, ac tumore intestinorum, aut retenta ruptione perficiunt, vel putredinem, aut aceruatim exclusio alio genere, interfectionē faciant. Item omne stercus per vomitū emissum

CÆLII ACVT. MORB.

tumoris intestinorū est argumentum. Non enim sine tumore nimio hoc perfici potest, ex intestinis expressum per ventrem transiens, stomacho incidens stercus per partem excutitur, quo probatur magnificam mortē Praxagoras magis quā curationem voluisse scribere, quibusdam etiā manibus premens intestina, magna quassatione vexauit, quibus intestinum, quod gręci τύφλον ἔντερον appellant, in folliculum fuerit lapsū, plurimis stercorebus confectum. item confectis quibusdam supradictis adiutorijs diuidendum probat pubetenus, diuidendum etiam intestinū reētum, atq; detractō stercore consuendum dicit, in proteruam veniēs chirurgiā. Oportebat enim si ad hoc accedēdum necessitas imperabat, enterocelicorum approbare curationem. Temere Erasistratus secundo libro de ventre scribens culpās copiam atq; acrimoniam clysterum ab antiquis ordinatā, ipse quoq; utitur clystere, ex nitro atq; sale. Inijciēdum etiam probat acre collyrium, & similibus utitur cataplasmatib⁹, hoc est, ome lyssi cum myrto vino, fico, & chamelæa, & abstinet à cibo vsq; ad passionis declinationem. Tūc dat mulsum tepidum, dehinc sorbilem ptisanæ succum. sed hic aliorum accusationi iungendus est, etenim culpans tanquam nociuam acrimoniam iniectionum, nō custodit earū vexationem, quin etiam ex cataplasmatibus constringens atq; densans tumentia, grauius ægrotantes affecit. Est etiam quibusdam vsq; ad passionis declinationem abstinentia vexabilis. Hic autem iam declinante passione mulsum dandum probat, quod ante declinationem fuerat ordinandum. Herophilus de

his nihil loquutus est. Asclepiades tertio libro celerum, vel acutarum passionum; aliqua gratissime, aliqua valenter ordinauit, in quibus est etiam inhibitio vaporationum ex aqua calida, tanquam facile frigentium, sed fricandas inquit partes, quæ patiuntur oleo plurimo tempore, atque operose quantum loca ipsa pati potuerint, fuganda inquit etiam declinationis tempore lauacra, non coniiciens quoniam vsum vaporationum, non genus damnauit. Potest enim quisque etiam in alia vaporationum specie perfrigescere, nisi dextro vfu fuerint adhibita. Defricatio autem adiutorium est chronicæ passionis non acutæ, vel celeris, sed magis si, vt iubet, operantius fuerit adhibita, atque multo tempore. Si igitur vera intentione loquamur, neque sibi hæc quæ ordinauit conueniunt. Ait enim debere fricationem adhiberi multo tempore, vel quantum ipsæ partes patiuntur. Cum neque tumentia ex initio fricatione fieri admittant, quippe cum neque cataplasmata grauiā valeant sustinere: lauacra in declinatione adiuuant passionis solutionem. Vtitur etiam embasi ex oleo adhibita, & tempus non finit adiutorijs. Serapion vero tertio libro curationum alia similia Erasistrato ordinauit, denique eius accusationi iungendus est. Vtitur etiam catapotio ex plumbi ramento, & cocco cnidio, & sale & elarerio, & resina, & castoreo, & diagridio, quorum singula acerrimæ esse virtutis probantur: atque percutientia, & neque celeritati passionum, neque tumori congrua. Heraclides autem Tarentinus libro quarto internarum curationum, existimabiles constituens suspiciones, aliter inquit cu-

randos tumore affectos, aliter eos qui crassioribus
 intestinis laborant, & stercoreibus opprimuntur. Vti-
 tur autem per diem, & per noctem cerotarijs ex cera
 & resina & irino oleo, vel cyprino oleo, aut ane-
 thonio, miscet etiam omne lyfi panacem tritum, & cha-
 mæpityn cum absinthio & cyprino oleo. scribit
 præterea potiones, quibus inquit præpotandos
 ægrotantes, ex aniso, castoreo, nitro, hyssopo, cala-
 mo, mulso ex aceto. Clysterem etiam adhibet admix-
 to absinthio, vel cetaureo aut cucumeris agrestis
 radice. Dat etiam mulsum ex aceto, & purgatiuum
 potandum medicamentum, ex diagridio. Alia quoque vir-
 tutum milia conscribit purgatiuorum medicaminum,
 quæ præbenda iubet, non aliter quam ceteri acriora me-
 dicamina, & nullam curam adhibet mitigationis la-
 xatiuæ, respiciens qua possit tumor mitigari. Sed
 ait communiter omnibus aliarum sectarum principibus,
 quomodo intestina tumore defata, atque contenta
 plurima materia, & acerrima & vulnerabili, ut
 illi probant, onerata, interfectionem faciunt ægrotan-
 tis. Denique si forte quisquam iliacam euaserit pas-
 sione, necessario ex supradictis dysentericus fiet.
 Item Theffalus primo libro de regulis quas græ-
 ci diætas, alia quidem ut methodicus scripsit, alia
 culpabiliter adiiciens, quod potum dare debeamus,
 siquidem ad loca patientia descendat: quod
 contra sectæ disciplinam videtur sensisse, & con-
 tra seipsum inconsequenter fuisse commotus, si-
 quidem pro patientibus locis nolit esse mutabi-
 lem curationem. Secundo libro quem compara-
 tionem appellauit, contradicens Erasistrato, hæc
 ait, apertissime discordantia sermonibus. Non
 enim pro differentia partium mutatur liquidus

rum quantitas, sed ob stricturam, vel solutionē. Inconsequenter igitur idem in iliācis patiētis loci causa, potus quantitatē minuēdam existimat. Erat enim promptē dicendum, atq; demonstrandum, quomodo consideratione acutæ atq; celestis passionis minuenda fuit potus quātitas. Item quidam nostri scriptores Themisonis sectatores cuminū oleo decoxerūt ob adhibendū fotū, aut tritum lanis asperferunt. Itē alij oleo rutā decoquentes, iniijciunt per clysterē, & iubent vaporari ex cineribus: mixtos etenim oleo vel quodam laxatiuo liquori, ex decoctione congruarū materiā præfecto, in vasculo ex duob⁹ digitis alto, atq; ambitu simili loci patientis mittendos superpositis carbonibus, nō flāmosis, donec liquor insumatur. Tūc circūtentō linteolis vasculo, atq; parum refriēto cōuertēdos in linteola, ac refundendos cineres. Tunc colligato vasculo fundo tenui, & cōstricto linteo fortiori, patientia vaporare loca. Equidem vere obtunditur admixtione olei & aque, cumini vel cinerum asperitas, sed est meli⁹ ex initio vsque ad finem recta intētiōe cōgrua passionibus adhibere.

De satyriasi.

Cap. XVIII.



Satyriasis, est vehemens veneris appetētia, cū tēsiōne ob egrā corporis passionē. Vocat̃ autē, vt qdā volūt, trāslatiue à similitudine satyrorum, quos, vt vulgus loq̃t, siue fabula fingit, vinolētos, atq; in vsū veneris p̃nos dæmōnes accipim⁹. Itē vt alij dicūt ab herbę virtute quā satyrion vocāt. Hāc enī accipiētes ī venerē puocātur, cū tētigine genitaliū partiū. Sed antecedētes

CÆLII ACVT.MOR.B.

istius passionis causę sunt epota medicamina, ob
 vsum venereum excitandum, quę satyrica vel
 entatica vocant: quę sunt acria, atque incentiua,
 & nervis improba. Item immodici atque intem-
 poralis vsus in venerem. Est autem cõmunis pas-
 sio viris atq; foeminis, quę solet accidere ætatis
 bus medijs, atque iuventuti. Hortatur etenim in
 vsum venereum prouocās ætatis vigor. Sequitur
 autem ægrotantes vehemens genitalium tenti-
 go cum dolore atq; incendio, cum quodam pruri-
 tu immodico in veneream libidinē cogente, mē-
 tis alienatio, pulsus densitas, anhelatio crebra, at-
 que creberrima desponsio, vigilię, hallucinatio, si-
 tis, cibi fastidium, & difficilis vrinę egestio. Ita
 vt plerunq; stercoreum abstentio fiat, quibusdam
 etiam febres: omnibus tamen in vltimo condu-
 ctio neruorum fiet, quam gręci spasmon vocaue-
 runt, & inuoluntarius seminis iactus. initio au-
 tem se leuiter putant releuatos ex vsu venereo,
 atq; seminis iactu, sed paulopost vehementer ex-
 tenduntur: nocētur enim atq; vexantur hoc vsu,
 quauquam parui temporis releuationem falsam
 sentire videantur. Non aliter quàm si scabiosi pru-
 ritu affecti, vel lippientes manuum contactum
 affectare frequentent, quod gręci chirapsian vo-
 cauerunt. Declinante passione omnia supradicta
 minuentur, quę gręci symptomata vocauerunt,
 nos accidentia passionis. Hęc omnia etiam mu-
 lieribus passione affectis, sed plus in ipsis præua-
 let prurigo ob naturam. Indecenter enim ipsa in
 loca manus mittunt, prurientibus verēdis, atque
 omnes ingredientes appetunt, & suę libidini ser-
 uire supplices cogūt. Differt autē à satyriasi go-

norrhœa, quā nos seminis lapsum vocamus, siqui
dē sine tēsiōe veretri sit seminis inuolūtaria atq;
iugis elapsio. Dehinc q; satyriasis tarda non sit,
quā græci chroniā vocāt, ac simile quiddā passio
ni, q̄ à græcis sit appellata priapismos, eius me
mor est ī libro signorū Demetri⁹ Attale⁹ dicēs
q; hoc in quodā viderit sene, atq; in seip sū manu
operāte, nec quicq; tamē potuisse peragere: tēsiō
nē autē fuisse veretri nimīā cū paruo dolore, vt
cornu putaretur, & ita perseuerasse multis mēsi
bus. Nullo quoque adiutorio medicinali cessisse,
sed tardo atq; longo tēpore requieuisse. Quo fit
vt sit priapismus discernēdus à satyriasi, siquidē
illa celer sit & nō tardet in corpore, fiat sane cō
tactu neruorū & stimulofo desiderio in venereā
voluptatē. Est autē passio strīcturæ & celeris at
q; vehemens. Patitur enim tota neruositas, quod
est coniiciendū ex mētis alienatione, & cōtractu
mēbrorū, sed plus atq; prēstātius pati seminales
vias accipim⁹, q̄s græci spmaticos poros appellāt.
pati etiam eas partes grauius, quarū cōgressione
vsius venereus celebratur. Curātes igitur iacere fa
cimus ægrotātes loco calido, atq; vigilāter silere
iubemus, lanis limpidis eorū clunes atq; pubete
nus, quod græci κτρωπ appellānt, cū inguinibus
& ipso veretro cōtegentes, prohibentes etiā ho
minum ingressum, & magis iuuenum foemina
rum, atque puerorum. pulchritudo enim ingredi
entium admonitione quadam prouocat ægrotan
tes: quippe cum etiam sani sæpe talibus vsi sta
tīm in veneream veniant voluptatem, prouoca
ti partium effecta tentigine. Initio itaque acces
sionum conuenit nos eorum articulos manibus

CÆLII ACVT·MORB.

apprehensos continere, & ipsorum manus à locis patientibus arcere. Cum statū sumpserit accessio, & ex dulci atq; calido oleo lanas expressas, vel decoctiōe scœnugræci, aut lini seminis, vel hibisci apponere. In dimissione vero ob vehemētiā etiā phlebotomiā adhibere, cogētibus rebus itra diatriton, permittētibus autē, in ipsa diatrito. Intelligimus sane dimissionē si etiā febres affuerint ex earū indulgētia. Necessē est enī quādo passio asperat tūc etiā febres extēdi, & cū rursū fuerit remissa, febres quoq; leuigari. At si febres nō fuerint, ex cēteris accidētibus, quę gręci symptomata vocāt, cū ea indulgentiora viderimus, vt ruborē, feruorē, pruritum, vel in vsum venerēū cupiditarem, aut genitalium tentiginē, vel his similia. Post phlebotomiā corpus perungemus, atq; ora lauātes cibum dāmus halicam ex melle, vel panem lotum ex aqua, & oua sorbilia. Alijs autem diebus eas partes quas lana texeramus cataplasmate curamus, ex scœnugræci atque lini seminibus, aut pollinibus aqua resolutis, quod gręci omen lysin vocāt, aut aqua & melle. Tunc etiā cucurbitas apponemus, sed in accessionis statu leues, in dimissione autem cum scarificatione, clunibus, atq; pube tenus perrasis capillis. Apponimus etiā sanguisugas, & spongiarum vaporatione vtimur, præcoctis in aqua quibusdam laxatiuis. Adhibentes etiā clysterem ex oleo calido, aut calida ex oleo. Tunc rursū cataplasmautes ante cibum, præterea etiā encathismitibus vtimur. Nunc ex oleo confectis vel calida, & oleo, nunc ex decoctionibus mitigantur laxatiuis. In mulieribus autem etiā pessulum oleo

calido infundētes, sensim cum sexualibus manibus in muliebri veretrum mitti iubemus. Externas vero partes per latitudinem lanis contagemus, vel cataplasmamus & vtriq; fibræ cucurbitas infigemus. Declinante passione gestationē adhibemus, & in oleum vel calidam egros infundemus, scilicet embasim facientes. Tunc etiā lauacrū adhibemus, atq; meliorib⁹ succis, & varijs cibis nutrimus, fugiētes acriora, pulmētū atq; vinū, multo tēpore. Cerotaria etiā patientib⁹ partibus apponimus. Mulieribus vero liquidiora faciētes acriū vice vtimur. Adhibētes etiā aque ex adipib⁹ atq; medulla & meliloto vel his similib⁹ pessaria, de quib⁹ latius in libris quos de mulieribus scripturi, docebimus. Aliorū autē medicorū excepto Themisone nullus hāc passionē conscribit, cū nō solū raro verū etiā coaceruati sepissime inuasisse videat. Memorat deniq; Themison apud Cretā multos satyriasi interfectos, qđ quidē, q̄tū credit, factū est ignorātia ciborū, q̄ frequēter ac plurimā māderēt satyriō herbā. Ait prætera apđ Mediolanū iuuenē atq; aliās decētē nuptā cuidā nobili se vidisse satyriasi interfectā. Ponit etiam eius passionis curationē secūdo lib. epistolarū ad Asiliū scribēs, imperās phlebotomiā, atq; fomētatiōes, & cataplasmata frigide virtutis adhibenda, qbus possit extingui veneris appetētia. Dans etiā potū frigidū: quæ oīa sunt incōsequētia, atq; incōgrua, siquidē pugnēt phlebotomiæ laxamēto, ex quo idulgētia corporis fiet, & est cataplasmatib⁹, & fomētis ex frigido potu cōstrictio, atq; cōdēsatio, vt supra dixim⁹ cōtraria, q̄ppe cū appetētia ac delectatio cōcubit⁹ accidēs sit verē dorū

partibus ob tumorem: sicut etiam mentis alienatio membranis cerebri tumentibus, quo fiet ut ex frigidis atque constrictiuis rebus augeatur etiam vel geminetur veneris cupiditas.

De Cholericis.

Caput XIX.



Holericā passionem aiunt aliqui nominatā à fluore fellis per os atque vētrem effecto, veluti fellis suam passionem. Nam cholen fel appellāt, rhœam fluorem, alij à multitudine fluentium qui sint similes felli. Nō enim inquiūt esse fella, sed esse liquida in eundē colorē trāseuntia. sed hoc differt nihil. Non est enim necessariū de etymologia certare passionis. Asclepiades libro de finibus hanc diffinitionē passionis dedit: Cholera, inquit, est humoris fluor celer ac parui tēporis vētris atque intestinorū ex cōcursu siue obtrusione corpusculorū, atque ut sæpe cōtigit ex indigestione initiū sumēs. Hāc quoque diffinitionē quādam differētes aiūt humoris fluore dictū, siquidē hęc sint generaliter cholera: parui etiā tēporis, adiectū ad discretionē coeliacorū. siquidē etiā ipsis fluor est humoris, sed longo frequēti⁹ tēpore: cōcursu autē corpusculorū, siquidē etiā nauigantiū quidā humoris fluxu afficiātur, nec tamē ex corpusculorū cōcursu. Adiectū etiā frequēter ex indigestione hoc fieri, siquidē ex alijs quoque causis fiat cholerica passio. Itē aliqui nostrorū tradiderūt eandē diffinitionē, solū cōcursum corpusculorum detrahentes, atque viarum raritatē adijcientes. Nos autem superfluum fuisse causas passionis dicere iudicamus, cum sit necessarium id quod ex causis conficitur edocere. Multo autem

ac magis superfluum dicimus, etiam causas antecedentes diffinitionibus adiungi. quippe cum nec sola cholericæ passio ex indigestione fiat, neque sola indigestio hanc faciat passionem, sed etiā alias speciales, atque contraria virtutis, quarum nihil ex ista diffinitione mōstratur. Dehinc quod rheumatismus siue humoris fluor, non solum ventris atq; intestinorum sit, sed etiam stomachi. quapropter vt Soran⁹ ait, Cholericæ passio est solutio stomachi, ac ventris, & intestinorum cum celerrimo periculo. Sed antecedentes causas eius passionis dicimus, vinolentiā, vel malum medicamen potum, aut aquarum calidarū potationem, vel iactationem maritimam primæ nauigationis, quæ commoueat insuetos: sed vehementius hoc facere dicimus vbi continuamus indigestionem ob plurimam sumptionem cibi, aut insueti, aut curiose conditi. quorum sane intellectus aptus rationi est ob causarum scientiā, inutilis vero ac necessarius curationi, vel naturæ. huic passioni similis ac vicina est diarrhœa atq; stomachi resolutio. Sed diarrhœā Asclepiadis sectatores discernūt, in cholericis aiunt ventris & stomachi rheumatismū, hoc est humoris fluore, in diarrhœa vero vltimarū partiū profluuium. Nos vero dicim⁹ in stomachi solutione solū vomitū frequentare, & neq; simul ventris fluorem, qui si fuerit rursus vomitū non attestante solius ventris significat solutionem, & appellabitur diarrhœa, in cholericæ passione cōcurrit, hoc est vomitus atque vētris fluor cum alijs quibusdam accidentib⁹ signis, quæ post memorabim⁹. Item indigestionem aiunt genere differre, sed

Asclepiadis sectatores magnitudine inquiunt, si quidem paruus ex indigestione corpusculorum concursus siue obtrusio, maior autē in choleris tēpore inquit, siquidē præcedat indigestio cholerica, sed horum prompta atque facilis est discretio, etenim indigestio cōficitur ex corruptione ciborum, etiam si quis neque vomat neque humoris fluorem sustineat, quē Græci rheumatismum appellāt, per ventrem effectum. Cholera autem ex vomitu atque ventris fluore turbatio, etiā si cib⁹ nō fuerit corrupt⁹, & ex alijs antecedentib⁹ causis fuerit veniēs, intelligi potest.

Quæ sequuntur eos qui cholerica passione afficiuntur. Cap. XX.



Præcedit frequenter cholicos stomachi grauedo atq; tensio, anxietas, iactatio, vigiliæ, tormentum intestinorum cum sonitu, quem Græci borborygmon vocant. Ventris dolor atque per podicem venti fluor nihil releuans, ruinationes fumosæ. Nausea, saliuarum fluor grauedo thoracis cum membrorum defectu, surgente passione iugis vomitus, & primo corrupti cibi, sicut frequenter occurrit, & humoris atque fellis flauidi, dehinc vitellis ouorum similis, tunc præsij, atq; eruginosi, vltimo etiam nigri, ventris quoq; turbatio cū dolore & egestio vomitorū similis, hoc est spumosa & acerrima, cū frequenti delectatione vomendi. Crescente passione aqua ti atque tenuis liquoris fiet egestio, & aliquando similis loturæ carnis. feruntur etiam cum his humoribus plerunque subalbida desputa, sequitur etiam densitas pulsus & articulorum, atque

vultus nigrore fuscatus, ardor, atque sitis insatiabilis, spiratio celerrima, & contractio vel conductio membrorum, cum neruorum tensione, ac surarum & brachiorum. Præcordiorum etiam ad superiora raptus cum dolore iliaco simili. alius quando etiam egestio ventris sanguinolenta, vultus in maciem atque tenuitatem deducti, oculi rubri, & in ultimo singultus. ita denique acuta atque celerrima passio esse à veteribus memoratur, ut nunquam in secundum veniat diem. At si in meliorem partem vergere cœperit, ut leuior fiat, articulorum atque corporis frigus infarctum imitescit, & pulsus assurgens manifestior fiet ex altioribus ad superficiem veniens, parue etiam, atque interuallis longioribus egestionis fient, & paulatim releuatur æger efficitur. Accessiones autem apprehendimus ex his, quæ sunt passionum consequentia. Cum enim anxietas atque iactatio, confluentibus ad stomachum liquidis, & contractio articulorum occurrerit, accessionem præsentem dicimus. At si post vomitum minus sibi æger cœperit displicere, stomachi occurrerit releuatio, & mitigata ventris mordicatione, ventris cuncta minui aduersa cœperint, dimissionem pronuntiamus. Generaliter autem passio est vehemens, atque acuta, vel celeris, & aliquando solius solutionis, aliquando adiuncta ex aliqua parte strictura, ut dolores ostendunt stomachi atque ventris & intestinorum, & articulorum contractio. Magis autem patitur in ista passione stomachus, & venter & intestina, cætera vero vel omnia corporis consentiunt.

CÆLII ACVT. MORB.

Quomodo curandi sunt cholerici. Cap. XXI.



Holericos oportet primo similiter vt cardiacos locari, atq; vt indigestos, vel qui cibos excludunt: potum dari decet tepidæ, vt quod immutatum corruptione videatur, tanquam veneni materia per vomitum depurgetur. At si hæc corrupta excludi desierint, erunt ægrotantes seruandi in eodem schemate, prouocabiles sunt enim liquidorum fluctionibus motus. Conuenit etiam articularum leuis atq; impressa defricatio cum quadam perseverabili tenacitate. Tunc etiam eorum ligatio, qua cum fuerint densa phthysicū consentire stomachum cogāt. sed ne ex his ligamentis superiora torpescant, erunt sæpius commutandæ ligationes. Tunc stomacho atque ori ventris spongiæ admouendæ iugiter ex aqua frigida expressæ, dehinc etiam ex posca, atque ipsdem facies detergenda, quò defectione submota in resumptionem veniant ægrotantes. Vtemur etiā odoramentis sicut in cardiacis ordinauimus, atque flabris & cataplasmatib⁹ frigidæ virtutis, secū dum thoracem, ac ventrem. sed vt non sæpius hæc mutare cogamur, neque contrario permanendo calida efficiantur, spongijs frigida expressis atque superpositis ea frigidamus, vt non sæpius virtute constrictiua, verum etiam frigido tactu fluorem constringant. At si dolor, vel intestinorum tormēta, plurimum coegerint, pro frigidis spongijs. aliqua temperantiā admouem⁹. Tunc tectiōnem mundarū lanarum, vel olei dulcis, atq; calidę infusionib⁹ vtemur. Similiter etiā

propter contractiones, articulos lana circumtegimus, & pannis calidis colligamus. Infigimus præterea cucurbitas leues, quas Græci *κοῦφας* vocant, scilicet sine scarificatione, has frequenter detrahemus, atque differentibus locis infigimus, quo latenter ac sensim etiam stricture, quæ irruerat, resoluatur. At si dolores coegerint, & plus vrgerè vomitum viderimus, solutione obtinente, ita cucurbitas infigemus, ut in cardiacis memorauimus, hoc est, constrictiuas ori ventris, atque subsequenter partibus. Aliquando etiã à tergo per interualla damus dimissionis. Præterea aquã frigidam sorbendam, per interualla quidem, at si vehementius vires amputari, ac solutione crescere viderimus, præcuratis ægris, ut in cardiacis docuimus, cibum damus dimissionis tempore, non expectata prima diatrilo, defectionis coacti periculis. Dabimus igitur panem ex aqua frigida, diligenter prælotum, halicam, vel oryzam ex aqua, vel posca, aut oua hapala, aceto prius infusa, & pultriculam sicciorẽ. At si accepta reiecerint paululum requiescentes, post interuallum rursus cibo nutrimus. Tunc si res coegerint etiã tertio id facimus, vel quarto: & ob retinendum cibum cucurbitam latioris osculi vnã vel secundam plurima cum flamma infigimus ori ventris, infra costarum finem eodem tempore quo cibum damus. Tunc post eius sumptionem idẽ facimus, quo constrictione atq; raptu corporis ad inferiora venire, & permanere cogatur accepta. Oportet præterea adiutoriorum mediocritatem intueri. Nam plurimo atque iugis cibo oppressione præfocati sæpe sunt ægrotantes. At

CÆLII ACVT. MORB.

si distantia temporis longiore fuerit vomitus intercapedinetus, & ventris effusio iisdem dilationibus dirarata, tunc ut in declinatione totius passionis, ob destructionem dabimus quicquam pomorum, ut pyra, vel mala cydonia, aut sorba, aut mali punici grana, aut damascena, vel recentium vuarum, palealiū, intybi thyrsum, atque volantium pectora, sed non pinguium ut perdicis, vel phasæ, vel similibus in posca decoctorum vel assorum cum aspergine corticis mali punici, in puluerem comminuti. Dehinc est cellario quem Græci apotamiam vocant, colymbadas oliuas fractas. At si sufficienter ægrotantium surrexerint vires, dabimus etiam panem ex vino mediocriter austero & aqua frigida temperato. Dehinc etiam bibendum dabimus ex ipso mixtum potum, sed eo tempore quo cibum dabimus: multum enim bibere prohibemus, siquid sitis siccare valeat humecta. At si febres fuerint consequutæ, & vires ægrotantis permiserint, abstinentia cibi abstinemus vna die: si autem hoc ferre non potuerint, dabimus cibum dimissionis tempore: sin vero febres non coegerint, & passionem cessasse viderimus, non sine cautione ac diligentia cura resumimus ægrotantem paulatim, atque modicis adiectionibus motus, vel ciborum præcauentes superfluos cibos, ne in commemorationem passio reducatur. Resumptis igitur viribus etiam lauacrum adhibemus. Hæc est secundum nos cholerica cura. Veterum autem medicorum sententiæ variant. Hippocrates se quoddam appellans choleurecā nominauit, atque iliacæ passionis esse particulam siue concursum

constituit. Nunc denique eius curationem, neque memorare dignum est, sed quinto libro epide-
mion cholicorum signa tradēs helleboro dicit
utendum cum lenticula, vel singularem succum
lenticulæ bibendum. Tunc inquit vomitū pro-
uocandum. quod est non aliter contrariū, quā
si quis fluore sanguinis pereuntem, vel diapho-
resi dissolutum phlebotomare, vel ita ut cardia
cum sudore defluentem calido lauacro vel sudo-
riferis vaporibus velit adiuuare, quod id ipsum
quod passio nititur, adiutorium quoque fieri ve-
hementius cogat. etenim in helleboris vomitus
factus etiam his qui nulla solutione afficiuntur
cholicæ passionis periculum solet fieri, & ma-
gis cum non præparatis corporibus adhibetur.
At si quisquam Hippocratem defendens dixe-
rit ab eo nō datum, sed memoratum, quod qui-
dā cholicus acceperit, vel sibi ipse dederit, fri-
gida utitur defensione. Ait enim Hippocrates
profuisse datum, quod si displiceret, culpae de-
buerat. Item Diocles libro quo de passionibus
atque earum causis, & curationibus scripsit, fri-
gerandos inquit cholicos, & donec depurgen-
tur nihil accipere. Tunc cum tēpus visum fue-
rit dandam frigidam & in vomitum prouocan-
dos. balanos etiam per podicem indendos. At si
hyems fuerit, calida aqua utendum, tunc ni-
grum dandum vinum cum polenta, atque post
positum somnum. quiescendum. singultui vero
absinthium dicit conuenire, & ad solutionem
bubulum vel caprinum lac, dimidiæ heminæ
quantitate, cum papaueris albi succi cyatho

CÆLII ACVT. MORB.

dimidio, & mali punici succo. scribit etiam aliud curationis genus, quo memorat cumino quoque atque fale & origano, & his similibus potis utendum. Culpa igitur primum est, quod calidum potum dari iubeat cholerici cum tempus hyemis intuetur, & non passionis considerat vires. Neque coniiciens quod calidum quicquid est laxando prouocet vomitum. Addidit etiam nihil dandum, donec ægrotantes depurgentur, & non docuit tempus cibi offerendi, neque demonstra- uit, quia post depurgationem corruptorum dis- missionis tempore erunt ægrotantes nutriendi, denique tempus vini dandi non memorauit. Item absinthium est acerrimæ virtutis, & propterea incongrue, atque imperite singultientibus ordi- natum. est enim ex tumore stomachi veniens singultus. Lac etiam in eiusmodi passionibus fa- cilis acescit, & effusionem ventris prouocatam extendit. Cuminum quoque & origanum acerrimæ virtutis esse nemo est qui nesciat, quo fiet ut aperiantur magis quam claudantur fluentia, & prouocentur mordicationibus quæ forte sunt in tumore constituta. Praxagoras primo libro de curationibus contra docens, iubet dari plurimum mulsum ex aceto confectum ebibendum, & ca- lido passo, atque absinthio potandos probat. Vo- mitibus vero prius inquit calidum potum dan- dum. Tunc si plurimus inquit vomitus fuerit la- uandos egrotos calida, & post lauacrum somno di- mittendos. At si dormire non potuerint, danda polenta atque bibenda ex mulso, vel passo, vel frigida. Et cum vomitus quiesuerit, lenticula nutrien- dos & vino potandos. At si vomitus persevera-

uerit post dationē rursū lauandos, atq; iisdem
 vtendum: at si perseverauerint ea quæ per ven-
 trem ferantur manente etiam vomitu, alia die
 rursū lauandos atq; similia adhibenda. Ap-
 paret etiam in hoc morbo erroribus implicari.
 Etenim mulsum ex aceto doloribus est incon-
 gruum, vt quod inflet tumentia ex aceti quali-
 tate: absinthium vero sit nocens, vt superius me-
 morauimus. Item calidus potus, vomitibus est
 inconueniens, lauacrum quoque fluenti corpori
 vehemēter inimicū, quod iste non semel sed sæ-
 pius adhiberi confirmat: & neque cibo nutries,
 quo facilius vires ægrotantis diuersis intereant
 detrimentis. Neque saltem semel sub hac laua-
 cri frequentia dormire permittēs, vt ipse voluit.
 Item mulsum ventrem dissoluit, quippe non de-
 coctum. Non aliter etiam dulce vinum. ridicu-
 lum quoque est, atque cachinnos commouens,
 pausante vomitu lenticulam dare, perseverante
 vero lauacrum adhibere, cum sint hæc in vtro-
 que contraria. Etenim lenticula constringit præ-
 sentem fluorem, lauacrum vero corpus coequat
 post vomitus cessationem. Item Erasistratus, se-
 cundo libro salutarium vtitur tepido potu: vo-
 mitum prouocans, vel acrimoniam temperans
 fellis: contra dolores autem tepidis vtitur vapo-
 rationibus, & cataplasmatibus ex vino, at si litis
 & defectio coegerit, vino potat lesbio, cū aqua
 frigida, sed in aquæ cyathum vini guttas duas
 admiscendas iubēs, vel tres, vt solū, inquit, odo-
 rem vini habere aqua videatur, atque hoc biben-
 dum post singulos imperat vomitus, & post sin-
 gulas ventris effusiones, plus, inquit, aquæ admi-

scendum si febres irruerint, & similiter lenticulam dandam & vinum, aut malorum infusionem, vel decoctionem aut pomorum, aut pyrorum, & etiam lauacrum probat & resumptionem adhibendam. Sed hinc quoque excludendus in quibusdam est, etenim contra dolores quomodo calidis, sic sine vino cataplasmatibus vtendum: siquidem rigore quodam naturali siue mordicatione, quam Græci rhigos vocant, vino constringant. Est præterea eorum datio ante declinationem passionis contraria, & magis cum sine cibo danda ordinantur, & immodice: siquidem post singulos vomitus, id fieri præceperit, cum propter virium solutionem oportuerit etiam cibi quiddam offerre, & non solum vinum potandum dare: febribus quoque irruentibus, & quantum credendum est humore interposito, inconueniens est lenticula & infusiones siue decoctiones constringentium materialium. Harum enim vomitum cogentium fuerat usus necessarius. At Herophilus cholicorum curationem secundum se alijs nullam tradidit. Asclepiades vero tertio libro celerum vel acutarum passionum affectans vomitum ex rapaci haustu transuoratis potionibus, eadem die leuat ægrotantes & vino potat cum polenta: & quid ultra? cum plurima approbet veterum curationum, solum prohibens ea die leuandos nisi vires fuerint reparatæ. oportebat etiam vini tempus diffinire, atque post cibum dandum ordinare. Empiricorum Serapion primo libro curationum istius passionis medelam tradidit. Itē Heraclides Tarentinus libro quarto, sed communiter vterque rationalis logicorum consensu

tiunt curationi, adijcientes etiam medicamina quæ catapotia vocauerunt, multis ex speciebus confecta: quæ pharmacode dicuntur. Necnon potiones etiam ad retinendos exitus fluentium materiarum, ex quibus sunt hyoscyami seminis, quem nos altercum dicimus, drachmę duar, ani si drachma vna, opij drachma semis, contrita & superfusa aqua dulci. Tunc collecta & in triginta partes diuisa, singula faciūt catapotia, & dantur in aqua frigida, cyathis duob⁹. Abstinēt, inquit, etenim vētrem. His vero qui fuerint viribus illeſis conuenire dicit medicamē ex myrrha atque papauere & croco confectum in quantitate erui datum cum vini cyatho, sed hæc vehementius ostendit Heraclides Tarētinus, dāns etiam halicam cum vino vltimę depressionis, hydātode græci vocant, nos abusiue torticum, vel cū absinthio & oryza, vel lenticula, aut ptisana, cū contrariam virtutem halicæ lenticula atque ptisana obtineat. Item primo libro regulari siue vt græci dicunt, diætetico, nutriēs cholicos prima die, cæteris vtēs congrue. Postera inquit die eos ante vomitum vsque ad tertiū diem neque cibo nutriendos, neque os colluere permittendos, si quicquam fuerit suspitione sollicitum. Post tertium vero diem continenter atque cum cautione resumptionem faciendam. Sed huic erit respondendum: Vtrum in declinatione passionis dari dixerit vinum, atque varium cibū, an ante ipsam, quod est intemporale atque importunum. Sed si in declinatione, cur declinante passione, & quantum creditur forsitan & exclusa, vsque ad primā diatriron abstinendos existimat ægrotantes? His

enim qui forsitan ob eius defensionem dixerint eam præcauere rursus ne febres irruant. Respōdemus hoc esse occultum, & non oportere methodicum esse suspicionib⁹ incertis occupatum, & vere. at si ob irruentem febriculam, quæ iam præsens esse videatur, abstinencia putat vtendū, erat melius dicere, quia cessante vomitu, emergente febricula abstinencia est adhibenda, quod idem facere vel memorare neglexerit.

De defluxione, quam græci diarrhoeam vocant. Caput XXII.

Defluxio, est secundum Aselepiadem rheumatismus, siue fluor parui temporis vltimarum partium coli atque sessionis, siue longanonis, vt nos appellamus. Quæ sit, inquit, ex conuentu siue concursu atq; congressu corpusculorum. Sed huic quidam responderunt, quod non solum vltimarum partium coli defluxio esse videatur, sed etiam superiorum, item ex corpusculorum concursu, siue conuentu, quem entolim appellauit, negant fieri posse defluxionem, sed magis abstinenciam vel retentionem. Alij rursus defluxionem dicunt fluorem, siue vt græci rheumatismum parui temporis intestinorum, atque sessionis vel longanonis secundum viarum raritatē. Sed superfluum est causas adijcere, cum passionem diffinimus, quibus fuerit confecta defluxio. Item alij defluxionem esse dixerunt ventrisurbationem celerem, vel acutam, quæ fit ex corruptione ciborum. Sed etiam nunc habet quædam

superflua, diffinitio. Dehinc etiã sine corruptione ciborum, aut simili causa posse defluxionem fieri præuideamus. Sequitur autem defluxione laborantem sine ullo dolore effusio liquidorum per podicem, hoc est, per anum quæ corporis faciat corruptionem. Aliquando etiã perseuerando intestinorum vulnationem, ex qua dysenteria sæpe sequatur. Utendum deniq; ægrotante locato, silentio atque abstinentia cibi & vini. Tunc cataplasmatibus cōstrictiuis secundū clunes atq; ventrem vel pubetenus. Alia die si defluxio cessauerit cibus adhibendus cōstrictiuis. Tunc etiã vinum atque lauacrum adhibendum, & cætera quæ resumptionibus conuenire videntur.

CAELII AVRELIANI METHO-

dici Siccensis Oxeon Libri tertij finis.